

Rezeptsammlung

Zum Erfahrungswissen über Heilkräuter und Hausmittel zur Behandlung von Nutztieren aus
den Kantonen Bern, Luzern, Solothurn und Basel

Erfasst von Karin Stucki und Mirjam Zbinden

Januar-Juni 2014

Danksagung

Sehr herzlich möchten wir uns bei allen Landwirtinnen und Landwirten bedanken welche bereit waren ihre Erfahrungen im Umgang mit Hausmittel und Heilkräutern für unser Projekt weiter zu geben.

Weiterer Dank geht an die Kantone Bern und Luzern, Solothurn und Basel-Landschaft sowie dem Bio-Bauernverband Bärner Bio Bure und der Stiftung Sampo, der Schaette Stiftung und der Stiftung Sur-la-Croix für die finanzielle Unterstützung, welche die Durchführung dieses Projektes ermöglicht haben. Weiter danken wir den Biovereinen der beteiligten Kantone und allen Informanten für die tatkräftige und erfolgreiche Unterstützung bei der Teilnehmersuche.

Karin Stucki
karin.stucki@stud.unibas.ch

Mirjam Zbinden
mirjam.zbinden@stud.unibas.ch

Michael Walkenhorst
michael.walkenhorst@fibl.org
Ackerstrasse, Postfach, 5070 Frick
Tel.: 062 865 72 86

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	4
Abkürzungen	4
Informationen zu den Rezepten.....	4
Haftungsausschluss	4
Zusammenfassung Masterarbeit Karin Stucki.....	5
Zusammenfassung Masterarbeit Mirjam Zbinden.....	6
Atemtrakt	7
Mastitis.....	19
Fruchtbarkeitsstörung und Erkrankungen der weiblichen Genitalien	28
Hautveränderungen und Wunden (inkl. Augen, Hufen und Klauen)	43
Magen-Darmtrakt-Erkrankungen.....	77
Parasiten.....	117
Verletzungen des Muskelskelettsystems (inklusive Blutergüsse und Abszesse).....	119
Vorbeugung und allgemeine Stärkung.....	127

Einleitung

Diese Rezeptsammlung beschreibt das Wissen über die Anwendung von Pflanzen und Hausmitteln von 75 landwirtschaftlichen Betrieben aus den Kantonen Bern, Luzern, Solothurn und Basel. Der Aufbau dieser Rezeptsammlung ist nach Krankheitsgebieten gegliedert. Zuerst werden die Rezepte mit einer einzelnen Pflanzenart beschrieben, dann findet man Angaben über verwendete Hausmittel wie z.B. Essig, Euterpaste oder Schnaps. Am Schluss sind Rezepte beschrieben welche mehrere Pflanzenarten enthalten.

Abkürzungen

EL=Esstlöffel

KL=Kaffeelöffel

Kraut= Ganze Pflanze ohne Wurzel

TD= Therapie Dauer; falls keine Zahl steht, wurde keine Dauer erfasst oder es handelt sich um eine einmalige Verabreichung

Informationen zu den Rezepten

Die angegebenen Pflanzenmengen wurden wenn möglich auf dem Betrieb ermittelt oder anhand von Volumenangaben später nachgewogen. Die Anzahl der Hausmittelgaben pro Tag und die angegeben Therapiedauer sind Durschnitte. Zum Teil wurden noch zusätzliche Behandlungen verwendet, dies ist jedoch in der Rezeptsammlung nicht erfasst.

Haftungsausschluss

Diese Rezeptsammlung ist eine Zusammenstellung von gesammelten Erfahrungen mit Heilpflanzen und Hausmittel von LandwirtInnen aus den beteiligten Kantonen. Bei den aufgelisteten Rezepturen und Hausmitteln handelt es sich weder um eine Empfehlung noch um eine Bewertung durch die Autorinnen. Von den Autorinnen wird keinerlei Haftung für die Folgen der Anwendung übernommen.

Dieser Rezeptsammlung ist ein Teil der beiden Masterarbeiten „Contemporary ethnoveterinary plant use in high altitude regions of the Swiss cantons Bern and Luzern – traditional and current sources“ und „Household herbal remedies used by farmers of the lowland regions of north-western Switzerland to treat livestockwelche“ vom Januar bis Juni 2014 durchgeführt wurden. Eine kurze Zusammenfassung zu den beiden Masterarbeiten findet man auf der nächsten Seite.

Zusammenfassung Masterarbeit Karin Stucki

Contemporary ethnoveterinary plant use in high altitude regions of the Swiss cantons Bern and Luzern – traditional and current sources

Ethnopharmakologische Relevanz: In Europa wurden ethnoveterinärmedizinische Studien vor allem in verschiedenen Teilen der Mittelmeerregion und in Österreich durchgeführt. Seit 2010 sind auch fünf ethnoveterinärmedizinischen Studien in verschiedenen Regionen der Schweiz durchgeführt worden. Im Allgemeinen ist ethnoveterinärmedizinische Forschung in Europa immer noch selten. Ein Vergleich der zeitgenössischen ethnomedizinischen Pflanzennutzung in der Schweiz mit moderner und historischer Literatur liegt aktuell vor, in Bezug auf die Tiermedizin fehlt ein solcher Vergleich jedoch. Das Ziel der Studie war es, die zeitgenössische ethnoveterinärmedizinische Pflanzennutzung der höher gelegenen Regionen von zwei Schweizer Kantonen (Bern und Luzern) zu dokumentieren und in Bezug auf historische und moderne medizinische und veterinärmedizinische Literatur die folgenden Fragen zu beantworten: Bis zu welchem Grad die aktuelle ethnoveterinärmedizinische Verwendung dieser Pflanzen a) durch verschiedene Wissensherkünfte beeinflusst wird, b) als traditionell einzustufen ist, und c) als solide Basis für gezielte experimentelle und klinische Forschung sowie angewandte Projekte dienen kann.

Material und Methoden: Interviews mit 44 Gesprächspartnern sind von Anfang März bis Mitte April 2014 durchgeführt worden. Dabei wurden detaillierte Informationen zu den einzelnen Hausmittel und ihrer Anwendungen gesammelt: Pflanzenarten, Herstellungsverfahren, Indikationsgebiet, Art der Anwendung, Dosierung, Wissensherkunft, Häufigkeit der Anwendung, letzter Anwendungszeitpunkt und Zufriedenheit der Landwirte mit der Behandlung.

Resultate: Insgesamt konnten 392 Hausmittel dokumentiert werden, von denen 315 nur eine Pflanzenart enthielten („homemade single species herbal remedies“, HSHR). Eine Gesamtzahl von 404 Anwendungen wurde für die 315 HSHR erwähnt und diese beinhalteten 83 Pflanzenarten aus 46 botanischen Familien. Pflanzenarten aus der botanischen Familie der Asteraceae, Lamiaceae und Rosaceae waren die am häufigsten genannten. Kamille, Ringelblume, Stieleiche und Thymian waren die am häufigsten dokumentierten Pflanzenarten. Die größte Anzahl der Anwendungen wurde für Behandlungen von Magen-Darm-Erkrankungen und Stoffwechselstörungen eingesetzt, gefolgt von Hautveränderungen und Geschwüren. Mehr als die Hälfte der Anwendungen wurden oral verabreicht. Für mehr als fünfzig Prozent der Anwendungen wurden Familie, Vorfahren und Freunde als Wissensherkunft genannt und für etwa ein Viertel der Anwendungen wurden Ausbildung und Kurse als Wissensherkunft dokumentiert. Die Mehrheit der Anwendungen wurden mindestens einmal in den letzten 10 Jahren verwendet und in etwa vierzig Prozent der Fälle wurden die Anwendungen mehr als 10 Mal in den letzten fünf Jahren eingesetzt. Die aus Ausbildung und Kurse übernommenen Anwendungen wurden meist innerhalb des letzten Jahres verwendet und kamen auch während der letzten 5 Jahre häufiger zum Einsatz, als die von Familie, Vorfahren und Freunden weitergegebenen Anwendungen.

Schlussfolgerung: In Übereinstimmung mit den verschiedenen Definitionen kann, abgesehen von ein paar Ausnahmen, die Mehrheit unserer aktuell dokumentierten ethnoveterinärmedizinischen Pflanzenarten als "traditionell" eingestuft werden. Die Traditionalität der Anwendung der am häufigsten dokumentierten Pflanzenarten, einschließlich ihres Indikationsgebietes, wurde kaum von der Wissensherkunft beeinflusst. Dennoch kann die Häufigkeit und die Aktualität der Verwendung von einigen Pflanzenarten durch Kursbesuche angeregt werden.

Zusammenfassung Masterarbeit Mirjam Zbinden

Household herbal remedies used by farmers of the lowland regions of north-western Switzerland to treat livestock

Hintergrund: In der Schweiz wird zur Behandlung von Tieren eine grosse Menge Antibiotika eingesetzt. Der grösste Teil wird für die Behandlung von Mastkälbern, Mastschweinen und Geflügel verbraucht, um hier Erkrankungen des Magen-Darm- und Atemtrakts zu behandeln. Ein hoher Einsatz an Antibiose führt zu einer steigenden Zahl resistenter Mikroorganismen verbunden mit wachsenden Schwierigkeiten effizient antimikrobiell zu therapieren. Auf ethnoveterinärmedizinischer Forschung basierende Arzneipflanzen als Therapieoptionen für landwirtschaftliche Nutztiere, insbesondere für Mastkälber, Mastschweine und Geflügel könnten möglicherweise helfen, den Einsatz an Antibiose zu reduzieren.

Einunddreissig GesprächspartnerInnen wurden unter zu Hilfenahme eines semistrukturierten Fragebogens interviewt. Detaillierte Informationen hinsichtlich der Pflanzenarten, dem Verarbeitungsprozess bis hin zum anwendungsfertigen Hausmittel sowie die Anwendungen dieser Hausmittel wurden dokumentiert.

Ergebnisse: Insgesamt 219 Hausmittel konnten dokumentiert werden. Von diesen enthielten 145 jeweils nur eine einzelne Pflanzenart (household single-species herbal remedies, HSHR), insgesamt 43 Pflanzenarten aus 30 botanischen Familien einschliessend. Die Familien Asteraceae, Rubiaceae und Boraginaceae waren am häufigsten vertreten. Kamille wurde am meisten in HSHR verwendet, gefolgt von der Kaffeepflanze, dem Beinwell, der Ringelblume, der Brennnessel und dem Kreuzdorn. Insgesamt 209 Anwendungen konnten für die 145 HSHR beschrieben werden, hauptsächlich für Rinder. Speziell für Kälber wurden 63 Anwendungen beschrieben, insbesondere zur Behandlung von Magen-Darm-, Haut- und Atemwegserkrankungen. Für Schweine und Geflügel konnten weitere 24 Anwendungen erfasst werden. Die HSHR wurden überwiegend oral verabreicht oder äusserlich auf veränderte Hautpartien oder Wunden aufgebracht.

Schlussfolgerungen: Die LandwirtInnen der Flachlandregionen der Nordwestschweiz verfügen über Wissen zu Hausmitteln und wenden diese auch aktuell an, überwiegend bei Rindern verschiedener Alterskategorien aber auch zur Behandlung von Schweinen und Geflügel. Insbesondere für Kälber konnte eine nennenswerte Zahl an Hausmittel dokumentiert werden, insbesondere für die Behandlung von Erkrankungen, die bei Mastkälbern zu einem hohen Einsatz an Antibiotika führen. Der grösste Teil der Pflanzenarten wurde bereits in vorhergehenden Projekten angrenzender Forschungsregionen beschrieben. Dennoch wurden vier Pflanzenarten erstmalig im Rahmen schweizerischer ethnoveterinärmedizinischer Forschungsarbeiten beschrieben und von zweien konnte darüber hinaus erstmalig eine ethnoveterinärmedizinisch basierte orale Tagesdosis bestimmt werden. Der überwiegende Teil der dokumentierten Pflanzenarten ist in seiner Anwendung vor dem Hintergrund schweizerischer Rechtsprechung zu Tierarzneimitteln nicht explizit eingeschränkt.

Atemtrakt

Pflanze botanischer Name (Pflanzenfamilie) verwendeter Pflanzenanteil	Rezeptname	Anwendungsgebiet	Tierart	Herstellung	Verabreichung	TD
Gemeine Zwiebel <i>Allium cepa</i> L. (Amaryllidaceae) Zwiebel	Hustensirup aus Zwiebeln	Husten	Kalb	1 Zwiebel (ca. 100g) fein schneiden und mit 2 EL Honig mischen. Dann 2dl Bätzi (Obstbrandwein) dazugeben und 1h bei Raumtemp. ziehen lassen. Zwiebelstücke müssen nicht abgeseiht werden.	1 EL Hustensirup 3x täglich eingeben	3
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Lungenentzündung	Ziege	1 Beutel Kamille (1.5g) mit 1/2L heissem Wasser übergießen und ca. 5min ziehen lassen, 3 KL Zucker dazugeben, lauwarm verwenden.	4 mal täglich 2dl Kamillentee mit Zucker in einem Kessel den Tieren verabreichen	4
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Husten	Kalb	1 KL Kamillenblüten (0.5g) in 1.5L kaltes Wasser geben und aufkochen, dann Herdplatte abstellen und 10min ziehen lassen und absieben mit einem Sieb.	2x täglich 1/2L lauwarmen Kamillentee mit der Nuggiflasche verabreichen	2

Meerrettich <i>Armoracia rusticana</i> P. Gaerten. & al. (Brassicaceae) Früchte	Meerrettich-Creme	Lungenentzündung	Kalb	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt. Enthält 48% Meerrettich.	morgens und abends 30g Meerrettich Creme (48% Meerrettich) in die Milch einrühren	2
Echter Schwarzkümmel <i>Nigella sativa</i> L. (Ranunculaceae) Früchte	Schwarzkümmel	Atemwegsprobleme	Pferd		1 Hand voll Schwarzkümmel (ca. 40g) 3x täglich übers Futter geben	3
Spitzwegerich <i>Plantago lanceolata</i> L. (Plantaginaceae) Blätter	Spitzwegerichtinktur	Atemwegsprobleme nach der Geburt	Lama	Ein 1.5L-Einmachglas locker füllen mit geschnittenen Spitzwegerichblättern und mit Bätzi (Obstbrandwein) auffüllen. 4 Wochen an der Sonne ziehen lassen, einmal täglich schütteln, ansieben mit einem Sieb und in dunkle Flaschen abfüllen.	3 Tropfen Spitzwegerichtinktur in 50ml Wasser geben und mit einer Spritze einmal täglich eingeben	1
Stechpalme <i>Ilex aquifolium</i> L. (Aquifoliaceae) Zweige	Stechpalme	Lungenentzündungsprophylaxe	Rind		mehrere Stechpalmenäste an mehreren Orten im Stall aufhängen	
Stechpalme <i>Ilex aquifolium</i> L. (Aquifoliaceae) Zweige	Stechpalmentee	Lungenentzündung	Kalb	2 Stechpalmenzweige (15-20cm) mit der Baumschere in 3-4cm grosse Stücke schneiden. Stücke in 1L kaltes Wasser geben und aufkochen, 10-12min kochen lassen und danach absieben, lauwarm verwenden.	2x täglich 7-8dl Stechpalmentee mit dem Kälberkessel verabreichen, ca. 2h nach Milchmahlzeit	2

Stechpalme <i>Ilex aquifolium</i> L. (Aquifoliaceae) Blätter	Stechpalmentee	Lungenentzündung	Kalb	Ca. 4g Stechpalmenblätter mit 1L heissem Wasser übergiessen und ca. 15min ziehen lassen. Danach absieben mit einem Sieb oder einem Tuch.	morgens und abends 1L Stechpalmentee mit Schoppen verabreichen	2
Weisstanne <i>Abies alba</i> Mill. (Pinaceae) Zweige	Tannenäste	Vorbeugend gegen Atemwegserkrankungen	Rind		8-10 grosse Tannenäste im Stall aufhängen, so dass Tiere so viel davon fressen können wie sie wollen	
Fichte <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. (Pinaceae) Zweige	Tannenäste	Lungenentzündung	Kalb		mehrere Tannenäste im Stall am Gitter befestigen, so dass Tiere so viel davon fressen können wie sie wollen	
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymian	Hustenprophylaxe	Kalb		im Stall ein Büschel frischen Thymian aufhängen	
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymian	Atemwegsprobleme, Erkältung, Husten	Kalb		2-3x täglich 3 Finger voll getrockneten Thymian (ca. 1.8g) direkt eingeben	2

Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymian	Husten	Rind		Stall ca. 30min mit getrocknetem Thymian ausräuchern, immer wieder 1 Hand voll Thymian auf die glühende Kohle legen	1
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymian	Atemwegsprobleme, Husten	Kalb		jeden 2. Tag 3 Finger voll getrockneten Thymian (ca. 0.33g) direkt ins Maul eingeben	12
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymian	Atemwegsprobleme, Schnupfen	Kuh		2x täglich 25g getrockneten Thymian zum Futter geben	2
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymian	Atemwegsprobleme, Schnupfen	Kalb		2x täglich 10g getrockneten Thymian zum Futter geben (Mais oder Weizenflocken)	2
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymiankur	Prophylaxe Atemwegsprobleme, Kur	Kalb		3g getrockneten Thymian morgens und abends über die Maiswürfel geben	2

Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymiantee	Husten	Kalb	2EL Thymian (ca. 7g) mit 2L heissem Wasser übergießen, Thymian nicht absieben, lauwarm verwenden.	1-2x täglich 2L Thymiantee mit der Nuggiflasche verabreichen	1
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymiantee	Husten, Erkältung	Kuh	0.5KL Thymian (0.15g) in 1L Wasser geben und aufkochen, dann Herdplatte abstellen und Tee 10min ziehen lassen. Danach durch ein Sieb absieben.	2x täglich 1L Thymiantee mit einer Flasche eingeben	2
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymiantee	Husten, Schnupfen, Erkältung	Kalb	0.5KL Thymian (0.15g) in 1L Wasser geben und aufkochen, dann Herdplatte abstellen und Tee 10min ziehen lassen. Danach durch ein Sieb absieben.	2x täglich 1/2L Thymiantee mit dem Kälberkessel verabreicht	2
Fichte <i>Picea abies</i> (L.)H. Karst. (Pinaceae) Äste	Tannenäste	Prophylaxe gegen Lungenentzündung	Rind		Ein Paar Tannäste in Krippe legen (in kritischen Monaten)	
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymian	Prophylaxe gegen Husten	Rind		2x täglich ca. 2g getrocknetes Thymiankraut ins Kraftfutter geben für Herbst-Winter- und Frühlingsmonate	270

Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymian	Husten	Rind		2x täglich ca. 10g getrocknetes Thymiankraut ins Kraftfutter mischen	7
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymiantee	Husten	Rind	Ca. 4.7g getrocknetes Thymiankraut mit 2L heissem Wasser übergießen, 15 Minuten ziehen lassen, nicht absieben, 1EL Traubenzuckerpulver (ca. 17.6g) zufügen	2x täglich ca. 2L Tee mit 1 EL Traubenzuckerpulver einschütten	5
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymiantee	Prophylaxe gegen Lungenprobleme	Rind	Ca. 50g getrocknetes Thymiankraut mit 5L heissem Wasser überbrühen, zudecken und 30 Minuten ziehen lassen, absieben	2x täglich übers ganze Jahr ca. 2.4dl Tee in Milch geben	365
Weisstanne <i>Abies alba</i> Mill. (Pinaceae) Äste	Weisstannenäste	Prophylaxe gegen Husten	Rind		Einige Äste im Stall deponieren, alle 2 Wochen Äste austauschen	

Hausmittel						
	Inhalant	Husten	Rind	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt	2x täglich auf Brust auftragen	4
	Inhalant	Husten	Rind	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt	2x täglich nach der Tränkung auf die Brust auftragen	4-5 Tage

Mischungen						
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae)	inhalant Lösung	Erkältung, Husten	Kalb	Fertiges Inhalationsmittel aus ätherischen Ölen.	1x täglich 20 Tropfen Inhalant in einen Kessel mit heissem Wasser (3L) geben	3
Pfeffer-Minze <i>Mentha arvensis</i> L. var piperascens (Lamiaceae)						
Kampfer <i>Cinnamomum camphora</i> L. (Lauraceae)						
Niaulibaum <i>Melaleuca viridiflora</i> Sol. ex Gaertn. (Myrtaceae)						
Blauer Eucalyptus <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. (Myrtaceae)						
Waldkiefer <i>Pinus sylvestris</i> L. (Pinaceae)						

Kleine Malve <i>Malva neglecta</i> Wallr. (Malvaceae) Blätter	Erkältungsmischung	Kälberhusten, Kur	Kalb	5 Teile Eibischwurzel, 1.5 Teile Thymiankraut, 1.5 Teile Malvenblätter und 2.5 Teile Anisfrüchte mischen.	morgens und abends 45g der Mischung übers Futter geben	10
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut						
Anis <i>Pimpinella anisum</i> L. (Apiaceae) Früchte						
Gebräuchlicher Eibisch <i>Althaea officinalis</i> L. (Malvaceae) Wurzel						

Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae)	Inhalant	Atemwegsprobleme, Schnupfen oder Husten	Rind	Fertiges Inhalationsmittel aus ätherischen Ölen.	2x täglich inhalant-Lösung auf die Knie auftragen, so dass die Tiere es beim liegen einatmen	3
Pfeffer-Minze <i>Mentha arvensis</i> L. var piperascens (Lamiaceae)						
Kampfer <i>Cinnamomum</i> <i>camphora</i> L. (Lauraceae)						
Niaulibaum <i>Melaleuca</i> <i>viridiflora</i> Sol. ex Gaertn. (Myrtaceae)						
Blauer Eucalyptus <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. (Myrtaceae)						
Fichte <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. (Pinaceae)						

Gemeiner Wacholder <i>Juniperus communis</i> L. (Cupressaceae) Kraut	Tannenharz-Salbei- Wacholder-Mischung	Husten	Rind	Wacholder am Schatten lufttrocknen. Ein leeres Rauchaukerzenschälchen zur Hälfte mit Harz füllen (3.5g) und dann 1/4 Salbei (0.35g) und 1/4 (0.35g) Wacholder dazugeben und auf die glühende Kohle legen.	Stall mit der Mischung ausräuchern, einmalige Anwendung	1
Garten-Salbei <i>Salvia officinalis</i> L. (Lamiaceae) Kraut						
Fichte <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. (Pinaceae) Exkrete						
Stechpalme <i>Ilex aquifolium</i> L. (Aquifoliaceae) Zweige	Ausräuchern bei Husten	Husten	Rind	Stechpalmenzweige und Wacholderzweige am Schatten lufttrocknen. Papier und Holzkohle unten in einen Kessel geben und von jeder Pflanze etwa gleich viel dazugeben, dann 2-3 Schwefelschnitten dazuschenschieben und diese anzünden.	Stall gut verschliessen. Kessel in eine Karette stellen und Schwefelschnitten anzünden. Mit der Karette durch den ganzen Stall fahren und dann stehen lassen, bis es nicht mehr brennt, einmalige Anwendung	1
Gemeiner Wacholder <i>Juniperus communis</i> L. (Cupressaceae) Zweige						
Sadebaum <i>Juniperus sabina</i> L. (Cupressaceae) Zweige						
Weisstanne <i>Abies alba</i> Mill. (Pinaceae) Zweige						

<p>Oregano <i>Origanum vulgare</i> L. (Lamiaceae) Kraut</p>	Erkältungsöl	Erkältung, Husten	Kalb	<p>Ca. 8.75g frisches Thymiankraut, etwas frisches Rosmarinkraut, ca. 8-9g frische Salbeiblätter, 8-10g frisches Oreganokraut und ein paar frische Spitzwegerichblätter in ein 1L Gefäß geben und mit 1L Öl deckend übergießen. Ölauszug für 1-3 Wochen an die Sonne stellen und 2x pro Tag schütteln, absieben sobald der Auszug gut riecht. Danach Thymian-, Rosmarin-, Eukalyptus- und Teebaumöl zufügen (je 10 Tropfen pro Liter Öl). Gut schütteln.</p>	2x täglich etwas Öl am Rücken einmassieren	7
<p>Rosmarin <i>Rosmarinus officinalis</i> L. (Lamiaceae) Kraut</p>						
<p>Garten-Salbei <i>Salvia officinalis</i> L. (Lamiaceae) Blätter</p>						
<p>Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut</p>						
<p>Spitzwegerich <i>Plantago lanceolata</i> L. (Plantaginaceae) Blätter</p>						

Mastitis

Pflanze botanischer Name (Pflanzenfamilie) verwendeter Pflanzenanteil	Rezeptname	Anwendungsgebiet	Tierart	Herstellung	Verabreichung	TD
Arnika <i>Arnica montana</i> L. (Asteraceae)	Arnikaöl	nicht mehr akuter Viertel, nicht heiss, zum Ausheilen	Kuh	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt.	2x täglich nach dem Melken den betroffenen Viertel mit Arnikaöl einreiben	2
Arnika <i>Arnica montana</i> L. (Asteraceae)	Arnikaöl	nicht akuter Viertel, Euter darf nicht heiss sein	Kuh	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt.	2x täglich den betroffenen Viertel mit Arnikaöl massieren	2
Arnika <i>Arnica montana</i> L. (Asteraceae)	Arnikaöl	nicht akuter Viertel	Kuh	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt.	2x täglich nach dem Melken den betroffenen Viertel mit Öl einreiben	2
Arnika <i>Arnica montana</i> L. (Asteraceae)	Arnikaöl	nach akuter Euterentzündung, zur Abheilung	Kuh	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt.	2x täglich betroffenen Viertel mit Arnikaöl einreiben	2

Arnika <i>Arnica montana</i> L. (Asteraceae) Blüte	Arnikaöl	Euterentzündung	Ziege	1L-Flasche zu ca. 2/3 mit frischen Arnikablüten füllen (ca. 30 Blüten) und mit Olivenöl auf 1L auffüllen. 14 Tage an der Sonne ziehen lassen, zwischendurch schütteln. Mit einem Milchfilter absieben und in dunkle Flaschen abfüllen.	2x täglich das Euter mit Arnikaöl einreiben	2
Arnika <i>Arnica montana</i> L. (Asteraceae) Blüte	Arnikatinktur	Viertel	Kuh	5 frische Arnikablüten (ca. 6g) in 1L Bätzi (Obstbrandwein) geben. 3-4 Wochen ziehen lassen, Blüten müssen nicht abgesiebt werden.	betroffenen Viertel morgens und abends mit Arnikatinktur einreiben	2
Stumpfblättriger Ampfer, Blacke <i>Rumex obtusifolius</i> L. (Polygonaceae) Blätter	Blackensalbe	Euterentzündung	Kuh	1/2L-Flasche zur Hälfte mit geschnittenen Blackenblättern füllen und dann auffüllen mit Rapsöl. 3 Wochen am Schatten ziehen lassen, zwischendurch schütteln und dann durch ein Gazetuch absieben. Ölauszug und Bienenwachs über dem Wasserbad erhitzen und dann mischen (7g Bienenwachs auf 50ml Öl), anschliessend in Töpfchen abfüllen.	betroffenen Viertel morgens und abends mit Blackensalbe einreiben	2
Wirz (Wirsing) <i>Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda</i> L. (Brassicaceae) Blätter	Chabissalbe	Euterentzündung	Kuh	8-10 Wirzblätter etwas zerschneiden und mit 2dl Sonnenblumenöl aufkochen. 30min kochen lassen, durch ein Sieb absieben und Blätter gut auspressen. Ca. 100g Bienenwachs über dem Wasserbad schmelzen und mit 2dl warmem Ölauszug mischen, in Töpfchen abfüllen.	2x täglich betroffenen Viertel mit Chabissalbe von oben nach unten massieren	2
Wirz (Wirsing) <i>Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda</i> L. (Brassicaceae) Blätter	Chölisalbe	Mastitis	Kuh	1kg Honigglas mit geschnittenen Wirzblättern locker füllen, auffüllen mit Sonnenblumenöl. An der Sonne 6 Wochen ziehen lassen, durch ein Sieb absieben und gut auspressen. 5dl Ölauszug und 50g Bienenwachs zusammen über dem Wasserbad erwärmen bis der Wachs geschmolzen ist, dann in kleien Töpfchen abfüllen.	betroffenen Viertel 2x täglich nach dem Melken mit Chölisalbe einreiben	2

Echtes Johanniskraut <i>Hypericum perforatum</i> L. (Hypericaceae) Blüte	Johannisöl	Euterentzündung, Anfangsstadium	Kuh	1L-Flasche zu 1/3 mit frischen Johannisblüten füllen und auffüllen mit Olivenöl. 3 Wochen an der Sonne ziehen lassen, 2x pro Woche rühren. Blüten mit einem Sieb absieben und abfüllen.	2x täglich betroffenen Viertel mit Johannisöl einmassieren	2
Echtes Johanniskraut <i>Hypericum perforatum</i> L. (Hypericaceae) Blüte	Johannisöl	Euterentzündungen	Ziege	1L-Flasche zur Hälfte locker mit frischen Johannisblüten füllen und auf 1L auffüllen mit Olivenöl. 14 Tage an der Sonne ziehen lassen, zwischendurch schütteln. Danach durch einen Milchfilter absieben und in Flaschen abfüllen.	2x täglich Euter mit Johannisöl einreiben	2
Fenchel <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. (Apiaceae) Früchte	Mamillenöl	Euterentzündung	Lama	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt. Enthält Arganöl, Olivenöl, Sesamöl und ätherisches Fenchelöl.	1x täglich Euter mit dem Mamillenöl einreiben	1
Gewöhnliche Osterluzei <i>Aristolochia clematitis</i> L. (Aristolochiaceae) Kraut	Osterluzeitee	Euterentzündung	Kuh	Osterluzei an einem gut belüfteten Ort am Schatten trocknen. 2 Hand voll Osterluzeikraut mit 3L heissem Wasser übergießen und ca. 1h ziehen lassen, nicht absieben.	Osterluzeitee in ein Becken geben und ganzes Euter 2x täglich darin baden, ca. 5min	2
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymian	Mastitis	Kuh		1 Hand voll getrockneten Thymian (15-20g) einmal pro Tag übers Futter geben	1
Echte Wallwurz, Beinwell <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae)	Wallwursalbe	Euterverhärtungen oder heisses Euter (nahender Viertel)	Kuh	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt.	betroffenen Viertel 3-4x täglich mit Wallwursalbe einreiben	3

Echte Wallwurz, Beinwell <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae)	Wallwurz-Gel	warmer Viertel	Kuh	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt.	2x täglich nach dem Melken Wallwurzgel auf den betroffenen Viertel auftragen	2
Echte Wallwurz, Beinwell <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae) Wurzel	Wallwurzsalbe	Euterentzündung	Kuh	1 Hand voll geschnittene Wurzelstücke in 1kg Eutra geben und zusammen aufwärmen bis vors Kochen. Danach ca. 2h abkühlen lassen und noch einmal aufwärmen, durch ein Sieb absieben und abfüllen.	2x täglich nach dem Melken betroffenen Viertel mit Wallwurzsalbe einreiben	2
Echte Wallwurz, Beinwell <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae)	Wallwurzsalbe	akuter, heisser Viertel	Kuh	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt.	2x täglich betroffenen Viertel mit Wallwurzsalbe einreiben, 1-2 Tage	1
Echte Wallwurz, Beinwell <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae) Wurzel	Wallwurzsalbe	akute Euterentzündung	Kuh	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt.	2x täglich nach dem Melken den betroffenen Viertel mit Wallwurzsalbe einreiben	2
Echte Wallwurz, Beinwell <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae)	Wallwurzsalbe	Euterentzündung, heiss	Kuh	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt.	2x täglich betroffenen Viertel mit Wallwurzsalbe massieren	2

Echte Wallwurz, Beinwell <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae)	Wallwurzsalbe	akuter Viertel, zum kühlen	Kuh	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt.	mind. 2x täglich betroffenen Viertel mit Wallwurzsalbe einreiben	2
Echte Wallwurz, Beinwell <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae)	Wallwurzsalbe	akute Euterentzündung	Kuh	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt.	2x täglich betroffenen Viertel mit Wallwurzsalbe einreiben	2
Arnika <i>Arnica montana</i> L. (Asteraceae) Blüte	Arnika Massageöl	Euterregeneration nach akutem Viertel	Kuh	fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt	1x täglich etwas Öl in die Euterhaut einmassieren	
Arnika <i>Arnica montana</i> L. (Asteraceae) Blüte	Arnika Massageöl	Anfangsstadium Viertel	Kuh	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt	2x täglich 2 Pumpstöße des Öls einmassieren	
Echte Wallwurz, Beinwell <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae) Wurzel	Dr. Andres Wallwurzsalbe	Euterentzündung	Kuh	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt	2x täglich etwas Gel auf Euter auftragen	2-3 Tage
Echte Wallwurz, Beinwell <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae) Wurzel	Dr. Andres Wallwurzsalbe	Akuter Viertel	Kuh	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt	2x täglich dünn auftragen	1

Echte Wallwurz, Beinwell <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae) Wurzel	Dr. Andres Wallwurzsalbe	Zur Euterkühlung	Kuh	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt	2-4x täglich mit der Hand auftragen und einmassieren	
Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Ringelblumensalbe	Euterentzündung	Kuh	Ca. 3Kg Melkfett verflüssigen, ca. 500g frische Ringelblumenblüten zugeben, 24h zugedeckt stehen lassen, nochmals aufkochen und dann abfüllen	2-3x täglich etwas Salbe am Euter einmassieren	3-4 Tage
Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymian	Viertel	Kuh		1x täglich ca. 9g getrocknetes Thymiankarut zum Futtermittel geben	5
Eibisch <i>Althaea officinalis</i> L. (Malvaceae) Wurzel	Eibischsalbe	Euterentzündung	Kuh	Ca. 3kg Melkfett verflüssigen, eine getrocknete Wurzel reinlegen (ca. 28g), 24hzugedeckt stehen lassen, nochmals aufkochen und dann abfüllen	3x täglich etwas Salbe mit der Hand einmassieren	
Eibisch <i>Althaea officinalis</i> L. (Malvaceae) Wurzel	Eibischsalbe	Viertel	Kuh	1 Teil getrocknete Eibischwurzel mit 3 Teilen kaltem Wasser übergiessen, aufkochen und drei weitere Stunden kochen lassen. Zum Sud aus der Eibischwurzel gibt man 2 Teile Schweineschmalz dazu und erhitzt die Mischung bei kleinem Feuer solange, bis alles Wasser verdunstet ist. Anschliessend durch einen Leinentuch absieben	3x täglich dick auf Euterhaut auftragen	
Hanf <i>Cannabis sativa</i> L. (Cannabaceae) Kraut	Hanfsalbe	Euterentzündung	Kuh	1 Teil Hanf, 2 Teile Vaseline. Vaseline erwärmen, Blüten und Blätter in Pfanne geben, diese gut zudecken und erwärmen bis es schäumt. Mit einem Sieb die Blüten abschöpfen. Vaseline durch ein Tuch absieben so dass die Blätter zurück bleiben. Die abgeschöpften Blüten mit Vaselinöl bedecken, auf 80-90 °C erwärmen und den Ölauszug durch ein Tuch absieben. Ca. 1/3 Ölauszug und 2/3 Vaselinenauszug verwenden.	2x täglich Salbe dick aufs Euter auftragen und einmassieren	

Hanf <i>Cannabis sativa</i> L. (Cannabaceae) Blüte	Hanfsalbe	Euterentzündung	Kuh	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt	2x täglich etwas Salbe einmassieren	
Kampfer <i>Cinnamomum camphora</i> L. (Lauraceae) n.a	Kampfersalbe	Viertel	Kuh	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt	Zuerst gut ausmelken und dann 3-4x täglich Salbe auf Euter auftragen	
Meerrettich <i>Armoracia rusticana</i> P. Gaerten. & al. (Brassicaceae) Wurzel	Meerrettich	Viertel	Kuh	Frischer Meerrettich (ca. 20g) fein raffeln, Natureyoghurt beifügen (ca. 300g) und zu einem Brei vermischen	2x täglich aufs Euter auftragen, nach max. 10 Minuten abspülen	4-5 Tage
Hausmittel						
	Kirsch	Mastitis, heisser Viertel	Kuh		Kirsch auf ein Baumwolltuch geben und betroffenen Viertel damit einreiben, 2x täglich	1
	Kirsch	akuter, heisser Viertel	Kuh		2x täglich betroffenen Viertel mit Kirsch einreiben, 1-2 Tage	1
	Quark	heisser Viertel, Mastitis, zum kühlen	Kuh		betroffenen Viertel rel. dick mit Quark einreiben, einmalige Anwendung	1
	Mehl-Kirsch-Mischung	Mastitis, nicht mehr heiss	Kuh	Ca. 200g Mehl mit 2dl Kirsch mischen, so dass ein gut haftbarer Brei entsteht. Immer frisch verwenden.	2x täglich so viel Brei wie möglich auf den betroffenen Viertel auftragen	2
	Essig-Salz-Mischung	Euterentzündung	Kuh	Ca. 1dl Essig mit 3EL (60g) Salz vermischen.	Mischung 2x täglich auf den betroffenen Viertel auftragen	1

	Quark	Euterentzündung	Kuh		betroffenen Viertel 2x täglich mit Quark einreiben	1
	Lehm-Essig-Mischung	entzündeter Viertel	Kuh	1 Hand voll Anliker Lehm mit so viel Essig mischen, dass eine gut streichfähige Paste entsteht.	betroffenen Viertel 1x täglich mit der Paste einreiben	7
	Mehl-Essig-Salz-Mischung	harter Kreuzviertel mit Fieber, zusätzliche Behandlung, kühlend	Kuh	Je 1/2 Joghurtbecher (180g) Mehl, Salz und Essig mischen, immer frisch verwenden.	ganzer Mehl-Essig-Salz-Brei auf das Euter streichen, einmalige Anwendung	1
	Lehm-Essig-Salz-Mischung	Mastitis, heisser Viertel	Kuh	Ca. 50g Lehm mit so viel Essig mischen, dass eine streichfähige Paste entsteht, dann eine Prise Salz dazugeben, immer frisch verwenden.	betroffenen Viertel 2-3x täglich mit der Paste einreiben	1
	Schnaps	beginnende Mastitis, leichte Fälle nicht akut	Kuh	Bätzi (Obstbrandwein) oder Kräuterschnaps verwenden.	mit einer Sprühflasche auf betroffenen Viertel auftragen	2
	Quark	Euterentzündung	Rind		2x täglich auf Euter auftragen	3-4 Tage
	Salz mit Öl	Mastitis	Rind	Salz mit Speiseöl mischen bis ein dicker Brei entsteht	Dick auf Euter auftragen	4
	Kuhdung	Mastitis	Rind		2x täglich Viertel mit Kuhdung einstreichen, zusätzlich Viehsalz einreiben	1
	Ichthyosalbe 40%	Viertel	Rind	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt	1-2x täglich mit der Hand etwas Salbe auftragen, zusätzlich Viehsalz einreiben	1
	Eiweiss	Viertel	Rind	Eiweiss von 2 Eiern mit Salz und Essig mischen bis Brei dickflüssig ist und kleben kann	2x täglich Brei auftragen	2

	Essig	Anfangsstadium Viertel	Rind		Einmalig 1L Essig einschütten	1
	Obstessig	Chronischer Viertel	Rind		1x täglich ca. 7.5dl Essig eingeben	7
	Obstessig	Akute Euterentzündung	Rind		2-3x täglich ca. 7.5dl Essig eingeben	2
	Apfelessig	Viertel	Rind		Einmalige Gabe von 1.5 Liter Apfelessig	1
	Heilerde mit Schnaps	Bei Milchstau/"Milchfieber"/"hartes Euter"	Schwein	50 g Heilerde mit 2 EL Schnaps in einem Naturgefäß (kein Chromstahl) mischen	mit einem Stäbchen je nach Hitze des Euters mehrmals täglich auf Milchleiste auftragen bis Hitze des Euters raus ist, muss innerhalb eines Tages besser werden	1
Mischungen						
Arnika <i>Arnica montana</i> L. (Asteraceae) Blüte	Arnikaöl	Nachbehandlung akuter Viertel	Kuh	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt.	2x täglich betroffenen Viertel mit Arnikaöl einreiben	7
Hänge-Birke <i>Betula pendula</i> Roth (Betulaceae) Blätter						
Arnika <i>Arnica montana</i> L. (Asteraceae) Blüte	Arnikaöl	nicht heisser Viertel	Kuh	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt.	2x täglich nach dem Melken betroffenen Viertel mit Arnikaöl einreiben	3
Hänge-Birke <i>Betula pendula</i> Roth (Betulaceae) Blätter						

Fruchtbarkeitsstörung und Erkrankungen der weiblichen Genitalien

Pflanze botanischer Name (Pflanzenfamilie) verwendeter Pflanzenanteil	Rezeptname	Anwendungsgebiet	Tierart	Herstellung	Verabreichung	TD
Gemeiner Efeu <i>Hedera helix</i> L. (Araliaceae) Kraut	Efeu	nach der Geburt, Gebärmutterreinigung	Ziege		morgens und abends einen grossen Busch frischen Efeu zum Futter geben	2
Blauer Eucalyptus <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. (Myrtaceae)	Eukalyptusöl	Ausfluss nach der Geburt	Kuh	Fertiges Präparat. 1% Lösung herstellen: 4ml Eukalyptusöl mit heissem Wasser auf 400ml auffüllen.	mit einer Spritze (Aufsatz für Gebärmutter) mit 400ml 1%-iger Lösung Gebärmutter spülen, einmalige Anwendung	1
Blauer Eucalyptus <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. (Myrtaceae)	Eukalyptusöl	Spülung der Gebärmutter nach der Geburt, bei Nachgeburtsverhalten oder Ausfluss	Kuh	Fertiges Präparat. 1%-ige Lösung herstellen: 6ml Eukalyptusöl mit 594ml lauwarmem Wasser mischen.	Gebärmutter mit 1%-iger Eukalyptusöl-Lösung spülen, lauwarm anwenden, einmalige Anwendung	1
Gemeiner Frauenmantel <i>Alchemilla vulgaris</i> L. (Rosaceae) Kraut	Frauenmantel	wenn Kühe nicht stiereig werden wollen, unterstützt Fruchtbarkeit	Kuh		2x täglich 25g getrockneten Frauenmantel zum Futter geben	2
Gemeiner Frauenmantel <i>Alchemilla vulgaris</i> L. (Rosaceae) Kraut	Frauenmantel	nach der Geburt, Fruchtbarkeitskur	Kuh	Frauenmantel an einem gut durchlüfteten Ort am Schatten trocknen.	1 Hand voll Frauenmantel (ca. 5g) morgens und abends ins Mais geben	2

Gemeiner Frauenmantel <i>Alchemilla vulgaris</i> L. (Rosaceae) Kraut	Frauenmänteli	Fruchtbarkeitsprobleme	Kuh		1 Hand voll getrockneten Frauenmantel (ca. 9.6g) morgens und abends direkt ins Maul geben	2
Gemeiner Frauenmantel <i>Alchemilla vulgaris</i> L. (Rosaceae) Kraut	Frauenmänteli	nach schwerer Geburt, stinkender Ausfluss	Kuh		einmal täglich 1 Hand voll getrockneten Frauenmantel (ca. 1.8g) übers Kraftfutter geben	1
Gemeiner Frauenmantel <i>Alchemilla vulgaris</i> L. (Rosaceae) Kraut	Frauenmänteli	Fruchtbarkeitsstörungen, Kur	Kuh		1 EL Frauenmantel (5g) morgens und abends übers Gläck (Salzlecke) geben	2
Gemeiner Frauenmantel <i>Alchemilla vulgaris</i> L. (Rosaceae) Kraut	Frauenmänteli	Fruchtbarkeitsbeschwerden, wenn Tiere nicht tragen wollen	Kuh		1 Hand voll getrockneten Frauenmantel (10g) morgens und abends in den Mais geben	2
Gemeiner Frauenmantel <i>Alchemilla vulgaris</i> L. (Rosaceae) Kraut	Frauenmänteli	Geburtsvorbereitung	Ziege		ca. 1g getrocknetes Frauenmänteli morgens und abends übers Futter geben	2
Gemeiner Frauenmantel <i>Alchemilla vulgaris</i> L. (Rosaceae) Kraut	Frauenmänteli	Fruchtbarkeit, bockig werden	Ziege		ca. 1g getrocknetes Frauenmänteli morgens und abends übers Futter geben	2
Himbeere <i>Rubus idaeus</i> L. (Rosaceae) Zweige	Himbeerstaude	Kur vor und nach der Geburt, unterstützt Gebärmutter und Fruchtbarkeit	Ziege	Himbeerstauden aufhängen und am Schatten trocknen.	abends eine Hand voll Himbeerzweige (ca. 15g) zum Futter geben	1

Kaffee pflanze <i>Coffea</i> L. (Rubiaceae) Samen	Kaffee-Schnaps	nach Kalben, damit Kuh nicht ausdrückt	Kuh	1 gehäufter EL Kaffeepulver (ca. 10g) mit 1L heissem Wasser übergießen. 4EL Zucker und 1dl Träsch (Obstbrandwein), lauwarm verwenden.	nach der Geburt mit einer Flasche Kaffee-Schnaps eingeben, einmalige Anwendung	1
Knoblauch <i>Allium sativum</i> L. (Amaryllidaceae) Zwiebel	Knoblauch	Fruchtbarkeit unterstützend	Kuh	15 Knoblauchzehen (ca. 80g) rüsten, hacken und in 1L Milch aufkochen und dann pürieren, lauwarm verabreichen.	2x täglich 1L Milch-Knoblauch-Mischung verabreichen, eine Woche später wiederholen	14
Flachs/Lein <i>Linum usitatissimum</i> L. (Linaceae) Samen	Leinsamen	Geburtsvobereitung, Schleimproduktion anregen	Kuh		1x täglich 1 Joghurtbecher voll Leinsamen (ca. 150g) über Gläck (Salzlecke) geben	1
Flachs/Lein <i>Linum usitatissimum</i> L. (Linaceae) Samen	Leinsamen	Schleimproduktion anregen vor der Geburt	Ziege		morgens und abends 1 Hand voll Leinsamen (ca. 8g) zum Kraftfutter geben	2
Flachs/Lein <i>Linum usitatissimum</i> L. (Linaceae) Samen	Leinsamen	4-5 Tagen vor der Geburt, Schleimproduktion anregen	Ziege		1 Hand voll Leinsamen (ca. 6g) morgens und abends direkt mit der Hand verfüttern	2
Flachs/Lein <i>Linum usitatissimum</i> L. (Linaceae) Samen	Leinsamen	Geburtsvorbereitung, Schleimproduktion anregen Gebärmutter	Ziege		ca. 1.5g Leinsamen übers Futter geben am Abend	1
Winter-Linde <i>Tilia cordata</i> Mill. (Malvaceae) Blüten	Lindenrinde	Ausputzmittel	Kuh	Lindenrinde in Streifen schneiden, auslegen und am Schatten lufttrocknen und anschliessend mit der Schlagmühle mahlen.	1 Hand voll Lindenrindenpulver (ca. 20g) morgens und abends zum Futter geben	2

Majoran <i>Origanum majorana</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Majorantee	Probleme mit der Nachgeburt, Nachgeburtverhalten	Kuh	5 EL Majoran (ca.20g) mit 5 dl heissem Wasser übergiesen und ziehen lassen bis Tee lauwarm ist, Majoran nicht absieben.	0.5 L Tee mit einer Flasche einschütten	1
Winter-Linde <i>Tilia cordata</i> Mill. (Malvaceae) Rinde	Reinigungstrank	Nachgeburtverhalten, Reinigungskur nach der Geburt	Kuh		1 Hand voll Reinigungstrank 2x täglich zum Futter geben	2
Winter-Linde <i>Tilia cordata</i> Mill. (Malvaceae) Rinde	Reinigungstrank	Ausputzmittel nach der Geburt	Ziege		1 gestrichener EL Lindenrindenpulver (ca. 12.5g) morgens und abends übers Futter geben	2
Garten-Salbei <i>Salvia officinalis</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Salbeitee	Ausputzen nach der Geburt	Kuh	1 Hand voll frischen Salbei (ca. 20g) mit 2L heissem Wasser übergiesen und über Nacht ziehen lassen. Am nächsten Morgen durch ein Sieb absieben und eingeben.	2L Salbeitee am Morgen mit der Flasche eingeben	1
Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i> L. (Asteraceae) Kraut	Schafgarbentee	Ausputzen nach der Geburt, eher bei älteren Tieren und Problemfällen	Kuh	Schafgarbenbüschel am Schatten aufhängen und lufttrocknen. 2 Hand voll Schafgarbenkraut (ca. 20g) mit 10L heissem Wasser übergiesen und 10-15min ziehen lassen, durch ein Sieb absieben und lauwarm verwenden.	10L Schafgarbentee in einen Kessel geben und am Morgen verabreichen	1
Silberdistel <i>Carlina acaulis</i> L. (Asteraceae) Wurzel	Silberdistel	Brunstmittel, damit Tiere besser stierig werden	Kuh		1 Hand voll getrocknete Wurzelstücke (ca. 12g) einmal täglich zum Futter geben	1
Ruprechtskraut (Stinkender Storchschnabel) <i>Geranium robertianum</i> L. (Geraniaceae) Kraut	Storchschnabel	Fruchtbarkeitsprobleme	Kuh		1 EL getrocknetes Storchschnabelkraut (5g) morgens und abends übers Futter geben	2

Ruprechtskraut (Stinkender Storchschnabel) <i>Geranium robertianum</i> L. (Geraniaceae) Kraut	Storchschnabel	Ausputzmittel nach der Geburt	Kuh		1 EL getrocknetes Storchschnabelkraut (5g) morgens und abends übers Futter geben	1
Gemeiner Wacholder <i>Juniperus communis</i> L. (Cupressaceae) Beeren	Wacholderbeeren	Probleme mit Brunst, nicht stierig werden	Kuh		ca. 50g Wacholderbeerenpulver 1x täglich übers Gläck (Salzlecke) geben	1
Weisstanne <i>Abies alba</i> Mill. (Pinaceae) Zweige	Weisstanne	Ausputzmittel nach der Geburt	Ziege		morgens und abends 2 Tannenäste auf 5 Ziegen verteilen, zum Futter geben	2
Weisstanne <i>Abies alba</i> Mill. (Pinaceae) Zweige	Weisstanne	Ausputzen nach der Geburt	Ziege		1 Hand voll Tannenaststücke 2x täglich zum Futter geben	2
Weisstanne <i>Abies alba</i> Mill. (Pinaceae) Zweige	Weisstanne	nach der Geburt, Ausputzmittel	Ziege		am Abend ein Weisstannenast (ca. 50cm, ca. 200g) zum Futter geben	1
Weisstanne <i>Abies alba</i> Mill. (Pinaceae) Zweige	Weisstanne	Ausputzen nach der Geburt	Ziege		1 Hand voll kleinere Tannenstücke (ca. 40g) ins Futter geben	2
Weisstanne <i>Abies alba</i> Mill. (Pinaceae) Zweige	Weisstanne	Ablösen der Nachgeburt, Ausputzen	Ziege	Weisstannenäste mit dem Gartenhäcksler zerkleinern zu ca. 1cm grossen Stücken.	eine Hand voll frische Tannenstücke (ca. 100-150g) am Abend übers Futter geben	1
Weisstanne <i>Abies alba</i> Mill. (Pinaceae) Zweige	Weisstannenäste	Ausputzen nach der Geburt	Ziege		über die ganze Winterfütterung Tannenäste im Stall aufhängen; Tiere können so viel davon fressen, wie sie wollen	
Weisstanne <i>Abies alba</i> Mill. (Pinaceae) Zweige	Weisstannenäste	Ausputzen nach der Geburt, Vitalität steigern	Kuh		über die ganze Winterfütterung Tannenäste im Stall aufhängen; Tiere können so viel davon fressen, wie sie wollen	

Echter Zimtbaum <i>Cinnamomum verum</i> J.Presl (Lauraceae) Rinde	Zimt	Nachgeburtverhalten, ablösen der Nachgeburt	Kuh		4-5 mal täglich 1 EL Zimt (ca. 5g) direkt eingeben, damit die Tiere möglichst viel schlucken	4
Echter Zimtbaum <i>Cinnamomum verum</i> J.Presl (Lauraceae) Rinde	Zimt	Brunstanregung, wenn Tiere nicht bockig werden	Ziege		ca. 1/3KL Zimt zum Karftfutter geben morgens und abends	2
Echter Zimtbaum <i>Cinnamomum verum</i> J.Presl (Lauraceae) Rinde	Zimt	Brunstanregung, wenn Kühe nicht stierig werden	Kuh		1KL Zimt ins Karftfutter mischen morgens und abends	2
Gemeine Zwiebel <i>Allium cepa</i> L. (Amaryllidaceae) Zwiebel	Zwiebel mit Melkfett	wenn der Muttermund sich nicht öffnet, Entspannung der Muskulatur	Kuh	100g Melkfett mit einer fein geschnittenen Zwiebel (ca. 100g) mischen.	ganzer Brei mit der Hand auf den Muttermund streichen	1
Arnika <i>Arnica montana</i> L. (Asteraceae) Blüte	Arnikatinktur	Euterverhärtungen, Ödeme	Kuh	5 frische Arnikablüten (ca. 6g) in 1L Bätzi (Obstbrandwein) geben. 3-4 Wochen ziehen lassen, Blüten müssen nicht abgeseiht werden.	Euter mind. 2x täglich mit Arnikatinktur einreiben	2
Walnussbaum <i>Juglans regia</i> L. (Juglandaceae) Blätter	Bremsenmittel mit Nussbaumlaub	Insektenschutzmittel	Pferd	1 Hand voll frisches Nussbaumlaub (ca. 25g) mit 1L Essig aufkochen und 15min kochen lassen, danach durch ein Sieb geben und abfüllen in eine Sprühflasche.	am Morgen die Pferde mit dem Bremsenmittel einsprühen, ganzen Sommer über	1
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Kraut	Brennessel	Euterödem	Kuh	Getrocknete Pflanze verwenden.	1x täglich ein Busch mit ca. 20-30 Brennesseln zum Heu geben	1
Arnika <i>Arnica montana</i> L. (Asteraceae) Blüte	Arnika Massageöl	Vor dem Kalben zum Wärmen	Rind	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt	Einmalig etwas Öl einmassieren	1
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Weisser Ausfluss	Schwein	Ca. 6g getrocknete Kamillenblüten mit 4L hiessem Wasser überbrühen, 10-15 Minuten ziehen lassen, absieben	Einmalig 2x täglich mit einem kleinen Schlauch Scheide auswaschen	1

Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Entzündung nach dem Kalben	Rind	Ca. 6g getrocknete Kamillenblüten mit 4L hiessem Wasser überbrühen, 10-15 Minuten ziehen lassen, absieben	Einmalig 2x täglich mit einem kleinen Schlauch Scheide auswaschen	1
Echtes Johanniskraut <i>Hypericum perforatum</i> L. (Hypericaceae) Blüte	Johannisöl	Nach einer Schweregeburt	Rind	Frische Blüten (ca. 2.8g) mit Olivenöl bedecken (ca. 2dl), 6 Wochen in einem lichtgeschützten Fläschchen an Sonne stellen, abfiltrieren mit einem Öl-Filter	Ca. 4 handvoll des Öls 2 x täglich auf Haut auftragen (v. a. Rückenbereich) und einmassieren	2
Lorbeer <i>Laurus nobilis</i> (Lauraceae) Früchte	Traxaxan Lorbeerfrüchte-Versäuberungspulver	Nach dem Kalben zum Ausputzen	Rind	Ca. 3 EL Lorbeerfrüchtepulver in lauwarmes Wasser rühren	2x täglich im Abstand von 12h ca. 0.5L der Flüssigkeit eingeben	1
Lein <i>Linum usitatissimum</i> L. (Linaceae) Samen	Leinsamen	Vor dem Kalben	Rind	Brei kochen	2x täglich 1 Woche vor dem Kalben einschütten	7
Lein <i>Linum usitatissimum</i> L. (Linaceae) Samen	Leinsamen	Vor dem Kalben zur Erleichterung der Geburt	Rind		2x täglich für 2-3 Tage vor dem Kalben ca. 18g Leinsamen ins Futter geben	2-3 Tage
Hirtentäschli <i>Capsella bursa-pastoris</i> L. (Brassicaceae) Kraut	Hirtentäschli	Zum stierig werden, Brunst	Rind		2-3x pro Monat frisches Hirtentäschlikraut im Futtermittel verabreichen	
Bärentraube <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Sprengel (Ericaceae) Blätter	Bärentraubenblätterttee	Nieren/Blasenentzündung	Rind	2 EL getrocknete Bärentraubenblätter in kaltem Wasser aufkochen, 10 Minuten ziehen lassen und dann absieben	2x täglich 1L Bärentraubentee eingeben	3
Apfel <i>Malus domestica</i> Borkh. (Rosaceae) Früchte	Zimtapfel	Anregung zur Plazentaablösung nach dem Kalben	Rind	Den Apfel halbieren und 1 KL Zimt in eine Apfelhälfte streuen und dann zweite Apfelhälfte draufdrücken	Einmalige Gabe eines Zimtapfels nach dem Kalben	1
Weicher Frauenmantel <i>Alchemilla mollis</i> (Rosaceae) Kraut	Frauenmäntelkraut	Vor/Nach dem Kalben	Rind		1x täglich (2 Wochen vor, 2 Wochen nach dem Kalben) 40g getrocknetes Frauenmäntelkraut zum Futter geben	28

Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Blätter	Brennesseltee	Ausputzmittel nach der Geburt	Ziege	Ca. 25g getrocknete Brennesselblätter mit 3L heissem Wasser übergossen und 10min ziehen lassen. Danach durch ein Sieb absieben und ca. 3EL Zucker dazugeben, immer frisch verwenden.	1L Brennesseltee morgens und abends mit einem Kessel verabreiche	2
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Blätter	Brennesseltee	Ausputzmittel nach der Geburt	Kuh	Ca. 25g getrocknete Brennesselblätter mit 3L heissem Wasser übergossen und 10min ziehen lassen. Danach durch ein Sieb absieben und ca. 3EL Zucker dazugeben, immer frisch verwenden.	1L Brennesseltee morgens und abends mit einem Kessel verabreiche	2
Bockshornklee <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. (Fabaceae) Samen	Bockshornkleesamen	Fruchtbarkeit, bockig werden	Ziege		2x täglich 1 Kaffeelöffel (5g) Bockshornkleesamen über Salzlecke geben	2
Hausmittel						
	geröstetes Salz	nicht stierig werden	Kuh	In einer alten Bratpfanne Salz rösten ca. 30min, regelmässig rühren.	100g geröstetes Salz 2x täglich übers Futter geben oder mit der Hand verabreichen	5

Mischungen						
Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i> L. (Asteraceae) Kraut	Fruchtbarkeitsmischung	Fruchtbarkeitsunterstützung nach der Geburt, sobald die Tiere wieder trächtig werden können	Kuh	5 Teile Frauenmantelkraut, 5 Teile Gänsefingerkraut und 4 Teile Schafgarbenkraut in einem 1L Messbecher abmessen und mischen.	1x täglich eine Hand voll Mischung (ca. 15-20g) übers Futter geben	50
Gemeiner Frauenmantel <i>Alchemilla vulgaris</i> L. (Rosaceae) Kraut						
Gänse-Fingerkraut <i>Potentilla anserina</i> L. (Rosaceae) Kraut						
Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i> L. (Asteraceae) Kraut	Geburtsmischung	Geburtsvorbereitung	Kuh	5 Teile Himbeerblätter, 5 Teile Frauenmantelkraut, 3 Teile Schafgarbenkraut, 2 Teile Brennesselkraut und 3 Teile Melissenkraut in einem 1L-Messebecher abmessen und mischen.	1x täglich eine Hand voll Mischung (ca. 15-20g) übers Futter geben	10
Zitronenmelisse <i>Melissa officinalis</i> L. (Lamiaceae) Kraut						
Gemeiner Frauenmantel <i>Alchemilla vulgaris</i> L. (Rosaceae) Kraut						
Himbeere <i>Rubus idaeus</i> L. (Rosaceae) Blätter						
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Kraut						

Gemeiner Wacholder <i>Juniperus communis</i> L. (Cupressaceae) Zweige	Ausputztrank aus Fichte und Wacholder	Ausputzmittel nach Kalben	Kuh	3-4 frische Tannenäste und 2-4 frische Wacholderäste mit 10L Wasser aufkochen und absieben.	0.5-1L lauwarmen Tee 1x täglich mit einer Flasche verabreicht	7
Fichte <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. (Pinaceae) Zweige						
Gemeiner Frauenmantel <i>Alchemilla vulgaris</i> L. (Rosaceae) Kraut	Ausputztrank	Ausputzen nach der Geburt	Kuh	Frauenmantelkraut, Schafgarbenkraut und Himbeerzweige am Schatten lufttrocknen. 500g frische Weisstannenzweige, 120g frische Wacholderzweige, 100g frische Heidelbeerzweige, 100g frische Brombeerzweige, 100g getrocknete Himbeerzweige, 40g getrocknete Schafgarbe, 30g getrockneter Frauenmantel und 50g frische Stechpalmenzweige. 1/3 einer 10L Pfanne mit der Pflanzenmischung füllen und dann auffüllen mit Wasser, aufkochen und ca. 10min kochen, abkühlen lassen und dann durch ein Sieb absieben.	2x täglich 1L Ausputztrank mit einer Flasche eingeben	3
Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i> L. (Asteraceae) Kraut						
Stechpalme <i>Ilex aquifolium</i> L. (Aquifoliaceae) Zweige						
Heidelbeere <i>Vaccinium myrtillus</i> L. (Ericaceae) Zweige						
Brombeere <i>Rubus fruticosus</i> L. (Rosaceae) Zweige						
Himbeere <i>Rubus idaeus</i> L. (Rosaceae) Zweige						

Gemeiner Wacholder <i>Juniperus communis</i> L. (Cupressaceae) Zweige						
Weisstanne <i>Abies alba</i> Mill. (Pinaceae) Zweige						
Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i> L. (Asteraceae) Kraut	Fruchtbarkeitsmischung	Probleme nach der Geburt, Nachgeburtverhalten	Kuh	Eine Mischung herstellen mit 300g getrocknetem Frauenmantelkraut, 300g getrocknete Brennesselblätter und 300g getrocknetem Schafgarbenkraut.	1 Hand voll Fruchtbarkeitsmischung morgens und abends direkt ins Maul geben	14
Gemeiner Frauenmantel <i>Alchemilla vulgaris</i> L. (Rosaceae) Kraut						
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Blätter						
Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i> L. (Asteraceae) Kraut	Frauenmänteli und Schafgarbe	Fruchtbarkeitsprobleme	Kuh	Schafgarbenbüschel am Schatten aufhängen und lufttrocknen und Frauenmantel auf einem Gitter am Schatten trocknen. 500g Frauenmantel und 1kg Schafgarbe mischen.	2 Hand voll der Mischung morgens und abends übers Gläck geben	10
Gemeiner Frauenmantel <i>Alchemilla vulgaris</i> L. (Rosaceae) Kraut						

Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i> L. (Asteraceae) Kraut	Frauenmänteli und Schafgarbe	nach Kalben, zum Ausputzen	Kuh	Schafgarbenbüschel am Schatten aufhängen und lufttrocknen und Frauenmantel auf einem Gitter am Schatten trocknen. 500g Frauenmantel und 1kg Schafgarbe mischen.	2 Hand voll der Mischung morgens und abends übers Glück (Salzlecke) geben	10
Gemeiner Frauenmantel <i>Alchemilla vulgaris</i> L. (Rosaceae) Kraut						
Stechpalme <i>Ilex aquifolium</i> L. (Aquifoliaceae) Zweige	Ausputztrank	Ausputzen nach der Geburt, 7 Tagekur	Kuh	4 Stechpalmenäste (Spitzen, 15-20cm), 1-1.5m Efeu, 2 kräftige Wacholderzweige (à 20cm) 5 Tannenspitzen (15-20cm), 6 Brombeeräste (à 0.5m) mit der Baumschere zu 2-4cm grossen Stücken zerschneiden. Schafgarbe und Kamille am Schatten aufhängen zum trocknen. 4 geschnittene Stechpalmenäste, 2 getrocknete Schafgarbenstauden, 5 geschnittene Tannenspitzen, 6 Brombeeräste, 2 Wacholderzweige, 10-15 Kamillenstängel (sicher 1 Hand voll Blüten) in 16L Wasser geben, aufkochen und 2h bei 80°C kochen, nicht absieben.	morgens und abend 1L Ausputztrank mit einer Flasche einschütten, immer kurz im Wasserkocher erwärmen	7
Gemeiner Efeu <i>Hedera helix</i> L. (Araliaceae) Kraut						
Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i> L. (Asteraceae) Kraut						
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Kraut						
Gemeiner Wacholder <i>Juniperus communis</i> L. (Cupressaceae) Zweige						

Weisstanne <i>Abies alba</i> Mill. (Pinaceae) Zweige						
Brombeere <i>Rubus fruticosus</i> L. (Rosaceae) Kraut						
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. (Fagaceae) Rinde	Putztrank	Ausputzen nach der Geburt	Kuh	Ca. 10kg Gerste, ca. 1kg frische Eichenrinde und ca. 1kg frische Brennesseln in 45L Wasser geben und aufkochen, ca. 30 min kochen und bis am Abend ziehen lassen (6-8h), dann durch ein Sieb geben.	1x täglich 10L Putztrank in einen Kessel verabreichen	4
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Ganzpflanze mit Wurzel						
Saat-Gerste <i>Hordeum vulgare</i> L. (Poaceae) Samen						
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Ganzpflanze mit Wurzel	Ausputztrank	Ausputzen, nach problematischen Geburten oder Nachgeburtverhalten	Kuh	1 Hand voll Tannensprösslinge (junge Zweige), 1 Hand voll frische Brennesseln, 1 Hand voll frische Wacholderzweige mit Beeren und 10-15 frische Bärlauchblätter in 1L kaltes Wasser geben, aufkochen und über Nacht ziehen lassen, danach absieben durch ein Sieb.	1L Ausputztrank mit der Flasche eingeben, einmalige Anwendung	1
Gemeiner Wacholder <i>Juniperus communis</i> L. (Cupressaceae) Zweige						
Weisstanne <i>Abies alba</i> Mill. (Pinaceae) Zweige						
Bärlauch <i>Allium ursinum</i> L. (Amaryllidaceae) Blätter						

<p>Echter Zimtbaum <i>Cinnamomum verum</i> J.Presl (Lauraceae) Rinde</p>	Brunstwecker	wenn Kuh nicht stiereig werden will, Brunstwecker	Kuh	1 gestrichener KL Gewürznelke, 1 gestrichener KL weisser Pfeffer, 10-12 getrocknete Wacholderbeeren und 1 Messerspitze Zimt in 2dl Träsch (Obstbrandwein) geben und 3-5 Tgae ziehen lassen, jeden Tag schütteln, dann 0.5L Wasser dazugeben.	mit einer Flasche den Brunstwecker eingeben, einmalige Anwendung	1
<p>Gemeiner Wacholder <i>Juniperus communis</i> L. (Cupressaceae) Früchte</p>						
<p>Pfeffer <i>Piper nigrum</i> L. (Piperaceae) Samen</p>						
<p>Gewürznelke <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry (Myrtaceae) Früchte</p>						
<p>Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i> L. (Asteraceae) Blüte</p>	Lebermischung	Kur vor Kalbern	Kuh	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt	1x täglich für 2 Wochen vor dem Kalben geben (nach Anleitung des Präparates)	14
<p>Geissraute <i>Galega officinalis</i> L. (Fabaceae) Kraut</p>						
<p>Bockshornklee <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. (Fabaceae) Samen</p>						
<p>Gelber Enzian <i>Gentiana lutea</i> L. (Gentianaceae) Wurzel</p>						

Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae)						
Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe <i>Alchemilla millefolium</i> L. (Asteraceae) Blüte	Lebermischung	Leberentgiftung zur Zeit des Kalbens	Kuh	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt	2x täglich ca. 2EL ins Kraftfutter geben, während 5 Tagen vor/nach dem Kalben	10
Geissraute <i>Galega officinalis</i> L. (Fabaceae) Kraut						
Bockshornklee <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. (Fabaceae) Samen						
Gelber Enzian <i>Gentiana lutea</i> L. (Gentianaceae) Wurzel						
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae)						

Hautveränderungen und Wunden (inkl. Augen, Hufen und Klauen)

Pflanze botanischer Name (Pflanzenfamilie) verwendeter Pflanzenanteil	Rezeptname	Anwendungsgebiet	Tierart	Herstellung	Verabreichung	TD
Arnika <i>Arnica montana</i> L. (Asteraceae)	Arnikasalbe	offene Wunden, Wundbehandlung	Rind	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt.	2x täglich Arnikasalbe gut deckend auf die Wunde auftragen	2
Arnika <i>Arnica montana</i> L. (Asteraceae) Kraut	Arnikatinktur	Gelenksbeschwerden, Verstauchung	Rind	1L-Einmachglas zur Hälfte locker mit Arnikakraut füllen und auffüllen mit Bätzi (Obstbrandwein). 3 Wochen an der Sonne ziehen lassen und jeden Tag schütteln. Durch einen Kaffeefilter absieben und abfüllen.	Tuch mit Arnikatinktur tränken und mit einer Binde auf die betroffene Stelle binden, morgens und abends wechseln	2
Gemeine Berberitze <i>Berberis vulgaris</i> L. (Berberidaceae) Zweige	Berberitze	Flechten	Kuh		1 Bündel mit 3 Berberitzenzweigen an der Decke im Stall aufhängen	
Gemeine Berberitze <i>Berberis vulgaris</i> L. (Berberidaceae) Zweige	Berberitze	Flechte	Rind		3-4 einzelne Berberitzenzweige im Stall an der Decke aufhängen, nach 1 Monat wechseln	
Gemeine Berberitze <i>Berberis vulgaris</i> L. (Berberidaceae) Zweige	Berberitze	Flechten	Rind		2 Bündel mit mehreren Berberitzenästen im Stall an der Decke aufhängen, nach 1/2 Jahr auswechseln	
Gemeine Berberitze <i>Berberis vulgaris</i> L. (Berberidaceae) Zweige	Berberitze	Flechten	Rind		mehrere Berberitzenzweige im Stall an der Decke aufhängen über dem betroffenen Tier	

Gemeine Berberitze <i>Berberis vulgaris</i> L. (Berberidaceae) Zweige	Berberitze	Flechten	Rind		an mehreren Stellen im Stall mehrere Berberitzenäste aufhängen	
Gemeine Berberitze <i>Berberis vulgaris</i> L. (Berberidaceae) Zweige	Berberitze	Flechten	Rind		mehrere Berberitzenäste an verschiedenen Orten im Stall an der Decke aufhängen	
Gemeine Berberitze <i>Berberis vulgaris</i> L. (Berberidaceae) Zweige	Berberitze	gegen Flechten	Rind		ein Bund mit 3-5 Berberitzenästen an der Decke im Stall aufhängen, nach 3-4 Wochen wechseln	
Stumpflättriger Ampfer, Blacke <i>Rumex obtusifolius</i> L. (Polygonaceae) Blätter	Blackenblätterwickel	eitrige Wunden	Rind		mit einer Gazebinde 1-2 Blackenblätter auf die Wunde legen	1
Stumpflättriger Ampfer, Blacke <i>Rumex obtusifolius</i> L. (Polygonaceae) Blätter	Blackensalbe	Strichverletzungen	Rind	Ca. 100-200g frische Blackenwurzel fein schneiden und mit 1/2L Olivenöl mischen. 3 Wochen an der Sonne ziehen lassen und dann durch einen Kaffeefilter absieben. 5dl Ölaszug und 100g Bienenwachs über dem Wasserbad erwärmen und zusammen mischen und in Töpfchen abfüllen. Erst verschliessen, wenn gut die Salbe gut abgekühlt ist.	2x täglich betroffene Stelle mit Blackensalbe einreiben	2
Gemeiner Tormentill <i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch. (Rosaceae) Wurzel	Blutwurz mit Honig	offene Wunden	Rind	1 KL (ca. 3g) Blutwurzpulver mit 1 KL Honig (ca. 10g) mischen, immer frisch verwenden.	Wunde mehrmals täglich mit der Blutwurz-Honig-Mischung füllen	3
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Kraut	Brennessel	Abszesse	Lama	Brennesseln draussen auf einem Tuch ausbreiten und lufttrocknen.	1 grosse Hand voll Brennesseln (ca.17g) 1x täglich übers Heu geben	1

Wirz (Wirsing) <i>Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda</i> L (Brassicaceae) Blätter	Chabiswickel	eitrige Wunden	Rind	Wirzblätter fein schneiden.	geschnittene Wirzblätter auf eine Gaze geben und auf die betroffene Stelle legen, mit einer Binde befestigen	12
Kleine Malve <i>Malva neglecta</i> Wallr. (Malvaceae) Kraut	Chäslichrut	Wundbehandlung	Rind	Chäslichrut auf dem Ofen trocknen. 1 L Wasser aufkochen, 10 g Chäslikraut mit dem Wasser übergießen und 10-15 min ziehen lassen. Absieben mit Sieb und lauwarm verwenden.	2x täglich Wunde mit Chäslichruttee auswaschen, relativ heiss verwenden, so dass es das Tier noch gerade aushalten kann	2
Kleine Malve <i>Malva neglecta</i> Wallr. (Malvaceae) Blätter	Chäslichrutbad	Wunden an der Klaue	Rind	6-7 Chäslichrutblätter in 4L kaltes Wasser geben und aufkochen. Ca. 15min kochen lassen, Blätter nicht absieben.	2x täglich 4L lauwarmen Chäslichruttee in einen Kessel geben und Klaue wenn möglich 10min darin baden	2
Kleine Malve <i>Malva neglecta</i> Wallr. (Malvaceae) Kraut	Chäslichrutbad	Klauenentzündungen	Rind	Chäslichrut an einem gut durchlüfteten Ort am Schatten trocknen. 1 Hand voll getrocknetes Chäslichrut (ca. 4g) mit 4.5L heissem Wasser übergießen und ca. 20 min ziehen lassen. Chäslichrut nicht absieben, immer frisch verwenden.	1x täglich 4.5 L Chäslichruttee mit Kraut in einen Kessel geben und wenn möglich die Klaue 15-20 min darin baden	1
Kleine Malve <i>Malva neglecta</i> Wallr. (Malvaceae) Kraut	Chäslichrutsalbe	eitrige Wunden	Rind	1/2L-Einmachglas locker mit geschnittenen Pflanzenteilen füllen und mit Olivenöl auffüllen. 3 Wochen an der Sonne ziehen lassen, jeden Tag schütteln und danach durch einen Kaffeefilter absieben. 80g Bienenwachs und 4dl Ölauszug über dem Wasserbad erwärmen und mischen. 3-4 tropfen ätherisches Öl dazugeben (z.B. Lavendel) zum konservieren. In Töpfchen abfüllen und gut abkühlen lassen, bevor man diese verschliesst.	1-2x täglich auf die betroffene Stelle Chäslichrutsalbe auftragen	2

Kleine Malve <i>Malva neglecta</i> Wallr. (Malvaceae) Kraut	Chäslichruttee	Klauengeschwüre, Wunden an den Klauen	Rind	An einem gut durchlüfteten Ort am Schatten Chäslichrutbüschel zum trocknen aufhängen oder auf dem Dörrex trocknen. 2 Hand voll getrocknetes Chäslichrut (ca. 12g)mit 2L heissem Wasser übergiessen und zugedeckt 10-15min ziehen lassen, danach absieben durch ein Sieb.	3-4x täglich einen Klauenverband mit so viel Chäslichruttee wie möglich tränken, sollte immer feucht sein, nach 4-5 Tagen den Verband wechseln	3
Kleine Malve <i>Malva neglecta</i> Wallr. (Malvaceae) Kraut	Chäslichruttee	Klauentzündungen	Kuh	1 Hand voll frische Malve mit 1L heissem Wasser übergiessen und 10min ziehen lassen und danach mit einem Sieb absieben. Immer frisch verwenden.	ein Kessel füllen mit Malventee, möglichst warm verwenden, wenn möglich ca. 5min baden, 2x täglich	2
Kleine Malve <i>Malva neglecta</i> Wallr. (Malvaceae) Kraut	Chäslichruttee	offene Wunden, Entzündungen	Rind	1 Hand voll frische Malve mit 1L heissem Wasser übergiessen und 10min ziehen lassen und danach mit einem Sieb absieben. Immer frisch verwenden.	2x täglich eine offenen Wunde mit einer Spritze mit dem Malventee ausspülen	2
Purpur-Sonnenhut <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench (Asteraceae) Blüte	Echinaceapuder	zwischen Ballenekzem, nässend	Hund	100g Talk oder Babypuder mit 5g gemahlener Echinacea mischen.	3x täglich Echinaceapuder auf die betroffene Stelle auftragen	3
Purpur-Sonnenhut <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench (Asteraceae) Blüte	Echinaceapuder	Sommerekzem, zum trocknen	Pferd	100g Talk oder Babypuder mit 5g gemahlener Echinacea mischen.	3x täglich Echinaceapuder auf die betroffenen Stellen geben, ganzen Sommer über	3
Wald- Erdbeere <i>Fragaria vesca</i> L. (Rosaceae) Blätter	Erdbeerblätterverband	Klauentzündung	Rind	Erdbeerblätter etwas zerquetschen vor der Verwendug.	Wunde mit Erdbeerblätter abdecken und mit einer Binde einbinden, täglich wechseln	1
Wald- Erdbeere <i>Fragaria vesca</i> L. (Rosaceae) Blätter	Erdbeerblätterverband	offene Wunden	Rind	Erdbeerblätter etwas zerquetschen vor der Verwendug.	Wunde mit Erdbeerblätter abdecken und mit einer Binde einbinden, täglich wechseln	1
Fichte <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. (Pinaceae) Exkrete	Fichtenharzsalbe	Abszesse	Rind	15g Fichtenharz und 10g Bienenwachs zusammen über dem Wasserbad schmelzen. Wenn der Wachs geschmolzen ist, 100ml warmes Olivenöl dazugeben. 2-3 Tropfen ätherisches Öl dazugeben (z.B. Fichte) zum konservieren.	2x täglich betroffene Stelle mit Fichtenharzsalbe einreiben	2

Gemeine Berberitze <i>Berberis vulgaris</i> L. (Berberidaceae) Zweige	Hagedorn	Flechten	Rind		2-3 Berberitzenäste über dem betroffenen Tier aufhängen	
Fichte <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. (Pinaceae) Exkrete	Harzsalbe	Nabelentzündung	Kalb	1/4 Tannenharz und 3/4 Schweinefett über dem Wasserbad erhitzen, gut rühren bis Harz aufgelöst ist.	Harzsalbe auf ein Tuch geben und auf den Nabel legen, ein Frotteetuch darauflegen und mit einer Binde befestigen	1
Echtes Johanniskraut <i>Hypericum perforatum</i> L. (Hypericaceae) Blüte	Johannisöl	Zitzenverletzungen	Kuh	1L-Flasche zu 1/3 mit frischen Johannisblüten füllen und auffüllen mit Olivenöl. 3 Wochen an der Sonne ziehen lassen, 2x pro Woche rühren. Blüten mit einem Sieb absieben und abfüllen.	2x täglich nach dem Melken Johannisöl auf die Zitzen auftragen	2
Echtes Johanniskraut <i>Hypericum perforatum</i> L. (Hypericaceae) Blüte	Johannisöl	Strichverletzungen	Kuh	1L-Einmachglas locker mit Blüten füllen und dann mit Olivenöl auffüllen. 3 Wochen an der Sonne ziehen lassen und jeden Tag schütteln, danach durch einen Kaffeefilter absieben.	2x täglich Johannisöl auf die betroffene Stelle auftragen	2
Echtes Johanniskraut <i>Hypericum perforatum</i> L. (Hypericaceae) Blüte	Johannisöl	Wunden	Kuh	1L-Flasche zur Hälfte mit Johannisblüten füllen (ca. 60g) und dann auffüllen auf 1L mit Olivenöl. An der Sonne 1 Monat ziehen lassen, zwischendurch schütteln. Danach durch ein Kaffeesieb absieben und abfüllen in Flaschen.	2x täglich Johannisöl auf die Wunde geben, nicht einreiben	2
Echtes Johanniskraut <i>Hypericum perforatum</i> L. (Hypericaceae) Blüte	Johannisöl	Verbrennungen, Sonnenbrand	Rind	1.5L-Flasche zu ca. 1/5 mit Johannisblüten füllen und mit Olivenöl auf 1.5L auffüllen. 14 Tage an der Sonne ziehen lassen und jeden Tag schütteln. Danach durch ein Tuch oder Sieb absieben und in Flaschen abfüllen.	2x täglich betroffene Stelle sanft mit dem Johannisöl massieren	2

Echtes Johanniskraut <i>Hypericum perforatum</i> L. (Hypericaceae) Blüte	Johannissalbe	Strichverletzungen	Kuh	1L-Einmachgals locker füllen mit Johannisblüten und dann mit Olivenöl auffüllen. 3 Wochen an der Sonne ziehen lassen und jeden Tag schütteln, durch einen Kaffeefilter absieben. 1dl Johannisöl und 20g Bienenwachs über dem Wasserbad erwärmen und mischen. 2-3 Tropfen ätherisches Öl dazugeben (z.B. Lavendel) zum konservieren.	2x täglich betroffene Stelle mit der Johannissalbe einreiben	2
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	offene Wunde	Rind	Kamille in einem gut durchlüfteten Raum am Schatten trocknen.; 1 Hand voll Blüten (ca. 5.8g) in 1/2L kaltes Wasser geben, aufkochen und 10min kochen lassen. Danach durch ein Tuch absieben und lauwarm verwenden.	1x täglich mit einer Gaze die Wunde mit Kamillentee auswaschen	1
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	offenen Wunden	Ziege	2 Beutel Kamillentee mit 2dl heissem Wasser übergießen und 10min ziehen lassen, lauwarm verwenden.	2x täglich mit dem Kamillenteebeutel die Wunde auswaschen	2
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Wundbehandlung bei Schürfwunden oder kleineren Wunden, Verband	Rind	1 KL Kamillenblüten (0.5g) in 1.5L kaltes Wasser geben und aufkochen, dann Herdplatte abstellen und 10min ziehen lassen und absieben mit einem Sieb.	ein Tuch im Kamillentee tränken und auf die Wunde binden, 2x täglich wechseln	2
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Wundbehandlung bei Schürfwunden oder kleineren Wunden	Rind	1 KL Kamillenblüten (0.5g) in 1.5L kaltes Wasser geben und aufkochen, dann Herdplatte abstellen und 10min ziehen lassen und absieben mit einem Sieb.	2x täglich mit einer Sprühflasche Kamillentee aufsprühen	2
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	offene Wunden, z. B. an Gelenken nach Gelenkentzündung	Kuh	Blüten am Schatten auf einer Zeitung trocknen. Ca. 2g Blüten in 1L Wasser aufkochen und 10 min ziehen lassen, absieben mit Sieb.	Wunde mit einer Spritze ausspülen, 1 L Tee pro Spülung	2
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillenteabad	Zitzenverletzungen	Kuh	1 Beutel Kamille (1.5g) mit 2dl heissem Wasser übergießen und ca. 2min ziehen lassen, lauwarm verwenden.	2x täglich Kamillentee in einen Joghurtbecher geben und Zitze darin mind. 3min baden	2

Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae)	Kamillosan	Nabelentzündung	Kalb	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt. 20ml Kamillosan in ca. 1dl handwarmes Wasser geben.	Wasser und Kamillosan in einen Becher geben und 2x täglich Nabel ca. 3min darin baden	2
Grosse Kapuzinerkresse <i>Tropaeolum majus</i> L. (Tropaeolaceae) Kraut	Kapuzinerkressensalbe	Nabelentzündung	Kalb	1L Glas mit frischer geschnittener Kapuzinerkresse füllen und 1/2L Olivenöl dazugeben und 3 Wochen an der Sonne ziehen lassen. Jeden Tag schütteln und danach durch einen Kaffeefilter absieben. 5dl Ölauszug, 100g Bienenwachs und 50ml Kapuzinerkressentinktur über dem Wasserbad erwärmen und alles mischen, gut rühren. 3-4 Tropfen ätherisches Öl dazugeben (zum konservieren), in Töpfchen abfüllen und erst verschliessen, wenn die Salbe gut abgekühlt ist.	2x täglich den Nabel mit Kapuzinerkressensalbe einreiben	2
Grosse Kapuzinerkresse <i>Tropaeolum majus</i> L. (Tropaeolaceae) Kraut	Kapuzinerkressensalbe	eitrige Wunden	Rind	1L Glas mit frischer geschnittener Kapuzinerkresse füllen und 1/2L Olivenöl dazugeben und 3 Wochen an der Sonne ziehen lassen. Jeden Tag schütteln und danach durch einen Kaffeefilter absieben. 5dl Ölauszug, 100g Bienenwachs und 50ml Kapuzinerkressentinktur über dem Wasserbad erwärmen und alles mischen, gut rühren. 3-4 Tropfen ätherisches Öl dazugeben (zum konservieren), in Töpfchen abfüllen und erst verschliessen, wenn die Salbe gut abgekühlt ist.	2x täglich betroffene Stelle mit Kapuzinerkressensalbe einreiben	2
Grosse Kapuzinerkresse <i>Tropaeolum majus</i> L. (Tropaeolaceae) Kraut	Kapuzinerkressentinktur	Nabelentzündung	Kalb	1L-Einmachglas locker füllen mit geschnittener Kapuzinerkresse und mit Schnaps auffüllen auf 1L. 3 Wochen an der Sonne ziehen lassen und jeden Tag schütteln, mit einem Kaffeefilter absieben und abfüllen.	2x täglich mit einer Sprühflasche Kapuzinerkressentinktur auf den Nabel auftragen	2

Grosse Kapuzinerkresse <i>Tropaeolum majus</i> L. (Tropaeolaceae) Kraut	Kapuzinerkressentinktur	eitrige Wunden	Rind	1L-Einmachglas locker füllen mit geschnittener Kapuzinerkresse und mit Schnaps auffüllen auf 1L. 3 Wochen an der Sonne ziehen lassen und jeden Tag schütteln, mit einem Kaffeefilter absieben und abfüllen.	mit einer Sprühflasche 2x täglich Kapuzinerkressentinktur auf die betroffene Stelle auftragen	2
Wirz (Wirsing) <i>Brassica oleracea</i> convar. <i>capitata</i> var. <i>sabauda</i> L. (Brassicaceae) Blätter	Kohlsalbe	eitrige Abszesse an den Haxen	Rind	1L-Flasche zur Hälfte mit geschnittenen Kohlblättern füllen und dann auf 1L auffüllen mit Olivenöl. 14 Tage an der Sonne ziehen lassen, zwischendurch schütteln und danach durch ein Tuch oder Sieb absieben. 40g Bienenwachs über dem Wasserbad schmelzen und 2dl Ölextrakt dazugeben. In Gläser abfüllen und erst verschliessen wenn die Salbe gut abgekühlt ist.	Kohlsalbe 2x täglich auf die betroffene Stelle auftragen	2
Wirz (Wirsing) <i>Brassica oleracea</i> convar. <i>capitata</i> var. <i>sabauda</i> L. (Brassicaceae) Blätter	Kohlwickel	Schwellungen	Rind		3-4 frische Kohlblätter auf die betroffene Stelle legen mit einem Baumwolltuch bedecken und festbinden, 1x täglich wechseln	1
Gemeiner Kreuzdorn <i>Rhamnus catharticus</i> L. (Rhamnaceae) Zweige	Kreuzdorn	Flechten	Rind		2 Büschel mit 3 Kreuzdornzweigen an der Decke im Stall aufhängen	
Gemeiner Kreuzdorn <i>Rhamnus catharticus</i> L. (Rhamnaceae) Zweige	Kreuzdorn	Flechten	Rind		über dem betroffenen Tier 1 Kreuzdornast aufhängen	
Gemeiner Kreuzdorn <i>Rhamnus catharticus</i> L. (Rhamnaceae) Zweige	Kreuzdorn	Flechten	Rind		mehrere Kreuzdornäste an verschiedenen Stellen im Stall aufhängen	

Flachs/Lein <i>Linum usitatissimum</i> L. (Linaceae) Samen	Leinsamen	Nabelentzündung	Kalb	Ca. 500g Leinsamen mit 2L heissem Wasser übergiesen, so dass ein dickflüssiger Brei entsteht.	Leinsamenbrei möglichst warm in einen Sack oder ein Leintuch geben, auf den Nabel legen und festbinden	2
Flachs/Lein <i>Linum usitatissimum</i> L. (Linaceae) Samen	Leinsamen	Lungenentzündung	Kuh	Ca. 500g Leinsamen mit 2L heissem Wasser übergiesen, so dass ein dickflüssiger Brei entsteht.	Leinsamenbrei in ein Leintuch geben, auf die Rippen legen und festbinden	3
Kleine Malve <i>Malva neglecta</i> Wallr. (Malvaceae) Kraut	Malventee	Klauentzündung	Kuh	1 halbe Hand voll frische Malve (ca. 16g) mit 1L heissem Wasser übergiesen und 10min ziehen lassen, danach mit einem Sieb absieben.	mit einer Sprühflasche mehrmals täglich Malventee auf die betroffene Klaue auftragen	3
Kleine Malve <i>Malva neglecta</i> Wallr. (Malvaceae) Kraut	Malventee	Klauentzündung, Verband	Kuh	1 halbe Hand voll frische Malve (ca. 16g) mit 1L heissem Wasser übergiesen und 10min ziehen lassen, danach mit einem Sieb absieben.	ein Tuch im Malventee tränken und mit einer Gazebinde um die Klaue binden, 1x täglich wechseln	1
Kleine Malve <i>Malva neglecta</i> Wallr. (Malvaceae) Kraut	Malventee	Klauentzündung, Bad	Kuh	1 halbe Hand voll frische Malve (ca. 16g) mit 1L heissem Wasser übergiesen und 10min ziehen lassen, danach mit einem Sieb absieben.	1L Malventee in einen Kessel geben und die Klaue wenn möglich ca. 5min darin baden	1
Walnussbaum <i>Juglans regia</i> L. (Juglandaceae) Blätter	Nussbaumlaub	Milchproduktion stoppen, wenn man Tiere gust lassen will	Kuh		einen Jutesack füllen mit frischem Nussbaumlaub und diesen aufs Euter binden	1
Gewöhnliche Osterluzei <i>Aristolochia clematitis</i> L. (Aristolochiaceae) Herba	Osterluzei	eitrige Wunden	Rind	Osterluzei an einem gut durchlüfteten Ort am Schatten trocknen. 1 Hand voll getrocknete Osterluzeiblätter in kaltes Wasser geben und aufkochen, 10min leicht kochen, danach absieben. Tee kann 3-4x wieder aufgewärmt werden.	Watte im Tee tränken und auf die Wunde geben, mit einem Tuch festbinden, immer wieder etwas Tee darüber giessen, Verband täglich wechseln	1
Gewöhnliche Osterluzei <i>Aristolochia clematitis</i> L. (Aristolochiaceae) Blätter	Osterluzeibad	Nabelentzündung	Kalb	Osterluzei draussen am Schatten trocknen. Ca. 1g Droge in 1L Wasser geben und aufkochen, 10 min ziehen lassen, nicht absieben.	Nabel im Osterluzeitee baden wenn möglich ca. 5min	2

Gewöhnliche Osterluzei <i>Aristolochia clematitis</i> L. (Aristolochiaceae) Kraut	Osterluzeitee	Klauenentzündung	Kuh	Osterluzei an einem gut belüfteten Ort am Schatten trocknen. 2 Hand voll Osterluzeikraut mit 3L heissem Wasser übergossen und ca. 1h ziehen lassen, nicht absieben.	einmal täglich Osterluzeitee in einen Kessel geben und Klaue wenn möglich ca. 5min darin baden	1
Gewöhnliche Osterluzei <i>Aristolochia clematitis</i> L. (Aristolochiaceae) Kraut	Osterluzeitee	Holzsplitter im Fuss	Pferd	Osterluzei an einem gut belüfteten Ort am Schatten trocknen. 2 Hand voll Osterluzeikraut mit 3L heissem Wasser übergossen und ca. 1h ziehen lassen, nicht absieben.	ein Schwamm im Osterluzeitee tränken und mit einer Binde an der Hufe befestigen, 1x täglich wechseln	1
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Ringelblumenöl	Wunden	Rind	30g frische Ringelblumenblüten mit 400ml Basisöl (Aromalife) in ein Braunglas geben und 14 Tage an der Sonne ziehen lassen. Gelegentlich schütteln und danach Öl absieben durch ein Tuch.	Ringelblumenöl 3-4x täglich auf die Wunde auftragen	3
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Ringelblumensalbe	Wunden	Rind	1kg Eutra und eine grosse Hand voll Ringelblumenblüten (20-25 Blüten) zusammen aufwärmen. 2h abkühlen lassen und dann noch einmal aufwärmen, absieben durch ein Sieb.	2x täglich Ringelblumensalbe auf Wunde auftragen	2
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae)	Ringelblumensalbe	leichte Wunden, Schürfwunden	Rind		1x täglich Ringelblumensalbe auf die betroffene Stelle auftragen	1
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blütenblätter	Ringelblumensalbe	leichte Wunden, nicht offen	Lama	Ringelblumenblüten auf einem Tuch drinnen trocknen. 1.5L-Einmachglas locker füllen mit Blütenblättern und auffüllen mit Olivenöl. 4 Wochen an der Sonne ziehen lassen, jeden Tag schütteln und dann durch ein Mehlsieb absieben. 200ml Ringelblumenöl und 32g Bienenwachs über dem Wasserbad erwärmen, mischen und rühren bis handwarm. Dann 1KL Honig und 16 Tropfen ätherisches Öl dazugeben (zum konservieren). In Töpfchen abfüllen und über Nacht abkühlen lassen, danach verschliessen.	betroffene Stelle 1-2x täglich mit Ringelblumensalbe einreiben	1

Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Ringelblumensalbe	Schürfungen, kleine Wunden	Rind	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt.	2x täglich betroffene Stelle mit Ringelblumensalbe einreiben	2
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Ringelblumensalbe	offene Wunden	Rind	150-200g Ringelblumenblüten mit 5dl Olivenöl mischen. 3 Wochen an der Sonne ziehen lassen und jeden Tag schütteln, durch Kaffeefilter absieben. 5dl Ölauszug, 100g Bienenwachs und 50ml Ringelblumentinktur über dem Wasserbad erwärmen, dann alles mischen und gut rühren. 3-4 Tropfen ätherisches Öl dazugeben (z.B. Lavendelöl), in Töpfchen abfüllen und erst verschliessen, wenn die Salbe gut abgekühlt ist.	2x täglich Ringelblumensalbe auf Wunde auftragen, bis in die Wundränder	2
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Ringelblumensalbe	offene Wunden, Bisswunden	Katze	1kg Melkfett erhitzen und 1/2L-Glas voll Ringelblumenblüten (60g) dazugeben. Über Nacht ziehen lassen und am nächsten Tag wieder erhitzen. Noch einmal eine Nacht ziehen lassen, am nächsten Tag noch einmal erhitzen und dann durch ein Sieb geben und abfüllen.	Ringelblumensalbe 1x täglich auf die Wunde auftragen	1
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blütenblätter	Ringelblumensalbe	Entzündungen, Abszesse	Rind	Ringelblumenblüten an einem gut durchlüfteten Ort am Schatten trocknen. Eine kleine Hand voll getrocknete Blütenblätter (0.8g) in 2dl Olivenöl geben und 14 Tage an der Sonne ziehen lassen. Jeden Tag schütteln, durch ein Sieb absieben. 40g Bienenwachs über dem Wasserbad erhitzen und mit 2dl Ölauszug mischen. In Gläser abfüllen und erst verschliessen, wenn die Salbe gut abgekühlt ist.	betroffene Stelle 2x täglich mit Ringelblumensalbe einreiben	2

Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Ringelblumensalbe	Strichverletzungen	Kuh	30g frische Ringelblumenblüten mit 400ml Basisöl (Aromalife) in ein Braunglas geben und 14 Tage an der Sonne ziehen lassen. Gelegentlich schütteln und danach Öl absieben durch ein Tuch. 60g Bienenwachs über dem Wasserbad schmelzen und mit Ölauszug mischen, in kleine Töpfchen abfüllen.	auf Wunde 3-4x täglich Ringelblumensalbe auftragen	3
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae)	Ringelblumensalbe	offene Wunden, Wundbehandlung	Rind	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt.	Ringelblumensalbe 2x täglich gut deckend auf die Wunde auftragen	2
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Ringelblumensalbe	Wundheilung, zum Abheilen	Rind	3 Hand voll frische Ringelblumenblüten in 7.5dl Mandelöl geben und 3-4 Wochen an der Sonne oder an einem warmen Ort ziehen lassen, gelegentlich schütteln. Nach 3-4 Wochen Ölauszug mit Blüten im heissen Wasserbad ca. 10 min ziehen lassen. Blüten absieben und Bienenwachs dazugeben (auf 1dl Öl 17g Bienenwachs) und schmelzen, in schwarze Gläser abfüllen.	3x täglich Ringelblumensalbe deckend auf die Wunde auftragen	3
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae)	Ringelblumensalbe	Wunde oder trockene Haut am Euter	Ziege	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt.	2x täglich ein Finger voll Ringelblumensalbe auf die betroffene Stelle auftragen	2
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae)	Ringelblumensalbe	Flechten	Ziege	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt.	2x täglich Flechten dick mit der Salbe überdecken	2
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blütenblätter	Ringelblumensalbe	Schürfungen	Rind	15g Strahlenblüten in 150g Olivenöl und 15g Bienenwachs im Wasserbad langsam erwärmen und eine Stunde bei mittlerer Hitze ziehen lassen. Danach durch ein Sieb absieben und etwa 8-10 Notfalltropfen dazugeben. In kleine Döschen giessen und vor dem verschliessen gut abkühlen lassen.	2x täglich betroffene Stelle mit Ringelblumensalbe einreiben	2

Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Ringelblumentee	offene Wunden	Rind	Ringelblumenblüten am Schatten lufttrocknen. 10g Ringelblumenblüten mit 1L heissem Wasser übergießen und 5-10min ziehen lassen, durch ein Sieb absieben.	2x täglich die Wunde mit 1L lauwarmem Ringelblumentee auswaschen	2
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blütenblätter	Ringelblumentinktur	Verstauchung am Fuss	Lama	Ringelblumenblüten auf einem Tuch drinnen trocknen. 1.5L-Einmachglas locker füllen mit getrockneten Blütenblättern und auffüllen mit Zuckerrohrschnaps. 4 Wochen an der Sonne ziehen lassen, jeden Tag schütteln, durch ein Mehlsieb absieben und abfüllen.	ein Gutsch Ringelblumentinktur in 5L Wasser geben und wenn möglich Fuss ca. 5 min darin baden	1
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Ringelblumentinktur	offene Wunden	Rind	1L-Einmachglas zur Hälfte locker mit Ringelblumenblüten füllen und auffüllen mit Bätzi (Obstbrandwein). 3 Wochen an der Sonne ziehen lassen und jeden Tag schütteln, durch einen Kaffeefilter absieben und abfüllen.	Ringelblumentinktur mit Wasser verdünnen (1:1), 2x täglich Wunde mit der Lösung auswaschen	2
Sanikel <i>Sanicula europaea</i> L. (Apiaceae) Blätter	Sanikelbad	Klauenentzündung	Rind	Sanikel am Schatten aufhängen und lufttrocknen. 1 Hand voll getrockneten Sanikel (4.5g) mit 4.5L Wasser übergießen und 20 min ziehen lassen, Sanikel nicht absieben.	einmal täglich 4.5L Sanikeltee in einen Kessel geben und Klaue wenn möglich ca 15-20min darin baden	1
Sanikel <i>Sanicula europaea</i> L. (Apiaceae) Blätter	Sanikelumschläge	Nabelentzündung	Kalb	2 EL Sanikelblätter mit 2.5dl heissem Wasser übergießen, ca. 10min ziehen lassen, durch ein Sieb absieben.	Watte im Sanikeltee tränken, auf den Nabel geben und mit einem Leintuch einen Umschlag machen, morgens und abends wechseln	2
Schwarzdorn <i>Prunus spinosa</i> L. (Rosaceae) Zweige	Schwarzdorn	Räudenprophylaxe, Ausbreitung auf weitere Tiere verhindern, wenn Räudenbefall vorhanden	Rind		2-4 Schwarzdornzweige an mehreren Orten im Stall an der Decke aufhängen, um weitere Ansteckungen zu verhindern	

Zweigriffeliger Weissdorn <i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC. (Rosaceae) Zweige	Schwiderberiholz	Räuden	Rind		an mehreren Orten im Stall einzelne Weissdornäste an der Decke aufhängen	
Echter Seidelbast <i>Daphne mezereum</i> L. (Thymelaeaceae) Zweige	Seidelbast	Räuden	Rind		an mehreren Orten im Stall einzelne Seidelbastäste an der Decke aufhängen	
Spitzwegerich <i>Plantago lanceolata</i> L. (Plantaginaceae) Blätter	Spitzwegerichwickel	Sonnenbrand bei hellhäutigen Pferden	Pferd		einen grossen Teebeutel füllen mit getrocknetem Spitzwegerich (ca. 9g), etwas Wasser darüber geben und dann auf die Verbrennung legen, mit Tape oder Dermoplast befestigen, täglich wechseln	1
Spitzwegerich <i>Plantago lanceolata</i> L. (Plantaginaceae) Blätter	Spitzwegerichwickel	Verbrennungen, Blasen	Kuh		einen grossen Teebeutel füllen mit getrocknetem Spitzwegerich (ca. 9g), etwas Wasser darüber geben und dann auf die Verbrennung legen, mit Tape oder Dermoplast befestigen, täglich wechseln	1
Stechpalme <i>Ilex aquifolium</i> L. (Aquifoliaceae) Zweige	Stechpalme	Flechten	Rind		mehrere Stechpalmenäste an mehreren Orten im Stall aufhängen	
Ruprechtskraut (Stinkender Storchenschnabel) <i>Geranium robertianum</i> L. (Geraniaceae) Kraut	Storchenschnabelsalbe	offene Wunden	Lama	1.5L-Einmachglas locker mit Blüten füllen und dann auffüllen mit Olivenöl. 4 Wochen an der Sonne ziehen lassen und jeden Tag schütteln, danach durch ein Mehlsieb absieben. 145g Wollfett im Wasserbad schmelzen und mit 90ml warmem Ölauszug mischen. Danach mit warmem Storchenschnabeltee (1EL Blüten mit 80ml heissem Wasser übergossen, 15 min ziehen lassen, absieben) mischen und rühren bis lauwarm, 4 Tropfen ätherisches Öl dazugeben (zum konservieren).	3x täglich Storchenschnabelsalbe um die offene Wunde auftragen, nicht direkt in die Wunde	3

Virginischer Tabak <i>Nicotiana tabacum</i> L. (Solanaceae) Blätter	Tabaksud	Flechten	Rind	1/4 Tabakbeutel (ca.10g) in 1L Wasser (40-50°C) geben und bis am Abend ziehen lassen, danach absieben und in eine Sprühflasche geben.	1x täglich mit einer Sprühflasche die Flechten einsprühen über ca. 14-21 Tage	1
Fichte <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. (Pinaceae) Exkrete	Tannenharz	eiterbildende Verletzung	Rind	Wenn das Harz hart wird, kann man es im Wasserbad etwas erwärmen. Nach 1-2 Monaten wieder frisches Harz verwenden.	so viel Harz wie möglich auf die betroffene Stelle auftragen	1
Fichte <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. (Pinaceae) Exkrete	Tannenharz	Nabelentzündung	Kalb	Wenn das Harz hart wird, kann man es im Wasserbad etwas erwärmen. Nach 1-2 Monaten wieder frisches Harz verwenden.	so viel Harz wie möglich auf den Nabel streichen	1
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymianbad	Wunde an den Klauen	Rind	4-5 Thymianstängel (ca. 8g) mit 5L heissem Wasser übergießen und ziehen lassen bis lauwarm (ca. 2h), Thymian nicht absieben.	2x täglich 5L Thymiantee in einen Kessel geben und Klaue wenn möglich 5-10min darin baden	2
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymianbad	Klauentzündung	Kuh	4-5 Thymianstängel (ca. 8g) mit 5L heissem Wasser übergießen und ziehen lassen bis lauwarm (ca. 2h), Thymian nicht absieben.	2x täglich 5L Thymiantee in einen Kessel geben und Klaue wenn möglich 5-10min darin baden	2
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymiantee	Klauentzündung	Kuh	0.5KL Thymian (0.15g) in 1L Wasser geben und aufkochen, dann Herdplatte abstellen und Tee 10min ziehen lassen. Danach durch ein Sieb absieben.	mit einer Sprühflasche mehrmals täglich Thymiantee auf die betroffene Klaue auftragen	3
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymiantee	Klauentzündung, Verband	Kuh	0.5KL Thymian (0.15g) in 1L Wasser geben und aufkochen, dann Herdplatte abstellen und Tee 10min ziehen lassen. Danach durch ein Sieb absieben.	ein Tuch im Thymiantee tränken und mit einer Gazebinde um die Klaue binden, 1x täglich wechseln	1
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymiantee	Klauentzündungen, Bad	Kuh	0.5KL Thymian (0.15g) in 1L Wasser geben und aufkochen, dann Herdplatte abstellen und Tee 10min ziehen lassen. Danach durch ein Sieb absieben.	1x täglich 1L Thymiantee in einen Kessel geben und die Klaue wenn möglich ca. 5min darin baden	1

Echte Wallwurz, Beinwell <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae) Wurzel	Wallwurzbrei	Wunde an der Klaue	Kuh	Mixerglas (1L) halb füllen mit geschnittenen Wurzelstücken und auffüllen auf 1L mit Schnaps (Industrieschnaps), mixen und Brei in Gläser abfüllen.	Wallwurzbrei auf eine Gaze streichen (ca. 1cm dick) und auf die betroffene Stelle legen, mit einer Binde befestigen	1
Echte Wallwurz, Beinwell <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae) Wurzel	Wallwurzsalbe	Gelenkentzündung	Rind	1 Hand voll geschnittene Wurzelstücke in 1kg Eutra geben und zusammen aufwärmen bis vors Kochen. Danach ca. 2h abkühlen lassen und noch einmal aufwärmen, durch ein Sieb absieben und abfüllen.	1-2x täglich betroffene Stelle mit Wallwurzsalbe einreiben	1
Echter Wundklee <i>Anthyllis vulneraria</i> L. (Fabaceae) Blüte	Wundkleeteetee	eitrige Wunden	Ziege	Wundklee an einem gut durchlüfteten Ort am Schatten trocknen. 2-3 getrocknete Wundkleeblüten (ca. 0.5g) mit 2dl heissem Wasser aufgiessen und ca. 20min ziehen lassen. Blüten werden nicht abgesiebt, Tee lauwarm verwenden.	2x täglich Wunde mit Wundkleeteetee auswaschen, dazu eine Spritze verwenden und 2dl Tee pro Anwendung	2
Acker-Schachtelhalm <i>Equisetum arvense</i> L. (Equisetaceae) Kraut	Zinnkraut	geschwollene Narbe nach Operation eines Abszesses	Lama	Ackerschachtelhalm in ein grosses Teesieb geben und über kochendem Wasser zugedeckt ca. 20min dämpfen.	gedämpfter Ackerschachtelhalm in eine Gaze geben und Gaze auf die Narbe legen, mit einem Tuch zudecken, bis Wickel kalt war	2
Gemeine Zwiebel <i>Allium cepa</i> L. (Amaryllidaceae) Zwiebel	Zwiebeltinktur	Schwellungen	Rind	In ein 1/2L-Glas eine geschnittene Zwiebel geben (ca. 80g), 1KL Salz dazugeben und auffüllen mit Bätzi (Obstbrandwein). Mind. 1 Tag ziehen lassen bevor man Tinktur verwendet, Zwiebeln nicht absieben.	2x täglich Zwiebeltinktur auf die betroffene Stelle auftragen	2
Gemeine Zwiebel <i>Allium cepa</i> L. (Amaryllidaceae) Zwiebel	Zwiebelwickel	Nabelentzündung	Kalb	1 Zwiebel (ca. 90g) fein schneiden und andämpfen und auf eine Gaze geben.	Gaze mit Zwiebeln auf den Nabel geben, mit einem Tuch überdecken und mit einer Schnur festbinden	1
Arnika <i>Arnica montana</i> L. (Asteraceae)	Arnikaöl	Festliegen nach der Geburt, wärmen	Kuh	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt.	2-3x täglich den Rücken der Kuh mit Arnikaöl einreiben	2

Arnika <i>Arnica montana</i> L. (Asteraceae) Kraut	Arnikasalbe	Verstauchungen	Rind	200g frisches Arnikakraut mit 5dl Olivenöl mischen. 3 Wochen an der Sonne ziehen lassen und jeden Tag schütteln und durch Kaffeefilter absieben. 5dl Ölauszug, 100g Bienenwachs und 50ml Arnikatinktur über dem Wasserbad erwärmen und alles mischen, gut rühren. 3-4 Tropfen ätherisches Öl dazugeben (z.B. Lavendelöl), in Töpfchen abfüllen und erst vreschliessen, wenn gut abgekühlt.	2x täglich betroffene Stelle mit Arnikasalbe einreiben	2
Arnika <i>Arnica montana</i> L. (Asteraceae) Blüte	Arnika Massageöl	Hornstösse am Euter	Kuh	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt	2x täglich etwas Öl auf die Euterhaut auftragen und einmassieren	3-10 Tage
Arnika <i>Arnica montana</i> L. (Asteraceae) Blüte	Arnikatinktur	Offene Wunden	Rind	Ein Glas mit frischen Arnikablüten füllen, mit Schnaps (40Vol.-%) bedecken, bei Raumtemperatur für 3-4 Wochen stehen lassen, danach durch ein Tuch absieben	Einmalig auf die Wunde auftragen	1
Arnika <i>Arnica montana</i> L. (Asteraceae) Blüte	Arnikatinktur	Wunden	Ziege	Arnikablüten (ca. 31g) in ein Glas geben und mit ca. 3 dl Schnaps (38Vol.-%) schön bedecken, für ca. 3 Wochen an einen warmen Ort stellen und 1-2x pro Tag schütteln, danach durch einen Damenstrumpf absieben	2x täglich ca. 1ml Tinktur (1:10 mit Wasser verdünnt) mit einer Spritze eingeben	
Echte Aloe <i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f. (Xanthorrhoeaceae) Blätter	Aloe Vera	Augenentzündung	Rind	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt	2x täglich mit einem Spray ca. 3 Spritzer auf das Auge (oder auf den Augenwinkel) auftragen	2-3 Tage
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Wunden	Rind	Ca. 2.15g getrocknete Blüten mit 1L heissem Wasser überbrühen	2x täglich Wunde auswaschen	
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Fussgeschwulst	Huhn	2-3 Beutel (ca. 4-6g) in 1L heisses Wasser geben, etwas kochen lassen und danach 10 Minuten ziehen lassen, absieben	2x täglich Fuss in warmem Kamillentee baden	2-3 Tage

Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Tränendes Auge	Pferd	2-3 Beutel (ca. 4-6g) in 1L heisses Wasser geben, etwas kochen lassen und danach 10 Minuten ziehen lassen, absieben	Einmalig 2-3x täglich mit einem Stofftuch das Auge auswaschen	1
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Augenverschluss	Rind	2-3 Beutel (ca. 4-6g) in 1L heisses Wasser geben, etwas kochen lassen und danach 10 Minuten ziehen lassen, absieben	3-4x täglich das Auge mit einem Stofftuch auswaschen	14
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Wunden	Rind	4 Beutel (ca. 8g) gerocknete Kamillenblüten in 1L klates Wasser geben und aufkochen, 10-15 Minuten ziehen lassen, absieben	2x täglich Wunde mit einer Spritze auswaschen	
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Ekzem	Rind	1 Handvoll getrocknete Kamillenblüten mit 0.5-1L heissem Wasser übergiesen und 5-10 Minuten ziehen lassen, danach absieben	2-4x täglich für 1-4 Tage mit einem Tuch auftragen	1-4 Tage
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Nabelentzündung	Rind	1 Handvoll getrocknete Kamillenblüten mit 0.5-1L heissem Wasser übergiesen und 5-10 Minuten ziehen lassen, danach absieben	2-3x täglich Nabel mit dem Tee baden (Schüssel gebrauchen)	
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) n.a	Kamillentinktur	Fleischwunden	Pferd	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt	2x täglich Wunde mit einer Spritze auswaschen	
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) n.a	Kamillentinktur	Wunden	Rind	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt	1x täglich mit einer Spritze Wunde auswaschen	
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentinktur	Offener Abszess	Rind	4 Handvoll (ca. 156g) frische Kamillenblüten mit 1L Schnaps (70Vol.-%) übergiesen und 3 Wochen in einem braunen Gefäß an der Sonne stehen lassen, danach absieben	2x täglich Wunde mit einem frischen Lappen auswaschen	5

Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentinktur	Wunddesinfektion	Rind	4 Handvoll (ca. 156g) frische Kamillenblüten mit 1L Schnaps (70Vol.-%) übergossen und 3 Wochen in einem braunen Gefäß an der Sonne stehen lassen, danach absieben	1x täglich etwas Tinktur mit einem sauberen Lappen auf Wunde auftragen	2-3 Tage
Beinwell, Wallwurz <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae) Wurzel	Beinwellsalbe	Gelenkentzündung	Schwein	FrISCHE Beinwellwurzeln mit Alkohol in einem Gefäß aufgiessen und gut bedecken (Alk. Ca. 70Vol.-%), für 1 Monat an einen warmen Ort stellen und 1x täglich gut schütteln, danach mit einem Chromsthalieb absieben und am Schluss abfiltrieren. Zu ca. 1dl Ölauszug ca. 10g Wollfett und ca. 12g Bienenwachs hinzufügen und unter Rühren erwärmen bis Wachs geschmolzen ist (bei 65°C), Pfanne wegnehmen und auf 45°C abkühlen lassen, ca. 10ml Tinktur zufügen (auf 45°C erwärmt) und mit Mixer gut mischen	2x täglich eine gute Schicht Salbe auftragen und mit Cellophan verbinden	
Beinwell, Wallwurz <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae) Wurzel	Beinwellsalbe	Gelenkentzündung	Schwein	FrISCHE Beinwellwurzeln gut säubern, Wurzel mit Öl (kaltgepresst) bedecken und bei max. 70°C ausziehen, gut rühren, danach absieben. Zu ca. 1dl Ölauszug ca. 10g Wollfett und ca. 12g Bienenwachs hinzufügen und unter Rühren erwärmen bis Wachs geschmolzen ist (bei 65°C), Pfanne wegnehmen und auf 45°C abkühlen lassen, ca. 10ml Tinktur zufügen (auf 45°C erwärmt) und mit Mixer gut mischen	2x täglich eine gute Schicht Salbe auftragen und mit Cellophan verbinden	
Beinwell, Wallwurz <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae) Wurzel	Beinwellsalbe	Wunden wie Kratzer, Schürfwunden	Rind	Ca. 100g frISCHE Wurzel putzen, in Scheiben schneiden und mit Olivenöl gerade bedecken (ca. 2-3dl). 1-2 Wochen ruhen lassen und dabei einmal pro Tag auf ca. 40°C erwärmen. Danach abfiltrieren. Zu 100g Beinwellöl werden 15-20g Bienenwachs gegeben, auf ca. 40°C erwärmen damit Wachsflocken schmelzen und sich mit dem Öl vermischen, danach abfiltrieren und in Gefäße füllen (lichtgeschützte). Abkühlen lassen	2x täglich eine dünne Schicht auf betroffene Stelle auftragen	2

Beinwell, Wallwurz <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae) Wurzel	Dr. Andres Wallwurzsalbe	Hornstösse	Rind	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt	2x täglich etwas Gel auf Euter auftragen	
Echtes Johanniskraut <i>Hypericum perforatum</i> L. (Hypericaceae) Kraut	Johanniskrautöl	Wunden	Rind	Glas mit frischem Johanniskraut füllen, mit Öl bedecken an einen warmen Ort stellen für mind. 3 Wochen, danach abfiltrieren	3x täglich mit der Hand auf die Wunde auftragen	
Fichte <i>Picea abies</i> (L.)H. Karst. (Pinaceae) Harz	Harzsalbe	Abszess	Ziege	Ein Teil Harz mit 9 Teilen Olivenöl in eine Konserve geben und erwärmen bis sich Harz schön gelöst hat (nicht kochen!). Zu einem Teil Ölauszug ca. 1 Teil Bienenwachs geben und erwärmen bis alles geschmolzen ist, durch einen Strumpf abfiltrieren und in ein Glas füllen. Erkalten lassen und dann verschliessen	1x täglich dick auf den Abszess auftragen, Fell vorher schären	
Fichte <i>Picea abies</i> (L.)H. Karst. (Pinaceae) Harz	Harzsalbe	Euterverletzung	Ziege	Ein Teil Harz mit 9 Teilen Olivenöl in eine Konserve geben und erwärmen bis sich Harz schön gelöst hat (nicht kochen!). Zu einem Teil Ölauszug ca. 1 Teil Bienenwachs geben und erwärmen bis alles geschmolzen ist, durch einen Strumpf abfiltrieren und in ein Glas füllen. Erkalten lassen und dann verschliessen	2x täglich auf das Euter dick auftragen	
Fichte <i>Picea abies</i> (L.)H. Karst. (Pinaceae) Harz	Harzsalbe	Klauenwunde	Ziege	Ein Teil Harz mit 9 Teilen Olivenöl in eine Konserve geben und erwärmen bis sich Harz schön gelöst hat (nicht kochen!). Zu einem Teil Ölauszug ca. 1 Teil Bienenwachs geben und erwärmen bis alles geschmolzen ist, durch einen Strumpf abfiltrieren und in ein Glas füllen. Erkalten lassen und dann verschliessen	Harzsalbe 1x täglich mit einem Holzspachtel auf Wunde auftragen und einbinden	14

Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Calendula-Tinktur	Nach Enthornung	Rind	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt	1x täglich 1 KL Tinktur in ca. 7.5dl lauwarmes Wasser geben und Wunde mit einer feinen Bürste auswaschen	1
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Ringelblumensalbe	Kratzer	Rind	1 Tasse voll getrocknete Blüten (ca. 3.98g) und 4dl Öl in ein Glas geben und für 2 Wochen an einem warmen Ort stehen lassen. Danach mit einem Tuch abfiltrieren. 3 EL Bienenwachs zufügen und Gemisch erwärmen bis Wachs geschmolzen ist, danach abfüllen	2x täglich auf betroffene Stelle auftragen	
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Ringelblumensalbe	Euterschrunden	Rind	2 Tasse voll getrocknete Blüten (ca. 3.98g) und 4dl Öl in ein Glas geben und für 2 Wochen an einem warmen Ort stehen lassen. Danach mit einem Tuch abfiltrieren. 3 EL Bienenwachs zufügen und Gemisch erwärmen bis Wachs geschmolzen ist, danach abfüllen	2x täglich nach dem Melken auf Euterschrunde auftragen und einreiben	
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Ringelblumensalbe	Fesselwunde	Pferd	3 Tasse voll getrocknete Blüten (ca. 3.98g) und 4dl Öl in ein Glas geben und für 2 Wochen an einem warmen Ort stehen lassen. Danach mit einem Tuch abfiltrieren. 3 EL Bienenwachs zufügen und Gemisch erwärmen bis Wachs geschmolzen ist, danach abfüllen	2x täglich dick auf Fessel auftragen	
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Ringelblumensalbe	Mauke am Fesselgelenk	Pferd	Ca. 500g Melkfett erwärmen, ca. 21g frische Ringelblumenblüten zufügen, ca. 5 Minuten köcheln lassen (darf nicht schäumen), danach 1 Tag stehen lassen. Anschliessend nochmals erwärmen und absieben und abfüllen	1x täglich dick auf betroffene Stelle auftragen	

Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Ringelblumensalbe	Rissiges Euter	Rind	Ca. 500g Melkfett erwärmen, ca. 21g frische Ringelblumenblüten zufügen, ca. 5 Minuten köcheln lassen (darf nicht schäumen), danach 1 Tag stehen lassen. Anschliessend nochmals erwärmen und absieben und abfüllen	2x täglich etwas Salbe auf Euter auftragen und einmassieren	
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Ringelblumensalbe	Schorf am Euter	Rind	Ca. 500g Melkfett erwärmen, ca. 21g frische Ringelblumenblüten zufügen, ca. 5 Minuten köcheln lassen (darf nicht schäumen), danach 1 Tag stehen lassen. Anschliessend nochmals erwärmen und absieben und abfüllen	2x täglich Salbe dick auf Euterschorf auftragen und einmassieren	3
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Ringelblumensalbe	Wunden	Rind	Ca. 3Kg Melkfett verflüssigen, ca. 500g frische Ringelblumenblüten zugeben, 24h zugedeckt stehen lassen, nochmals aufkochen und dann abfüllen	2x täglich etwas Salbe auf Wunde auftragen	
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Ringelblumensalbe	Sonnenbrand am Euter	Rind	Ca. 3Kg Melkfett verflüssigen, ca. 500g frische Ringelblumenblüten zugeben, 24h zugedeckt stehen lassen, nochmals aufkochen und dann abfüllen	1x täglich abends etwas Salbe auf betroffene Stelle auftragen	

Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Ringelblumensalbe	Wunden	Rind	Ca. 500g Schweineschmalz aufwärmen und ca. 2 handvoll frische Ringelblumenblüten begeben, über Nacht stehen lassen. Am nächsten Tag erwärmen und 2dl Olivenöl beifügen und 20Minuten auf der niedrigsten Stufe ziehen lassen, danach absieben Nach dem Absieben der Blüten ca. 30g geraffelten Bienenwachs zufügen, wenn Wachs geschmolzen ist abfüllen	2x täglich gut auf Wunde auftragen	
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Ringelblumensalbe	Wunden	Ziege	Blüten in eine Gefäss geben und mit Olivenöl gut bedecken, an einen warmen Ort stellen für 3 Wochen, 1-2x pro Tag schütteln. Danach mit einem Damenstrumpf absieben. 9 Teile Ölauszug mit einem Teil Bienenwachs in ein Gefäss geben und erwärmen bis Wachs schmilzt, mit einem Holzstäbchen gut rühren. Danach abkühlen lassen und gut verschliessen	2x täglich gut auf Wunde auftragen	
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Ringelblumensalbe	gegen raues Euter	Rind	Frische Blüten (ca. 11g)in eine Pfanne geben so dass der Pfannenboden gut bedeckt ist, dann ca. 500ml Melkfett begeben und aufkochen bis es schäumt. Pfanne auf die Seite stellen und über Nacht stehen lassen, danach nochmals erwärmen und Blüten absieben	1-2x täglich auf Euter auftragen	
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Ringelblumensalbe	Klauenwunde	Huhn	Ca. 10g frische Blüten auf 2-2.5dl Olivenöl. Blüten mit Öl überdecken und in einem lichtgeschützten Gefäss 6 Wochen an die Sonne (wovon mind. 21 Sonnentage) stellen, ab und an schütteln, danach abfiltrieren. Ca. 15g Bienenwachs in Ölauszug geben und erwärmen bis Wachs geschmolzen ist, abfüllen und auskühlen lassen	1x täglich eine dünne Schicht auf Klaue auftragen	
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Ringelblumensalbe	Klauenwunden	Rind	Ca. 10g frische Blüten auf 2-2.5dl Olivenöl. Blüten mit Öl überdecken und in einem lichtgeschützten Gefäss 6 Wochen an die Sonne (wovon mind. 21 Sonnentage) stellen, ab und an schütteln, danach abfiltrieren. Ca. 15g Bienenwachs in Ölauszug geben und erwärmen bis Wachs geschmolzen ist,	2x täglich deckend auf Klaue auftragen	4

				abfüllen und auskühlen lassen		
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Ringelblumensalbe	Offene Wunde	Rind	Ca. 10g frische Blüten auf 2-2.5dl Olivenöl. Blüten mit Öl überdecken und in einem lichtgeschützten Gefäß 6 Wochen an die Sonne (wovon mind. 21 Sonnentage) stellen, ab und an schütteln, danach abfiltrieren. Ca. 15g Bienenwachs in Ölauszug geben und erwärmen bis Wachs geschmolzen ist, abfüllen und auskühlen lassen	Dünne Schicht auf betroffene Stelle 2-3x täglich auftragen	2
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymiantee	Panaritium	Schwein	1EL Thymiankraut (ca. 4g) mit 1L heissem Wasser übergießen, 5 Minuten ziehen lassen, eventuell absieben	1x täglich ein Bad machen	5
Gemeine Berberitze <i>Berberis vulgaris</i> L. (Berberidaceae) Äste	Berberitzenäste	Flechten	Rind		Einige Äste oder Zweige im Stall aufhängen	365
Gemeine Berberitze <i>Berberis vulgaris</i> L. (Berberidaceae) Äste	Berberitzenäste	Flechten	Rind		Einige Äste oder Zweige im Stall aufhängen, nach einem halbem Jahr austauschen	180
Gemeine Berberitze <i>Berberis vulgaris</i> L. (Berberidaceae) Äste	Berberitzenäste	Flechten	Rind		Einige Äste oder Zweige im Stall aufhängen und nach max. 9 Monaten auswechseln	270
Augentrost <i>Euphrasia officinalis</i> L. (Scrophulariaceae) Kraut	Augentrostöl	Augenentzündung	Ziege	Augentrostkraut in ein Gefäß geben und mit Olivenöl gut bedecken und für ca. 3 Wochen an einen warmen Ort stellen, 1x pro Tag gut schütteln	2x täglich das Auge mit einem getränkten Wattebausch vorsichtig auswaschen	

Augentrost <i>Euphrasia officinalis</i> L. (Scrophulariaceae) Kraut	Augentrostsalbe	Augenentzündung	Ziege	Augentrostkraut in ein Gefäß füllen, mit Olivenöl gut bedecken, für ca. 3 Wochen an einen warmen Ort stellen und 1x pro Tag gut schütteln. 9 Teile vom Ölauszug mit einem Teil Bienenwachs in eine Pfanne geben und erwärmen bis die Masse homogen ist, danach abfüllen	2x täglich etwas Salbe mit einer Watterondelle auf den Augenwinkel auftragen und ein bisschen übers Auge streichen	
Kreuzdorn <i>Rhamnus catharticus</i> L. (Rhamnaceae) Äste	Kreuzdorn	Flechten	Rind		Äste im Stall aufhängen	
Gemeiner Kreuzdorn <i>Rhamnus catharticus</i> L. (Rhamnaceae) Äste	Kreuzdorn	Flechten	Rind		Äste im Stall aufhängen, nach einem halben Jahr austauschen	
Gemeiner Kreuzdorn <i>Rhamnus catharticus</i> L. (Rhamnaceae) Äste	Kreuzdorn	Flechten	Rind		Äste im Stall aufhängen, nach einem halben Jahr austauschen	
Gemeiner Kreuzdorn <i>Rhamnus catharticus</i> L. (Rhamnaceae) Äste	Kreuzdorn	Flechten	Rind		Äste im Stall aufhängen	
Gemeiner Kreuzdorn <i>Rhamnus catharticus</i> L. (Rhamnaceae) Äste	Kreuzdorn	Flechten	Rind		Äste im Stall aufhängen	
Gemeiner Kreuzdorn <i>Rhamnus catharticus</i> L. (Rhamnaceae) Äste	Kreuzdorn	Flechten	Rind		Einge Äste im Stall aufhängen, nach 3 Monaten austauschen	
Gemeiner Kreuzdorn <i>Rhamnus catharticus</i> L. (Rhamnaceae) Äste	Kreuzdorn	Flechten	Rind		Im Stall 1-2 Äste aufhängen	

Gemeiner Tormentill <i>Potentilla erecta</i> (L.) Räuschel (Rosaceae) Wurzel	Blutwurz tinktur	Nach der Enthornung	Rind	FrISCHE geschnittene Blutwurz wurzeln mit Alkohol in einem Gefäss aufgiessen und gut bedecken (Alk. ca. 70Vol.-%), für 1 Monat an einen warmen Ort stellen. 1x täglich gut schütteln, danach mit einem Chromsthal sieb absieben und am Schluss abfiltrieren	2x täglich etwas Tinktur auf die Enthornungswunde aufsprayen	2-3 Tage
Gemeiner Tormentill <i>Potentilla erecta</i> (L.) Räuschel (Rosaceae) Wurzel	Blutwurz tinktur	Sonnenbrand	Schwein	FrISCHE geschnittene Blutwurz wurzeln mit Alkohol in einem Gefäss aufgiessen und gut bedecken (Alk. ca. 70Vol.-%), für 1 Monat an einen warmen Ort stellen. 1x täglich gut schütteln, danach mit einem Chromsthal sieb absieben und am Schluss abfiltrieren	3x täglich etwas Tinktur auf die betroffene Stelle aufsprühen	3
Pflanze nicht klar dokumentiert	Whs. Weissdornäste	Flechten	Rind		Äste im Stall aufhängen, nach einem halben Jahr austauschen	
Schöllkraut <i>Chelidonium majus</i> L. (Papaveraceae) Blätter	Schöllkraut	Feigwarzen	Rind		1x täglich frischen Blättersaft auf Warze auftragen	2-3 Tage
Stumpfblättriger Ampfer, Blacke <i>Rumex obtusifolius</i> L. (Polygonaceae) Blätter	Blackenöl	Schmerzen durch Wunde	Rind	Ca. 300g frISCHE Blackenblätter mit Öl bedecken (kaltgepresstes Öl), Ölauszug für 1-3 Wochen an der Sonne stehen lassen und 2x pro Tag schütteln. Danach absieben und umfüllen	2x täglich etwas Blackenöl auf betroffene Hautstelle einreiben	
Stumpfblättriger Ampfer, Blacke <i>Rumex obtusifolius</i> L. (Polygonaceae) Blätter	Blackenöl	Zum Einreiben nach Auswaschungen bei Gefahr von trockener Haut	Rind	Ca. 300g frISCHE Blackenblätter mit Öl bedecken (kaltgepresstes Öl), Ölauszug für 1-3 Wochen an der Sonne stehen lassen und 2x pro Tag schütteln. Danach absieben und umfüllen	Nach jeder Waschung einreiben	

Stumpflättriger Ampfer, Blacke <i>Rumex obtusifolius</i> L. (Polygonaceae) Blätter	Blackentinktur	Ärdbeeri an Hufen	Rind	Frische Blackenblätter und Wurzel (ca. 14g) in lichtgeschützte Flasche geben und mit ca. 3dl Alkohol (45 Vol.-%) gut bedecken. Für 3 Wochen an einen sonnigen Platz stellen und 2x pro Tag Ölauszug schütteln, danach absieben und umfüllen	2x täglich etwas Blackentinktur mit Spritzflasche auftragen	
Stumpflättriger Ampfer, Blacke <i>Rumex obtusifolius</i> L. (Polygonaceae) Blätter	Blackentinktur	Verletzungen	Rind	Frische Blackenblätter und Wurzel (ca. 14g) in lichtgeschützte Flasche geben und mit ca. 3dl Alkohol (45 Vol.-%) gut bedecken. Für 3 Wochen an einen sonnigen Platz stellen und 2x pro Tag Ölauszug schütteln, danach absieben und umfüllen	2x täglich betroffene Stelle mit Blackentinktur (1:10 mit Wasser verdünnt) auswaschen	
Gemeiner Kreuzdorn <i>Rhamnus catharticus</i> L. (Rhamnaceae) Äste	Kreuzdorn	Flechten	Rind		Kreuzdornast im Stall aufhängen	
Weicher Frauenmantel <i>Alchemilla mollis</i> (Rosaceae) Blätter	Frauenmäntelitee	Wunde am Schloss	Rind	5-6 Blätter (ca. 0.3g) mit 1L kochendem Wasser übergießen, 30 Minuten ziehen lassen	mit einem sauberen Tuch 2x täglich Wunde auswaschen	8
Weicher Frauenmantel <i>Alchemilla mollis</i> (Rosaceae) Blätter	Frauenmäntelitee	Euterwunde	Rind	5-6 Blätter (ca. 0.3g) mit 1L kochendem Wasser übergießen, 30 Minuten ziehen lassen	mit einem sauberen Tuch 2x täglich Wunde auswaschen	
Weisstanne <i>Abies alba</i> Mill. (Pinaceae) Harz	Weisstannenharz	Geschwulst am Knöchelgelenk	Rind		Einmalig etwas Weisstannenharz punktuell auf Geschwulst auftragen	1
Gemeiner Augentrost <i>Euphrasia officinalis</i> L. (Scrophulariaceae) Kraut	Augentrosttee	Augenentzündungen	Ziege	Augentrost an einem gut durchlüfteten Ort am Schatten trocknen. 3 Finger voll Augentrost (ca. 0.5g) mit 1/2L heissem Wasser übergießen und 20min ziehen lassen. Danach durch ein Sieb absieben und lauwarm verwenden.	Gaze im lauwarmen Augentrosttee tränken und 2x täglich das betroffene Auge damit auswaschen	2

Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Augenentzündung	Rind	1 Beutel Kamille (1.5g) mit 1/2L heissem Wasser übergiessen und ca. 5min ziehen lassen, lauwarm verwenden.	2x täglich mit einem im Kamillentee getränkten Tuch die Augen auswaschen, bei jeder Anwendung ein frisches Tuch verwenden	2
Wilde Malve <i>Malva sylvestris</i> L. (Malvaceae) Kraut	Käslkraut	Wunden	Rind	1 handvoll Blüten mit 1L heissem Wasser übergiessen, danach absieben	2-3x täglich Wunde mit einem sauberen Tuch auswaschen	
Gemeiner Augentrost <i>Euphrasia officinalis</i> L. (Scrophulariaceae) Kraut	Augentrosttee	Augenentzündung	Kaninchen	Augentrost am Schatten lufttrocknen. 0.5g Augentrost mit 2dl heissem Wasser übergiessen und ca. 5min ziehen lassen und dann durch ein Sieb absieben, immer frisch verwenden.	Gaze im Augentrosttee tränken und Auge damit auswaschen, morgens und abends	2
Gemeiner Augentrost <i>Euphrasia officinalis</i> L. (Scrophulariaceae) Kraut	Augentrosttee	Augenentzündung, verklebete Augen	Katze	Augentrost am Schatten auslegen, um zu trocknen. Eine Prise Augentrost mit 1.5dl heissem Wasser übergiessen, nach ca. 15min absieben mit Sieb, immer frisch verwenden.	1x täglich eine Gaze mit lauwarmem Tee tränken und das betroffene Auge damit auswaschen	1
Schöllkraut <i>Chelidonium majus</i> L. (Papaveraceae) Exkrete	Schöllkraut	Warzen an den Strichen	Kuh		1x täglich bei abnehmendem Mond Milch aus dem Stängel des Schöllkrauts auf die Warzen geben	1
Gemeiner Augentrost <i>Euphrasia officinalis</i> L. (Scrophulariaceae) Kraut	Augentrosttee	Augenentzündung	Rind	Augentrost auf dem Dörrex trocknen. 1.4g getrockneter Augentrost mit 1/2L heissem Wasser übergiessen und 5-10min ziehen lassen. Die grossen Pflanzenteile mit der Hand aus dem Tee entfernen und den Tee lauwarm verwenden.	2x täglich mit einem im Augentrosttee getränkten Tuch die Augen auswaschen, bei jeder Anwendung ein frisches Tuch verwenden	2
Schöllkraut <i>Chelidonium majus</i> L. (Papaveraceae) Exkrete	Warzenkraut	Warzen an den Strichen	Kuh		3x täglich etwas Milchsaft aus dem Stängel des Schöllkrauts auf die Warzen geben	3

Hausmittel						
	Essig	Läuse, Haarlinge, Flechten	Rind		2x täglich auf Fell auftragen	21
	Schnaps	Desinfektion einer Klauenwunde	Rind		Einmalig Klauenwunde mit Schnaps auswaschen und dann verbinden	1
	Holzteer	Grippeli im Frühstadium	Rind		1x täglich dick auftragen	
	Schnaps mit Zucker	Geschwür an der Klaue	Rind	Ca. 1kg Zucker mit 1dl Schnaps (43Vol.-%) mischen	Einmalig Klaue mit Schnaps auswaschen nach dem Ausputzen, dann die Paste auf Watte geben und Klaue damit gut einbinden (inkl. Klotz zur Druckentlastung), nach 2-3 Tagen kontrollieren und evt. wiederholen	1
	Hundschmutz	Böser Nabel	Rind		3x täglich mit einem Lappen einreiben	
	Buchenholzteer	Klauenwunden	Rind		1x pro Woche auf Wunde auftragen mit Watte und gut einbinden	
	Buchenholzteer	Wunden an Klauen	Schaf		1x pro Woche auf Wunde auftragen mit Watte und gut einbinden	
	Buchenholzteer	Wunden an Klauen	Schaf		1x pro Woche auftragen bis Besserung eintritt	
	Buchenholzteer	Pickwunden an Klaue	Huhn		1x pro Woche auf Klaue auftragen	
	Honig	Klauenwunden	Huhn		1x pro Woche Honig auf Watte geben und Klaue damit gut einbinden	
	Honig	Klauenfäule	Schaf		1x pro Woche Honig auf Watte geben und Klaue damit gut einbinden	

	Honig	Klauengeschwür	Schaf		1x pro Woche Honig auf Watte geben und Klaue damit gut einbinden	
	Honig-Mehl-Mischung	Eitrige Geschwulst	Rind	Mehl mit Flüssighonig mischen, so dass es einen klebrigen Teig gibt	1x täglich Honig-Mehl-Mischung dick auftragen	
	Kaltes Wasser	Böser Nabel	Rind		Alle 2-3 Stunden eine Schüssel voll eiskaltes Wasser mit 2-3 Eiswürfeln für 2-3 Minuten unter Nabel heben	2
	Nachgeburt einreiben	Rude	Rind		2x täglich ein Stück der frischen Nachgeburt einreiben	3
	Nachgeburt	Flechten	Rind		2x täglich ein Stück der frischen Nachgeburt einreiben	3
	Wasserstoffperoxid-Pulver	Klauengeschwür	Rind		nach dem Klauenputzen mit Löffelchen etwas Pulver auftragen, dann gut einbinden, nach 3-4 Tagen eventuell wiederholen, dann Bepanthen auftragen	1
	Schwefelblütenpulver	Flechten	Rind	2-3EL Schwefelblütenpulver in erwärmtes Melkfett (1kg) geben (bereits im Abfüllgefäss), konstant rühren bis Masse erkaltet ist.	2x täglich für 2-3 Wochen mit Handschuhen auf Haut auftragen	17
	Pommesfrites-Öl	Flechten	Rind	Möglichst altes Öl verwenden	1-2x pro Woche mit einem handschuh einreiben	7
	Öl	Zur Schlossöffnung	Rind		2x täglich Schloss gut mit Öl einmassieren	
	Kittharz-Tinktur (Propolis)	Böser Nabel	Rind	Das Harz von den Wabenrahmen kratzen und in eine dunkle Flasche füllen, mit Alkohol (50Vol.-%) übergießen, bis das Harz gut bedeckt ist. Die Flasche verschliessen und an einen warmen Ort stellen, jeden Tag schütteln. Nach 4 Wochen durch ein Tuch abfiltrieren	2x täglich mit einem Pinsel auf den Nabel auftragen	2-3 Tage
	Nature Yoghurt	Klauenwunde	Rind	Frisch zubereiten	Yoghurt auf Wunde auftragen und wenn möglich einbinden, ca. 5 Tage eingebunden lassen, eventuell wiederholen	1

	Schnaps	Klauenwunden	Rind	Obstbranntwein "Bäzi"	Ca. 1-2dl Schnaps 2-3x täglich auf Wunde geben und diese so ausspülen	1-2 Tage
	Schnaps	Wunden	Rind	Obstbranntwein "Bäzi"	Ca. 2dl Schnaps (48Vol.-%) 2-3x täglich auf Wunde geben und diese so auswaschen	2
	Asche	Eiterung	Rind		eine Hand voll Asche 1x täglich auf die Wunde geben	2
	Schmierseife	Nabelentzündung	Kalb		1 Hand voll Schmierseife auf die betroffene Stelle auftragen	3
	Schmierseife	Wunden	Rind		1 Hand voll Schmierseife auf die betroffene Stelle auftragen	3
	Honig	offene Wunden	Rind		2x täglich offene Wunde mit Honig füllen	7
	Bäzi	offene Wunden, desinfizieren	Rind	Bäzi (Obstbrandwein) mit Wasser verdünnen, halb/halb	2x täglich mit einer Sprühflasche Schnaps-Wasser-Mischung auf die Wunde auftragen	4
	Altöl	Kruste in den Ohren (ev. Milben)	Kaninchen		2x täglich ein Tuch um einen Stock binden und in Altöl tränken, Altöl in die Ohren reiben	2
	Schwefelpaste	Räude	Rind	10g Schwefelblütenpulver mit 20g Basiscreme (aus der Drogerie) oder Schweinefett mischen.	1-2x täglich Schwefelpaste auf die Räden auftragen	21
	Schwefelblütenpulver-Melkfett-Paste	Flechten	Rind	So viel Schwefelblütenpulver wie möglich in Melkfett einrühren, so dass eine gut streichfähige Paste entsteht. Immer frisch verwenden.	1x täglich Flechte mit der Paste bestreichen	7
	Honig	offene Wunden	Rind		2x täglich die offene Wunde mit Honig füllen	7
	Schnaps mit Zucker	eitrige Wunden	Ziege	1 dl Bäzi (Obstbrandwein) mit 2EL Zucker mischen.	2x täglich Wunde mit Schnaps-Zucker-Mischung auswaschen, dazu eine Spritze verwenden, 1dl pro Anwendung	2
	Schwefelblüten mit Schweinefett	Flechten oder Räden	Rind	1/2 Fett und 1/2 Schwefelblüten zusammen mischen bis eine cremige Masse entsteht, ca. 3 Tage haltbar.	Kruste etwas wegkratzen und dann betroffene Stelle mit der Paste grosszügig einreiben	3
	Schweinefett und Schwefelblüten-Salbe	Flechten	Rind	2/3 Fett und 1/3 Schwefelblüten kalt zusammen mischen, bis es bindet. Immer frisch verwenden.	deckend auf die betroffenen Stellen auftragen	7
	Zucker	Euterschenkeleczem nach Kalben	Kuh		mit etwa 1 Hand voll Zucker die betroffene Stelle einreiben	3
	Schnaps	Zwischenklauenwarze	Kuh	Bäzi (Obstbrandwein) verwenden.	Schnaps mit Spritzflasche auf betroffene Stelle auftragen	3

	Schnaps	Nabeldesinfektion nach der Geburt, bei abgerissenem Nabel, um Entzündung vorzubeugen	Kalb	Bätzi (Obstbrandwein) verwenden.	1 Becher mit Bätzi (Obstbrandwein) (ca. 2 dl) über den Nabel geben	1
	Altöl	Räuden	Rind		Räuden mit Altöl einstreichen mit einem Pinsel	
Mischungen						
Bockshornklee <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. (Fabaceae) Samen	Johannisöl mit Bockshornkleepulver	Nabelentzündung	Kalb	Bockshornklee­sa­men­pul­ver und Johannisöl (fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt) zu einer Salbe vermischen (Verhältnis ca. 1:1), immer frisch verwenden.	Salbe auf eine Gaze geben und auf den Nabel legen, mit einem Kartoffelsack oder Leintuch festbinden	1
Echtes Johanniskraut <i>Hypericum perforatum</i> L. (Hypericaceae)						
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae)	Wundspray	leichte Hautverletzungen, Schürfwunden	Rind	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt.	2x täglich Wundspray auf die betroffene Stelle aufsprühen	3
Zaubernuss <i>Hamamelis virginiana</i> L. (Hamamelidaceae)						

Knoblauch <i>Allium sativum</i> L. (Amaryllidaceae) Zwiebel	Ringelblumensalbe	Wunden	Rind	2 frische Knoblauchzehen fein schneiden, frische Ringelblumenblüten vierteln, ca. 1 Glas voll verwenden (ca. 25g) und 4 frische Thymianzweige fein schneiden. 200g Kokosfett über dem Wasserbad erhitzen, Ringelblumenblüten, Thymian und Knoblauch dazugeben und 1h im Wasserbad ziehen lassen, durch ein Tuch absieben und in Gläschen abfüllen.	1-2x täglich betroffene Stelle mit Ringelblumensalbe einreiben	7
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte						
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut						
Knoblauch <i>Allium sativum</i> L. (Amaryllidaceae) Zwiebel	Ringelblumensalbe	Hautausschläge	Rind	2 frische Knoblauchzehen fein schneiden, frische Ringelblumenblüten vierteln, ca. 1 Glas voll verwenden (ca. 25g) und 4 frische Thymianzweige fein schneiden. 200g Kokosfett über dem Wasserbad erhitzen, Ringelblumenblüten, Thymian und Knoblauch dazugeben und 1h im Wasserbad ziehen lassen, durch ein Tuch absieben und in Gläschen abfüllen.	1-2x täglich betroffene Stelle mit Ringelblumensalbe einreiben	7
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte						
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut						
Echtes Labkraut <i>Galium verum</i> L. (Rubiaceae) Kraut	Teemischung bei Augenleiden	Schuppige Haut über dem Auge	Kuh	1g frisches Labkraut, 2.5g frischer Ackerschachtelhalm, 4g frische Malve und 5g Fetthenne mischen und mit 1/2L Wasser übergießen, 10min ziehen lassen und dann absieben durch ein Sieb.	Gaze mit einem Netz und einer Schnur am Kopf fixieren und 3-4 mal täglich Gaze mit dem Tee befeuchten	14
Acker-Schachtelhalm <i>Equisetum arvense</i> L. (Equisetaceae) Kraut						
Kleine Malve <i>Malva neglecta</i> Wallr. (Malvaceae) Kraut						
Fetthenne <i>Sedum</i> L. (Crassulaceae) Blätter						

Sanikel <i>Sanicula europaea</i> L. (Apiaceae) Blätter	Kamillen-Sanikel-Spray	Nabelentzündung	Kalb	1 EL getrocknete Kamillenblüten (1.8g) und 1EL getrocknete Sanikelblätter (0.9g) mit 1L heissem Wasser übergossen und 10min ziehen lassen, durch ein Sieb absieben und in eine Sprühflasche abfüllen.	2x täglich mit einem Spray Kamillen-Sanikel-Tee auf den Nabel auftragen	5
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte						
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Ringelblumensalbe	Wunden	Rind	Ca. 20.4g frische Blüten mit Rapsöl bedecken und für 2 Wochen an die Sonne stellen, danach absieben. Sobald Ölauszug fertig ist, ca. 20.4g frische Blüten mit wenig Wasser aufkochen, danach absieben. Nachdem beide Pflanzenteile abgeseiht sind (Ölauszug nach 2 Wochen/Wasserauszug) 500g Melkfett erwärmen und 2EL Kirsch beifügen, die Blumen aus dem Ölauszug rein geben und anschliessend die Blumen aus dem Wasserauszug. Alles gut mischen und abfüllen.	1x täglich etwas Salbe mit der Hand auf die Wunde auftragen	
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte						
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Wundtinktur	Wundenbehandlung nach Fährlikastration	Schwein	Gleiches Prinzip für alle Pflanzenblüten: Frische Blüten mit Alkohol in einem Gefäss aufgiessen und gut bedecken (Alk. Ca. 60Vol.-%), für 1 Monat an einen warmen Ort stellen und 1x täglich gut schütteln, danach mit einem Chromstahlsieb absieben und am Schluss abfiltrieren. Tinkturen zu gleichen Teilen mischen	Einmalige Auftragung auf Wunde	1
Echtes Johanniskraut <i>Hypericum perforatum</i> L. (Hypericaceae) Blüte						
Echter Lavendel <i>Lavandula angustifolia</i> Mill. (Lamiaceae) Blüte						

Magen-Darmtrakt-Erkrankungen

Pflanze botanischer Name (Pflanzenfamilie) verwendeter Pflanzenanteil	Rezeptname	Anwendungsgebiet	Tierart	Herstellung	Verabreichung	TD
Banane <i>Musa x paradisiaca</i> L. (Musaceae) Frucht	Banane mit Aktivkohle	akuter Durchfall	Ziege	1/4 Banane (ca. 25g) zerquetschen und mit 1EL Aktivkohle mischen.	Bananenbrei in ein Schälchen geben und den Tiere zum fressen geben, 2x täglich	2
Gemeiner Tormentill <i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch. (Rosaceae) Wurzel	Blutwurz	starker Kälberdurchfall	Kalb		1 KL Blutwurzpulver morgens und abends in die Milch geben	2
Gemeiner Tormentill <i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch. (Rosaceae) Wurzel	Blutwurztee	Kälberdurchfall	Kalb	3 EL Blutwurz (ca. 42g) in 2 L kaltes Wasser geben. Aufkochen und ca. 10 min kochen lassen und danach absieben mit einem Sieb.	morgens und abends 1L lauwarmen Blutwurztee mit Schoppen (Petflasche mit Nuggi) eingeben, wenn Tiere nicht mehr schlucken können mit einer Sonde direkt in den Magen, je nach Zustand des Tieres auch 3x täglich verabreicht	2
Bockshornklee <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. (Fabaceae) Samen	Bockshornkleesamenpulver	Appetitlosigkeit	Kuh		2x täglich ca. 30g Bockshornkleepulver zum Kraftfutter geben	2
Bockshornklee <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. (Fabaceae) Samen	Bockshornkleesamenpulver	Appetitlosigkeit, Aceton	Kuh	2dl Propylenglycol, 1dl Apfelessig, 2dl Wasser und 40g Bockshornklee mischen und gut schütteln.	2x täglich 1/2L mit der Flasche eingeben	2
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Kraut	Brennessel	Verdauungsstörungen, Fressunlust	Kuh	Brennesselbüschel am Schatten aufhängen zum trocknen und mit der Hand zereiben vor der Verabreichung.	1 Hand voll Brennessel (ca. 15g) morgens und abends übers Gläck (Salzlecke) geben	2

Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Blätter	Brennessel	Kümmern	Kalb		morgens und abends 3 Finger voll Brennessel getrocknete (ca. 1.64g) direkt ins Maul eingeben	2
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Kraut	Brennesselheu	Appetitlosigkeit	Ziege	Brennesseln zusammen mit Heu trocknen.	ca. 20g Brennesseln pro Tier 1x täglich zum Futter geben	1
Brombeere <i>Rubus fruticosus</i> L. (Rosaceae) Blätter	Brombeerblätterttee	starker Durchfall	Kuh	6 frische Brombeerblätter mit 1L heissem Wasser übergiessen und 10min ziehen lassen, danach absieben durch ein Sieb.	2x täglich 2-3L handwarmen Brombeerblätterttee mit der Flasche eingeben	2
Brombeere <i>Rubus fruticosus</i> L. (Rosaceae) Blätter	Brombeerblätterttee	Durchfall, grössere Kälber (keine Milch mehr)	Kalb	6 frische Brombeerblätter mit 1L heissem Wasser übergiessen und 10min ziehen lassen, danach absieben durch ein Sieb.	2x täglich 1L handwarmen Brombeerblätterttee mit der Flasche verabreichen	2
Kleine Malve <i>Malva neglecta</i> Wallr. (Malvaceae) Kraut	Chäslichruttee	unterstützende Therapie bei einer Infektion des Netzmagens	Kuh	An einem luftigen Ort am Schatten Chäslichrutbüschel zum trocknen aufhängen oder auf dem Dörrex trocknen. 1 Hand voll getrocknetes Chäslichrut (ca. 6g) mit 2L heissem Wasser übergiessen und zugedeckt 10-15min ziehen lassen, danach absieben durch ein Sieb.	5L handwarmen Chäslichruttee 3x täglich mit einer Flasche eingeben	3
Edelweiss <i>Leontopodium alpinum</i> Cass. (Asteraceae) Kraut	Edelweisstee	Durchfall	Kalb	Edelweiss am Schatten aufhängen und lufttrocknen. 6 Edelweisstängel (ca. 3.5g) mit 1L heissem Wasser übergiessen, ca. 20min ziehen lassen und dann absieben. Immer lauwarm verwenden.	1L Edelweisstee morgens und abends in die Milch geben, Milchmenge auf die Hälfte reduzieren	2
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. Fagaceae Rinde	Eichenrinde	Durchfallprophylaxe	Kalb		1 KL Eichenrindenpulver (1.5g) morgens und abends in die Milch geben, ab 2. Tag nach der Geburt	2

Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. Fagaceae Rinde	Eichenrindenpulver	Durchfallprophylaxe	Kalb		2x täglich 1KL Eichenrindenpulver (ca 2.5g) zur Milch geben	2
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. Fagaceae Rinde	Eichenrindenpulver	leichter Durchfall	Kalb		2x täglich 1KL Eichenrindenpulver (ca 2.5g) zur Milch geben	2
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. Fagaceae Rinde	Eichenrindenpulver	leichter Durchfall	Kalb		2x täglich 15g Eichenrindenpulver in die Milch geben	2
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. Fagaceae Rinde	Eichenrindenpulver	Durchfall	Kalb	2 Bouillonwürfel in 2L heissem Wasser auflösen und 1EL Eichenrindenpulver (ca.6g) dazugeben.	morgens und abends 2L Bouillon mit Eichenrindenpulver mit dem Kälberkessel verabreichen, Milchersatz	2
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. Fagaceae Rinde	Eichenrindenpulver	Durchfall	Kalb		2 KL Eichenrindenpulver (ca. 6.5g) morgens und abends in die Milch geben	2
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. Fagaceae Rinde	Eichenrindenpulver	Durchfall	Kalb		2x täglich 10g Eichenrindenpulver zur Milch oder zum Futter geben	2
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. Fagaceae Rinde	Eichenrindenpulver	Durchfall	Kuh	5EL Eichenrindenpulver (ca. 50g) in 2L lauwarmes Wasser geben und sofort verabreichen.	2x täglich 2L Eichenrindentee mit dem Tränkefass einschütten	2
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. Fagaceae Rinde	Eichenrindenpulver	Durchfall	Kalb	5EL Eichenrindenpulver (ca. 50g) in 2L lauwarmes Wasser geben und sofort verabreichen.	1L Eichenrindentee 2x täglich mit der Nuggiflasche verabreichen, 2-3h Abstand zur Milchmahlzeit	2
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. Fagaceae Rinde	Eichenrindenpulver	Durchfallprophylaxe, 3 Tage bevor Stallwechsel	Kalb		2-3x täglich 1KL Eichenrindenpulver (3.4g) direkt ins Maul geben	2

Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. Fagaceae Rinde	Eichenrindenpulver	akuter Durchfall	Kalb		2-3x täglich 1KL Eichenrindenpulver (3.4g) direkt ins Maul geben	2
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. Fagaceae Rinde	Eichenrindenpulver	Durchfall	Ziege		1 gehäufte KL Eichenrindenpulver (ca. 5g) direkt eingeben	2
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. Fagaceae Rinde	Eichenrindenpulver	Durchfall	Ziegenlamm		ca. 1g Pulver mit einem Kaffelöffel direkt eingeben	2
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. Fagaceae Rinde	Eichenrindenpulver-Bouillon-Eigelb-Mischung	Durchfall, kleinere Kälber	Kalb	2 Hühnerbouillonwürfel in 1L heissem Wasser auflösen, abkühlen lassen bis lauwarm (ca. 40°C), dann 1KL Eichenrindenpulver (ca. 3.2g) dazugeben.	1/2L Eichenrinden-Bouillon-Mischung mit 1 Eigelb mischen und 5 mal täglich mit einem Schoppen verabreichen	5
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. Fagaceae Rinde	Eichenrindenpulver-Bouillon-Eigelb-Mischung	Durchfall, grössere Kälber	Kalb	2 Hühnerbouillonwürfel in 1L heissem Wasser auflösen, abkühlen lassen bis lauwarm (ca. 40°C), dann 1KL Eichenrindenpulver (ca. 3.2g) dazugeben.	2L Eichenrinden-Bouillon-Mischung mit einem Eigelb mischen und 3x täglich mit einem Schoppen verabreichen	3
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. Fagaceae Rinde	Eichenrindentee	Durchfall	Kuh	3 EL Eichenrindenpulver (ca. 10g) mit 2L kaltem Wasser mischen und aufkochen. 10min kochen lassen und dann abkühlen lassen. 2 Schnapsgläschen mit Bätzi (Obstbrandwein) dazugeben.	2x täglich 1L Eichenrindentee und 1 Schnapsglas mit Bätzi (2cl) mischen und mit der Flasche eingeben	2

Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. Fagaceae Rinde	Eichenrindentee	starker Durchfall	Kalb	4-5 KL Eichenrinde (ca. 15g) in 1L Wasser aufkochen und 10 min leicht kochen lassen, absieben mit einem Sieb und 1 EL Salz und 4 EL Glucose dazugeben.	1L handwarmen Tee mit Schoppen verabreichen morgens und abends	2
Gelber Enzian <i>Gentiana lutea</i> L. (Gentianaceae) Wurzel	Enzianwurzeltee	Magen-Darm-Beschwerden, Durchfall	Kalb	40g Enzianwurzel mit 1L heissem Wasser aufgiessen und 10 min ziehen lassen. Wurzelstücke mit einem Sieb absieben, immer frisch verwenden.	mit einer Nuggiflasche 1/4L morgens und abends verabreichen	2
Gelber Enzian <i>Gentiana lutea</i> L. (Gentianaceae) Wurzel	Enzianwurzeltee	Magen-Darm-Beschwerden, Bauchschmerzen, Blähungen	Kuh	40g Enzianwurzel mit 1L heissem Wasser aufgiessen und 10 min ziehen lassen. Wurzelstücke mit einem Sieb absieben, immer frisch verwenden.	mit einer Flasche morgens und abends 1L lauwarmen Tee eingeben	2
Fenchel <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. (Apiaceae) Früchte	Fencheltee	Magen-Darm-Beschwerden, Durchfall	Ziege	3 Beutel Fencheltee (je 1.5g) mit 1L heissem Wasser übergiessen und ca. 20min ziehen lassen, lauwarm verwenden.	1/2-1L Fencheltee 2x täglich mit einer Flasche eingeben	2
Fenchel <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. (Apiaceae) Früchte	Fencheltee	Magen-Darm-Beschwerden, Durchfall	Ziegenlamm	3 Beutel Fencheltee (je 1.5g) mit 1L heissem Wasser übergiessen und ca. 20min ziehen lassen, lauwarm verwenden.	2-3dl lauwarmen Fencheltee morgens und abends in die Milch (1L) geben und mit einem Schoppen verabreichen	2
Fenchel <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. (Apiaceae) Früchte	Fencheltee	Durchfall, Flüssigkeitsverlust ausgleichen	Kalb	1 Beutel Fencheltee (2g) mit 1 Liter heissem Wasser übergiessen und 5 min ziehen lassen. 5g Kochsalz und 50g Traubenzucker dazugeben. Lauwarm verwenden.	3x täglich 1L Fencheltee mit einer Saugflasche eingeben	3

Gänse-Fingerkraut <i>Potentilla anserina</i> L. (Rosaceae) Blätter	Gänserich-Tee	Durchfall, grössere Kälber	Kalb	Gänse-Fingerkraut Blätter an einem gut durchlüfteten Ort am Schatten oder auf dem Dörrex trocknen. 2EL Blätter (ca. 3g) mit 2L heissem Wasser übergiessen und zugedeckt 10min ziehen lassen, danach absieben durch ein Sieb und auf Trinktemp. abkühlen lassen.	Milch wird abgesetzt, 3-4x täglich 1L handwarmen Gänserich-Tee zusammen mit Milchersatz oder Elektrolytlösung mit der Flasche verabreichen, max. 5 Tage	3
Gänse-Fingerkraut <i>Potentilla anserina</i> L. (Rosaceae) Blätter	Gänserich-Tee	Durchfall, kleinere Kälber	Kalb	Gänse-Fingerkraut Blätter an einem gut durchlüfteten Ort am Schatten oder auf dem Dörrex trocknen. 2EL Blätter (ca. 3g) mit 2L heissem Wasser übergiessen und zugedeckt 10min ziehen lassen, danach absieben durch ein Sieb und auf Trinktemp. abkühlen lassen.	in Kombination mit Milch, 3-4x täglich zwischen den Mahlzeiten 0.5L handwarmen Gänserich-Tee mit einer Flasche verabreichen, max. 5 Tage	3
Meisterwurz <i>Peucedanum ostruthium</i> (L.) W. D. J. Koch (Apiaceae) Wurzel	Gäristtee	Kolliken. Verdauungsbeschwerden, adulte Tiere	Kuh	Meisterwurz an einem gut belüfteten Ort am Schatten trocknen. 1 Wurzel etwas zerschnitten und mit 1/2L heissem Wasser übergiessen, ca. 20min ziehen lassen, nicht absieben und lauwarm verwenden.	1/2L Mesterwurztee mit einer Flasche eingeben, einmalige Anwendung	1
Meisterwurz <i>Peucedanum ostruthium</i> (L.) W. D. J. Koch (Apiaceae) Wurzel	Gäristtee	Kolliken, Verdauungsbeschwerden	Kalb	Meisterwurz an einem gut belüfteten Ort am Schatten trocknen. 1 Wurzel etwas zerschnitten und mit 1/2L heissem Wasser übergiessen, ca. 20min ziehen lassen, nicht absieben und lauwarm verwenden.	1x täglich 1/2L Meisterwurztee in die Milch geben, einmalige Anwendung	1
Heidelbeere <i>Vaccinium myrtillus</i> L. (Ericaceae) Blätter	Heidelbeerblätter	Durchfall	Ziegenlamm	In einem Stoffsack trocknen draussen oder neben dem Ofen.	1 Hand voll Heidelbeerblätter (ca.3g) mit der Hand direkt verfüttern	2

Heidelbeere <i>Vaccinium myrtillus</i> L. (Ericaceae) Beeren	Heidelbeeren	Durchfall	Ziege	Im Backofen auf kleinster Stufe trocknen.	5 getrocknete Beeren (0.5g) pro Tier übers Futter geben, wenn die Tiere nicht mehr fressen wollen Eingabe	2
Heidelbeere <i>Vaccinium myrtillus</i> L. (Ericaceae) Kraut	Heidelbeerstaude	Durchfall	Ziege	In einem Stoffsack trocknen draussen oder neben dem Ofen.	1 Hand voll Heidelbeerstaude (ca. 10g) 3x täglich direkt verfüttern	3
Heidelbeere <i>Vaccinium myrtillus</i> L. (Ericaceae) Kraut	Heidelbeerstaudentee	Durchfall, bei Tieren die Heidelbeerstaude nicht mehr fressen wollen	Ziege	In einem Stoffsack trocknen draussen oder neben dem Ofen. Ca. 10g Staude mit 1L Wasser aufkochen und etwa 15 min etwas kochen lassen und 2 KL Bouillon dazugeben.	60ml Tee mit einer Spritze direkt eingeben	3
Heidelbeere <i>Vaccinium myrtillus</i> L. (Ericaceae) Kraut	Heidelbeerstaudentee	Durchfall	Ziegenlamm	In einem Stoffsack trocknen draussen oder neben dem Ofen. Ca. 10g Staude mit 1L Wasser aufkochen und etwa 15 min etwas kochen lassen und 2 KL Bouillon dazugeben.	ca. 20-30ml Tee in die Milch geben morgens u. abends	2
Heidelbeere <i>Vaccinium myrtillus</i> L. (Ericaceae) Kraut	Heidelbeertee	Durchfall	Kalb	Heidelbeeren an einem gut belüfteten Ort am Schatten trocknen. 1KL getrocknete Heidelbeeren (4g) mit 1L heissem Wasser übergiessen und ca. 20min ziehen lassen, durch ein Sieb absieben.	morgens und abends 1/2L Heidelbeertee in die Milch geben, Milch mit Tee verdünnen	2
Johannisbrotbaum <i>Ceratonia siliqua</i> L. (Fabaceae) Früchte	Johannisbrotbaumfrucht	leichter Durchfall beim Pony	Pferd		1 getrocknete Frucht (ca. 20g) pro Tier 1x täglich verfüttern	1
Johannisbrotbaum <i>Ceratonia siliqua</i> L. (Fabaceae) Früchte	Johannisbrotkernmehl	Durchfallprophylaxe, wenn Tiere auf frische Weide kommen (junges Gras)	Ziege		1x täglich 5g Mehl in Salzlecke geben	1

Johannisbrotbaum <i>Ceratonia siliqua</i> L. (Fabaceae) Früchte	Johannisbrotkernmehl	Durchfall akut	Ziege		2x täglich 1 KL voll Mehl (ca.5g) direkt eingeben	2
Echtes Johanniskraut <i>Hypericum perforatum</i> L. (Hypericaceae) Kraut	Johanniskraut	Durchfallprophylaxe	Ziege	Johanniskraut an einem gut belüfteten Ort am Schatten trocknen.	1 Hand voll Johanniskraut (13g) 2x täglich zum Heu geben	2
Echtes Johanniskraut <i>Hypericum perforatum</i> L. (Hypericaceae) Kraut	Johanniskraut	leichter Durchfall	Ziege	Johanniskraut an einem gut belüfteten Ort am Schatten trocknen.	1 Hand voll Johanniskraut (13g) 2x täglich zum Heu geben	2
Kaffeepflanze <i>Coffea</i> L. (Rubiaceae) Samen	Kaffeesatz	Kälberdurchfall	Kalb		morgens und abends ca. 100g Kaffeesatz in die Milch einrühren	2
Kaffeepflanze <i>Coffea</i> L. (Rubiaceae) Samen	Kaffee-Schnaps	Kolik	Kuh	8dl Espresso aus der Kaffeemaschine mit 2dl Bätzi (Obstbrandwein) und 4 EL Zucker mischen, lauwarm verwenden.	mit einer Flasche 1L Kaffee- Schnaps einschütten, einmalige Anwendung	1
Kaffeepflanze <i>Coffea</i> L. (Rubiaceae) Samen	Kaffee-Schnaps	Magen-Darm-Beschwerden, Bauchschmerzen	Kuh	6 EL Kaffeepulver (45g) mit 2dl heissem Wasser übergießen und 2dl Bätzi (Obstbrandwein) dazugeben, lauwarm verwenden.	4dl Kaffee-Schnaps mit einer Flasche einschütten, einmalige Anwendung	1
Kaffeepflanze <i>Coffea</i> L. (Rubiaceae) Samen	Kaffee-Schnaps	Magen-Darm-Beschwerden, Bauchschmerzen	Kalb	2EL Kaffeepulver in 1/2dl heissem Wasser auflösen und 1/2 dl Bätzi (Obstbrandwein) dazugeben, lauwarm verwenden.	mit einer Flasche Kaffee- Schnaps einschütten, einmalige Anwendung	1
Kaffeepflanze <i>Coffea</i> L. (Rubiaceae) Samen	Kaffee-Schnaps	Durchfall lehmig	Kuh	1.5 EL Kaffeepulver (ca. 10g) mit 1.5L heissem Wasser übergießen. Kaffeepulver nicht absieben, dann Bätzi (Obstbrandwein) dazugeben (1/2dl Schnaps bei einem Kalb und 6dl Schnaps bei einer Kuh) und lauwarm verwenden.	2L Kaffee und 6dl Schnaps mit einem Tränkefass einschütten, einmalige Anwendung	1

Kaffeepflanze <i>Coffea</i> L. (Rubiaceae) Samen	Kaffee-Schnaps	Durchfall lehmig	Kalb	1.5 EL Kaffeepulver (ca. 10g) mit 1.5L heissem Wasser übergiessen. Kaffeepulver nicht absieben, dann Bätzi (Obstbrandwein) dazugeben (1/2dl Schnaps bei einem Kalb und 6dl Schnaps bei einer Kuh) und lauwarm verwenden.	1-1.5L Kaffee und 0.5dl Schnaps mit einer Nuggiflasche verabreichen, einmalige Anwendung	1
Kaffeepflanze <i>Coffea</i> L. (Rubiaceae) Samen	Kaffee-Schnaps	Kolik	Kuh	6KL Kaffeepulver (ca. 60g) mit 7.5dl hiessem Wasser übergiessen. Ca. 20min ziehen lassen und dann 2.5dl Schnaps (Bätzi) dazugeben. Kaffeepulver nicht absieben, lauwarm verwenden.	1L Kaffee-Schnaps mit der Flasche eingeben, einmalige Anwendung	1
Kaffeepflanze <i>Coffea</i> L. (Rubiaceae) Samen	Kaffee-Schnaps	allgemeines Unwohlsein (nid so zwäg), Magen-Darm-Beschwerden	Kalb	1 KL lösliches Kaffeepulver (ca.2g) in 2dl heissem Wasser auflösen und ein Schnapsgläschen voll Bätzi (ca. 0.25dl) dazugeben, lauwarm verwenden.	1x täglich mit einer grossen Spritze lauwarmen Kaffee eingeben	1
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Kraut	Kamille	Bauchschmerzen, mudrig	Ziege	Kamille an einem gut belüfteten Ort am Schatten aufhängen zum trocknen.	1 Hand voll Kamille (ca. 13g) 2x täglich zum Heu geben	2
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Durchfall	Kalb	Kamille am Schatten lufttrocknen. 1EL Kamillenblüten (ca. 1.5g) mit 1L heissem Wasser übergiessen und 5-10min ziehen lassen, durch ein Sieb absieben und lauwarm verwenden.	morgens und abends 1L Kamillentee zur Milch geben	2
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Durchfall	Kalb	Kamille auf dem Ofen oder auf dem Dörrex trocknen. 1 EL Kamillenblüten (ca. 2g) mit 1L heissem Wasser übergiessen und 10min ziehen lassen, mit einem Sieb absieben und 4EL Zucker und 1KL Salz dazugeben.	am Mittag 1L Kamillentee mit der Nuggiflasche verabreichen	1

Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Durchfall	Kalb	Kamille in einem gut durchlüfteten Raum am Schatten trocknen. 1 Hand voll Blüten (ca. 5.8g) mit 1L heissem Wasser übergießen und 5-10min ziehen lassen. Danach durch ein Sieb absieben und 1KL Salz und 1EL Zucker dazugeben, lauwarm verwenden.	3x täglich 1L Kamillentee mit der Nuggiflasche eingeben, Milchersatz	3
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	leichter Durchfall	Kalb	5 Beutel Kamille (5.5g) mit 2L heissem Wasser übergießen und 30min ziehen lassen. 2EL Traubenzucker un 1/2 KL Salz dazugeben, lauwarm verwenden.	2x täglich zwischen den Milchmahlzeiten 1.5L Kamillentee mit Nuggiflasche verabreichen	2
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	schwerer Durchfall	Kalb	5 Beutel Kamille (5.5g) mit 2L heissem Wasser übergießen und 30min ziehen lassen. 2EL Traubenzucker un 1/2 KL Salz dazugeben, lauwarm verwenden.	4 mal täglich 2L Kamillentee mit der Nuggiflasche verabreichen, Milchersatz, 1-2 Tage	4
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Durchfall	Kalb	1 Hand voll Kamille (ca. 9g) mit 1L heissem Wasser übergießen und ca. 15min ziehen lassen, dann Blüten mit einem Sieb absieben.	2-3x täglich 1L Kamillentee mit einem Schoppen verabreichen	2
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Durchfall	Kalb	5 Kamillenblüten (0.15g) mit 1L heissem Wasser übergießen und ca. 15min ziehen lassen. Dann 1KL Salz dazugeben, Blüten nicht absieben.	morgens und abends 1/2L Kamillentee zur Milch geben	2

Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Durchfall	Kalb	5 Kamillenblüten (0.15g) mit 1L heissem Wasser übergießen und ca. 15min ziehen lassen. Dann 1KL Salz dazugeben, Blüten nicht absieben.	morgens und abends 1L Kamillentee mit Kälberkessel verabreichen, keine Milch mehr	2
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	leichter Durchfall	Kalb	2 Beutel Kamillentee (3g) mit 2L heissem Wasser übergießen und ca. 2h ziehen lassen. Danach ein wenig Bätzi (Obstbrandwein) zum Tee geben (10ml auf 10kg Körpergewicht) und lauwarm verwenden.	2x täglich 1.5L Kamillentee mit Schnaps mit Nuggiflasche verabreichen	2
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Durchfall	Kalb	Kamillenblüten am Schatten lufttrocknen. 1EL Kamillenblüten (ca. 1.2g) mit 1L heissem Wasser übergießen und ca. 20min ziehen lassen, durch ein Sieb absieben.	2x täglich 1L Kamillentee in die Milch geben, Milch auf die Hälfte reduzieren	2
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Durchfall	Kalb	Kamille an einem gut durchlüfteten Ort am Schatten trocknen. 1 Hand voll Kamillenblüten (ca. 5.5g) mit 1L heissem Wasser übergießen und 5-10min ziehen lassen. Danach durch ein Sieb absieben und 1EL Zucker und 1KL Salz dazugeben, lauwarm verwenden.	2x täglich 1L Kamillentee mit dem Schoppen verabreichen	2
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Magenverstimmungen	Ziege	2 Beutel Kamillentee mit 2dl heissem Wasser übergießen und 10min ziehen lassen, lauwarm verwenden.	2x täglich 2dl Kamillentee mit einer Flasche eingeben	2

Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Durchfall	Kalb	3g Kamille mit 1L heissem Wasser übergiesen un 5-10min ziehen lassen, danach absieben mit einem Sieb.	morgens und abends 1L Kamillentee in die Milch geben, Milchmenge halbieren auf 1L	2
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Futterumstellung von Milch auf Getreide, Durchfallprophylaxe	Ferkel	1 Beutel Kamillentee (1.5g) mit 1L heissem Wasser übergiesen und 10 min ziehen lassen. Ein wenig Zucker dazugeben, damit die Tiere den Tee besser trinken.	2-3x täglich 1L Kamillentee in einer Schale unter den Futterautomaten stellen	2
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Verdauungsbeschwerden, wenn Tiere die Milch nicht so gut vertragen	Kalb	1 KL Kamillenblüten (0.5g) in 1.5L kaltes Wasser geben und aufkochen, dann Herdplatte abstellen und 10min ziehen lassen und absieben mit einem Sieb.	2-3x täglich 1/2L Kamillentee mit der Nuggiflasche verabreichen	2
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Verdauungsbeschwerden, nid so zwäg	Kalb	2 Kamillenteebeutel (ca. 3g) mit 1L heissem Wasser aufgiessen und 10min ziehen lassen.	1/2 L Kamillentee morgens und abends in die Milch geben	2
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Kälberdurchfall	Kalb	3 Kamillenteebeutel (3g) mit 1 L heissem Wasser übergiesen und ca. 15 min ziehen lassen.	2x täglich 1L Kamillentee in die Milch geben	2
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Durchfall, Flüssigkeitszufuhr	Kalb	Zum trocknen Kamillensträusslein zusammenbinden und am Schatten aufgehängt. 2-4 Sträusslein (entspricht ca. 1 Hand voll Blüten) in 2L Wasser aufkochen und dann 10min ziehen lassen. Danach absieben mit einem Sieb.	3x täglich mit Nuggiflasche 1L Kmillenee verabreicht	3

Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Magenbeschwerden, Kollik	Kalb	Blüten am Schatten auf einer Zeitung trocknen. Ca. 2g Blüten in 1L Wasser aufkochen und 10 min ziehen lassen, absieben mit Sieb.	1 L Tee in 1 L Milch geben am Morgen und am Abend, mit Kälberkessel verabreicht	2
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Durchfall, wenn Tiere nicht mehr trinken wollen	Kalb	Kamillenblüten auf dem Ofen oder dem Dörrex trocknen. 1 L Wasser aufkochen und 1 Hand voll Kamille (ca. 6g) mit hiessem Wasser übergießen, 10-15 min ziehen lassen und danach absieben mit Sieb.	2x täglich 1L Kamillentee mit Nuggiflasche eingeben	2
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Durchfall	Kalb	Kamillenblüten auf dem Ofen oder dem Dörrex trocknen. 1 L Wasser aufkochen und 1 Hand voll Kamille (ca. 6g) mit hiessem Wasser übergießen, 10-15 min ziehen lassen und danach absieben mit Sieb.	2x täglich 1L Kamillentee in die Milch geben	2
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee mit Traubenzucker und Salz	leichter Durchfall	Kalb	1 KL voll Kamillenblüten (0.5g) in 1.5L kaltes Wasser geben und aufkochen. Dann Herdplatte abstellen und 10min ziehen lassen und absieben mit einem Sieb. 1 Hand voll Traubenzucker (13g) und 1KL Salz dazugeben.	3-4x täglich 1/2L lauwarmen Kamillentee mit Zucker und Salz mit der Nuggiflasche verabreichen, dazu am 1. Tag Milch ganz absetzen	3
Kartoffel <i>Solanum tuberosum</i> L. (Solanaceae) Knolle	Kartoffeln	Ausputzmittel, reinigt Gebärmutter	Kuh	Kartoffeln vor dem Verwenden klein schneiden.	morgens und abends ca. 3kg Kartoffeln zum Futter geben	2
Wirz (Wirsing) <i>Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda</i> L. (Brassicaceae) Blätter	Kohltrank	Magen-Darm-Beschwerden, Kollik	Kuh	Kohlblätter am Schatten lufttrocknen und zermahlen. 2 EL Kohlpulver in 1L Wasser und 1/2 L Rotwein aufkochen und abkühlen lassen bis lauwarm, Kohlpulver nicht absieben.	1.5L Kohltrank mit einer Flasche eingeben, einmalige Anwendung	1

Kümmel <i>Carum carvi</i> L. (Apiaceae) Früchte	Kümmel	Kälberdurchfall	Kalb		1 EL Kümmelpulver (4g) direkt ins Maul geben, einmalige Anwendung	1
Flachs/Lein <i>Linum usitatissimum</i> L. (Linaceae) Samen	Leinkuchenmehl	Durchfallprophylaxe, schleimt den Darm	Kalb		70g Leinkuchenmehl morgens und abends in die Milch (4L) geben, über den ganzen Sommer	2
Flachs/Lein <i>Linum usitatissimum</i> L. (Linaceae) Samen	Leinsamen	Durchfall	Kalb	1 EL Leinsamen (14g) mit 1dl heissem Wasser übergiessen und ca. 20min ziehen lassen, Brei lauwarm verabreichen.	2x täglich mit einer grossen Spritze den Leinsamenbrei eingeben, 2-3h Abstand zur Milchmahlzeit	2
Flachs/Lein <i>Linum usitatissimum</i> L. (Linaceae) Samen	Leinsamen	akuter Durchfall (ab 3-4 Monaten)	Kalb	Ca. 500g Leinsamen mit 2L heissem Wasser übergiessen, so dass ein dickflüssiger Brei entsteht.	1 Becher Leinsamenbrei (2.5dl) morgens und abends in die Milch geben	2
Flachs/Lein <i>Linum usitatissimum</i> L. (Linaceae) Samen	Leinsamenschleim	Kälberdurchfall	Kalb	1 Tasse Leinsamen (ca. 175g) in 10L Wasser geben, aufkochen und ca. 1h kochen lassen. Muss so dünn sein, dass der Schleim mit der Nuggiflasche verabreicht werden kann.	3x täglich an Stelle der Milch 2L Leinsamenschleim mit Nuggikessel verabreichen	3
Majoran <i>Origanum majorana</i> L. (Lamiaceae) Blätter	Majorantee	Kälberdurchfall	Kalb	Majoranblätter auf dem Dörrex trocknen. 1 EL zerriebene Blätter (ca.5g) mit 5dl heissem Wasser übergiessen und 10min ziehen lassen. Blätter nicht absieben, lauwarm verwenden.	2x täglich 1/2L Majorantee zur Milch geben	2

Muskatbaum <i>Myristica fragrans</i> Houtt. (Myristicaceae) Kraut	Muskatnuss	Prophylaxe Blähungen, im Frühling	Kuh		eine ganze Muskatnuss jedem Tier eingeben, bevor sie auf die Wiede gelassen werden, einmalige Anwendung	1
Muskatbaum <i>Myristica fragrans</i> Houtt. (Myristicaceae) Kraut	Muskatnuss	Kälebrdurchfall, sehr wässrig	Kalb		morgens und abends je 1 KL Muskatnuss direkt eingeben	2
Muskatbaum <i>Myristica fragrans</i> Houtt. (Myristicaceae) Kraut	Muskatnuss mit Joghurt	Durchfall	Kalb		ca. 100g Naturjoghurt mit 1KL Muskatnuss (ca.1.5g) mischen und mit der Hand ins Maul geben, einmalige Anwendung	1
Gewöhnliche Osterluzei <i>Aristolochia clematitis</i> L. (Aristolochiaceae) Kraut	Osterluzeitee	Veradungsbeschwerden	Ziege	Osterluzei an einem gut belüfteten Ort am Schatten trocknen. 2 Hand voll Osterluzeikraut mit 3L heissem Wasser übergiessen und ca. 1h ziehen lassen, nicht absieben.	2x täglich mit einer Spritze 1dl Osterluzeitee eingeben	2
Karotte <i>Daucus carota</i> L. (Apiaceae) Knolle	Rüebli	Verdauungsbeschwerden Prophylaxe	Ziege	Rüebli vor dem verwenden mit dem Gartenhäcksler zerkleinern.	ca. 150g zerkleinerte Karotten einmal täglich übers Futter geben	1
Garten-Salbei <i>Salvia officinalis</i> L. (Lamiaceae) Blätter	Salbeitee	Magen-Darm-Beschwerden, Durchfall, adulte Tiere	Ziege	Salbeiblätter an einem gut durchlüfteten Ort am Schatten trocknen. 1KL getrocknete Salbeiblätter (0.6g) mit 1/2L heissem Wasser übergiessen und ca. 20min ziehen lassen. Danach absieben durch ein Sieb, lauwarm verwenden.	2x täglich mit einer Flasche 1/2L Salbeitee eingeben	2
Garten-Salbei <i>Salvia officinalis</i> L. (Lamiaceae) Blätter	Salbeitee	Magen-Darm-Beschwerden, Durchfall, juvenile Tiere	Ziegenlamm	Salbeiblätter an einem gut durchlüfteten Ort am Schatten trocknen. 1KL getrocknete Salbeiblätter (0.6g) mit 1/2L heissem Wasser übergiessen und ca. 20min ziehen lassen. Danach absieben durch ein Sieb, lauwarm verwenden.	ca. 1dl Salbeitee morgens und abends zur Milch (1L) geben und mit einem Schoppen verabreichen	2

Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i> L. (Asteraceae) Blüte	Schafgarbentee	Magen-Darm-Beschwerden mit Durchfall, adulte Tiere	Ziege	Schafgarbe an einem gut durchlüfteten Ort am Schatten trocknen. 1KL Schafgarbenblüten (0.6g) mit 1/2L heissem Wasser übergiessen und ca. 20min ziehen lassen. Danach durch ein Sieb absieben und Tee lauwarm verwenden.	2x täglich 1/2L Schafgarbentee mit einer Flasche eingeben	2
Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i> L. (Asteraceae) Blüte	Schafgarbentee	Magen-Darm-Beschwerden mit Durchfall, juvenile Tiere	Ziegenlamm	Schafgarbe an einem gut durchlüfteten Ort am Schatten trocknen. 1KL Schafgarbenblüten (0.6g) mit 1/2L heissem Wasser übergiessen und ca. 20min ziehen lassen. Danach durch ein Sieb absieben und Tee lauwarm verwenden.	morgens und abends 2dl Schafgarbentee in die Milch (1L) geben und mit dem Schoppen verabreichen	2
Teepflanze <i>Camellia sinensis</i> (L.) O. Kuntze. (Theaceae) Blätter	Schwarztee	Durchfall	Kalb	2 Beutel Schwarztee (3g) mit 1L heissem Wasser übergiessen und ca. 10min ziehen lassen, Tee lauwarm verwenden.	morgens und abends 2dl Tee zur Milch geben	2
Teepflanze <i>Camellia sinensis</i> (L.) O. Kuntze. (Theaceae) Blätter	Schwarztee	Durchfall	Kalb		2x täglich ca. 1g Schwarztee mit der Hand verfüttern, damit Kälber es besser fressen etwas Salz darüber geben	2
Teepflanze <i>Camellia sinensis</i> (L.) O. Kuntze. (Theaceae) Blätter	Schwarztee	Durchfall	Kalb	12g Schwarztee in einen grossen Teebeutel füllen und mit warmem (nicht kochendem) Wasser übergiessen, über Nacht ziehen lassen. Am nächsten Morgen verwenden.	1 Kessel mit 3L Schwarztee den ganzen Tag zur freien Verfügung stellen	1

Teepflanze <i>Camellia sinensis</i> (L.) O. Kuntze. (Theaceae) Blätter	Schwarztee	Durchfall	Ferkel	1 Beutel Schwarztee (ca. 1.5g) mit 1L heissem Wasser übergiessen und 10min ziehen lassen.	1L Schwarztee 2x täglich übers Futter geben	2
Teepflanze <i>Camellia sinensis</i> (L.) O. Kuntze. (Theaceae) Blätter	Schwarztee	Prophylaxe Kälberdurchfall	Kalb	6 Schwarzteebeutel (1.8g pro Beutel) mit 1L heissem Wasser aufgiessen und 15min ziehen lassen.	0.5L Schwarztee in Milchmahlzeit (3L) geben morgens und abends	2
Teepflanze <i>Camellia sinensis</i> (L.) O. Kuntze. (Theaceae) Blätter	Schwarztee	sehr starker Kälberdurchfall	Kalb	6 Schwarzteebeutel (1.8g pro Beutel) mit 1L heissem Wasser aufgiessen und 15min ziehen lassen.	Milchmahlzeit (2L) morgens und abends mit 2L Schwarztee verdünnen	2
Teepflanze <i>Camellia sinensis</i> (L.) O. Kuntze. (Theaceae) Blätter	Schwarztee	Durchfall, wenn Tiere nicht mehr trinken wollen	Kalb	Ca. 10g Schwarztee mit 1 L heissem Wasser übergiessen und 10-15 min ziehen lassen, absieben mit Sieb.	2x täglich 1L Schwarztee mit der Flasche eingeben	2
Teepflanze <i>Camellia sinensis</i> (L.) O. Kuntze. (Theaceae) Blätter	Schwarztee	Durchfall	Kalb	Ca. 10g Schwarztee mit 1 L heissem Wasser übergiessen und 10-15 min ziehen lassen, absieben mit Sieb.	2x täglich 1L Schwarztee in 3-4 L Milch geben	2
Teepflanze <i>Camellia sinensis</i> (L.) O. Kuntze. (Theaceae) Blätter	Schwarztee	Kälberdurchfall, Anfangsstadium	Kalb	3 KL (11g) Schwarztee mit 0.5 L heissem Wasser übergiessen und ca. 10 min ziehen lassen. Danach absieben mit einem Sieb und 1 KL Salz (5g) dazugeben.	2x täglich 1L lauwarmen Schwarztee mit Schoppen (Petflasche mit Nuggi) eingeben, wenn Tiere nicht mehr schlucken können mit einer Sonde direkt in den Magen, je nach Zustand des Tieres auch 3x täglich verabreicht	2
Teepflanze <i>Camellia sinensis</i> (L.) O. Kuntze. (Theaceae) Blätter	Schwarztee mit Ei	Durchfall	Kalb	1 Beutel Schwarztee (2g) mit 1.5L heissem Wasser übergiessen und 2-3min ziehen lassen. Tee etwas abkühlen lassen und dann 1 Ei dazugeben und gut rühren, immer frisch verwenden.	2-3x täglich 1.5L Schwarztee mit einem Ei mit dem Kälberkessel verabreichen, Milch absetzen	2

Teepflanze <i>Camellia sinensis</i> (L.) O. Kuntze. (Theaceae) Blätter	Schwarztee mit Joghurt	Kälberdurchfall, lehmiger Durchfall	Kalb	6 Beutel Schwarztee mit 1L heissem Wasser aufgiessen und 15min ziehen lassen.	1L Schwarztee und 1 Becher Naturjoghurt (180g) morgens und abends in die Milch geben	2
Virginischer Tabak <i>Nicotiana tabacum</i> L. (Solanaceae) Blätter	Tabak	Blähungen	Kuh		1 Hand voll Tabak (ca. 40g) direkt ins Maul eingeben	1
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymian	Magen-Darm-Beschwerden, wenn Tiere nicht richtig fressen	Kuh		morgens und abends 1 Hand voll getrockneten Thymian (ca. 5.6g) direkt ins Maul geben	2
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymian	Durchfall	Kalb		2x täglich 10g getrockneten Thymian zum Futter geben	2
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymiantee	Kälberdurchfall	Kalb	1 KL Thymian (0.75g) mit 1L heissem Wasser übergießen und 2 KL Salz dazugeben, ziehen lassen bis lauwarm (ca. 30min). Thymiankraut nicht absieben.	1L Thymiantee 2-3x täglich mit der Nuggiflasche verabreichen, zwischen den Milchmahlzeiten	2
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymiantee	Durchfall	Kalb	1EL Thymian (2g) in 2L 40-50°C warmes Wasser geben und über den Tag ziehen lassen, am Abend absieben und verwenden.	mit der Nuggiflasche morgens und abends 0.5L Thymiantee verabreichen	2
Gemeiner Tormentill <i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch. (Rosaceae) Wurzel	Tormentilltee	Durchfall	Kalb	Blutwurzurzeln am Schatten lufttrocknen. 10g fein geschnittene Wurzeln in 5L kaltes Wasser geben, aufkochen und 15min bei mittlerer Hitze ziehen lassen, durch ein Sieb absieben. Tee kann am Abend noch einmal aufgewärmt werden.	1-1.5L lauwarmen Blutwurztee 2-3x täglich mit dem Schoppen verabreichen	2

Gemeiner Tormentill <i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch. (Rosaceae) Blüte	Tormentilltee	Durchfall	Kalb	8-10 frische Blutwurzblüten mit 1L heissem Wasser übergießen und ca. 20 min ziehen lassen, mit einem Sieb absieben, lauwarm verwenden.	1L Blutwurztee in die Milch geben morgens und abends, Milchmenge auf 1L reduzieren	2
Gemeiner Tormentill <i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch. (Rosaceae)	Tormentill-Tinktur	Durchfall	Kalb	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt.	5 Tropfen Tormentill-Tinktur 2x täglich zur Milch geben	2
Gundelrebe <i>Glechoma hederacea</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Unterrebentee	Verdauungsbeschwerden	Ziege	1 Hand voll frische Gundelrebe mit 1L heissem Wasser übergießen und 10min ziehen lassen. Danach mit einem Sieb absieben und 1KL Zucker dazugeben.	1L Gundelrebentee 2x täglich in einem Kessel verabreichen, Tiere trinken es selbst	2
Gundelrebe <i>Glechoma hederacea</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Unterrebentee	Verdauungsbeschwerden	Kuh	1 Hand voll frische Gundelrebe mit 1L heissem Wasser übergießen und 10min ziehen lassen. Danach mit einem Sieb absieben und 1KL Zucker dazugeben.	5L Gundelrebentee mit einem Tränkerohr einschütten 2x pro Tag	2
Gemeiner Wacholder <i>Juniperus communis</i> L. (Cupressaceae) Kraut	Wacholder	Darmverschluss	Ziege		frischen Wacholder zur freien Verfügung stellen, Tiere können so viel fressen, wie sie wollen	11
Silber-Weide <i>Salix alba</i> L. (Salicaceae) Rinde	Weidenrinde	lahmer Gang, Bewegungsapparat, Schmerzmittel	Pferd		2x täglich ca. 25g getrocknete Weidenrinde ins Futter geben	2
Zweigriffeliger Weissdorn <i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC. (Rosaceae) Zweige	Weissdorn	Flechten	Rind		ein Büschel mit mehreren Weissdornzweigen im Stall an der Decke aufhängen	
Weisstanne <i>Abies alba</i> Mill. (Pinaceae) Zweige	Weisstanne	Verdauungsanregung	Ziege		im Winter mehrere Weisstannenäste im Stall aufhängen, zur freien Verfügung	

Weisstanne <i>Abies alba</i> Mill. (Pinaceae) Zweige	Weisstanne	Prophylaxe Verdauungsbeschwerden	Ziege	Weisstannenäste mit dem Gartenhäcksler zerkleinern zu ca. 1cm grossen Stücken.	eine Hand voll (ca. 100-150g) frische Tannenstücke am Abend übers Futter geben	1
Wermut <i>Artemisia absinthium</i> L. (Asteraceae) Kraut	Wermut	Appetitlosigkeit, appetitanregend	Kuh		1 Hand voll getrockneten Wermut (50g) direkt eingeben, möglichst neben die Zunge, damit die Tiere es schlucken	1
Wermut <i>Artemisia absinthium</i> L. (Asteraceae) Kraut	Wermut	verminderte Leberfunktion, Aceton	Kuh		1 Hand voll getrockneten Wermut (50g) direkt eingeben, möglichst neben die Zunge, damit die Tiere es schlucken	1
Wermut <i>Artemisia absinthium</i> L. (Asteraceae) Kraut	Wermuttee	Durchfall	Kalb	Wermutkraut in einem gut belüfteten Ort am Schatten trocknen. 1 EL Wermutkraut (ca. 1g) mit 1L heissem Wasser übergiessen und ca. 20min ziehen lassen, durch ein Sieb absieben und lauwarm verwenden.	2x täglich 1L Wermuttee in die Milch geben, Milch verdünnen mit Tee	2
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Verdauungsprobleme	Rind	Ca. 2.15g getrocknete Blüten mit 1L heissem Wasser überbrühen	2x täglich ca. 1L Tee einschütten	
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Kraut	Kamillentee	Durchfall	Rind	Ca. 200g frisches Kamillenkraut in 5L heisses Wasser geben und 15 Minuten ziehen lassen, absieben wenn Tee gebraucht wird	2-3x täglich 1L Tee verabreichen (evt. In 1L Milch)	3
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Unwohlsein im Bauch	Rind	4 Beutel (ca. 8g) gerocknete Kamillenblüten in 1L klates Wasser geben und aufkochen, 10-15 Minuten ziehen lassen, absieben	2x täglich ca. 1L Tee einschütten	1

Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Durchfall	Rind	4 Beutel (ca. 8g) gerocknete Kamillenblüten in 1L klates Wasser geben und aufkochen, 10-15 Minuten ziehen lassen, absieben	3x täglich ca. 0.5-1L Tee mit Nuggiflasche eingeben	1-2 Tage
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Durchfall	Rind	1 Handvoll getrocknete Kamillenblüten mit 0.5-1L heissem Wasser übergiesen und 5-10 Minuten ziehen lassen, danach absieben	1-2x täglich 1-2L tee mit dem Nuggikessel verabreichen	
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Durchfall	Rind	Ca. 3.5g getrocknete Kamillenblüten in 1L kaltes Wasser geben, erwärmen (nicht ganz auf Siedepunkt), 5-10 Minuten ziehen lassen, danach absieben	2-3x täglich ca. 1L Tee mit Nuggikessel verabreichen	1-2 Tage
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Kraut	Kamillentee	Starker Durchfall	Rind	Ca. 24g getrocknetes Kamillenkraut mit 2L heissem Wasser übergiesen, 10 Minuten ziehen lassen, 1 TL Salz (ca. 5g) und 3 TL Traubenzuckerpulver (ca. 20g) zufügen	3x täglich 1.5-2L Tee mit dem Schlauch eingeben	3
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Kraut	Kamillentee	Durchfall	Rind	Ca. 24g getrocknetes Kamillenkraut mit 2L heissem Wasser übergiesen, 10 Minuten ziehen lassen, 1 TL Salz (ca. 5g) und 3 TL Traubenzuckerpulver (ca. 20g) zufügen	2x täglich ca. 2L Tee mit den Zusätzen zu 2L Milch in Nuggikessel verabreichen	3

Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Durchfall	Rind	Ca. 50g getrocknete Kamillenblüten mit 5L heissem Wasser überbrühen, zudecken und 30 Minuten ziehen lassen, absieben	2x täglich ca. 2dl Tee in Milch geben	5
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Verdauungsproblem	Schwein	Ca. 6g getrocknete Kamillenblüten mit 4L heissem Wasser überbrühen, 10-15 Minuten ziehen lassen, absieben	2-3x täglich ca. 1L Tee in Kessel geben	4
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Durchfall	Rind	Ca. 6g getrocknete Kamillenblüten mit 4L heissem Wasser überbrühen, 10-15 Minuten ziehen lassen, absieben	3x täglich ca. 0.5L Tee einschütten	4
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Durchfall	Rind	Ca. 5.8g frische Blüten in 1L kaltes Wasser geben, erhitzen (nicht kochen), 5-10 Minuten ziehen lassen, danach absieben	Einmalig 3x täglich 0.5L Tee einschütten	1
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Bauchschmerzen	Rind	2 EL Kamillenblüte(ca. 7g) mit 1L heissem Wasser überbrühen und 5 Minuten ziehen lassen und absieben	Einmalig 1L Tee einschütten (eventuell 0.5L Träsch beifügen)	1
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Durchfall	Rind	2 EL Kamillenblüte(ca. 7g) mit 1L heissem Wasser überbrühen und 5 Minuten ziehen lassen und absieben	2x täglich 1L Tee in 1L Milch geben	1
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Durchfall	Rind	ca. 1.7g Blüten in 1L kaltes Wasser geben und erwärmen, 10 Minuten ziehen lassen	0.5L Tee mit 0.5L Milch mischen und 2-3x täglich verabreichen	2
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Durchfall	Rind	Ein Beutel Kamillentee (ca. 3g) mit 1L heissem Wasser überbrühen, 15 Minuten ziehen lassen	2-3x täglich ca. 1L Kamillentee verabreichen (in 1L Milch)	1-3 Tage
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Durchfall	Rind	Ca. 1.95g getrocknete Kamillenblüten mit 2L heissem Wasser überbrühen und 15 Minuten ziehen lassen, danach absieben	1L Tee in 2L Milch geben und 2x täglich lauwarm eingeben	2-7 Tage

Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Durchfall	Rind	Ca. 7.7g getrocknete Kamillenblüten mit 2L kaltem Wasser in Pfanne geben, kurz aufkochen, wenige Minuten (5min) ziehen lassen und dann absieben	Ca. 2L Tee 2x täglich eingeben	2
Beinwell, Wallwurz <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae) Blätter	Beinwellblätter	Verdauungsbeschwerden	Rind		1x täglich ca. 12.5g getrocknete Blätter zum Futter geben	1-2 Tage
Beinwell, Wallwurz <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae) Blätter	Beinwellblätter	Verdauungsbeschwerden	Rind		1x täglich ca. 12.5g getrocknete Blätter zum Futter geben	1-2 Tage
Fenchel <i>Foeniculum vulgare</i> L. (Apiaceae) Früchte	Fencheltee	Durchfall	Rind	2 Beutel Fencheltee (ca. 4g) in 1-2L kaltes Wasser geben, kurz aufkochen und mit dem Deckel auf der Pfanne ziehen lassen	2-3x täglich ca. 1.5L Tee mit dem Nuggikessel verabreichen	
Fenchel <i>Foeniculum vulgare</i> L. (Apiaceae) Früchte	Fencheltee mit Yoghurt	Akuter Durchfall	Rind	1 Beutel Fencheltee (2g) mit einem Liter heissem Wasser übergießen, 3L kaltes Wasser zum Kühlen begeben	Ca. 4L lauwarmen Fencheltee pro Kalb zum Trinken hinstellen. Zur Behandlung mit Tee zusätzlich 1-2 EL Yoghurt pro Kalb direkt eingeben. Anwendung 2x täglich wiederholen	7
Lein, Flachs <i>Linum usitatissimum</i> L. (Linaceae) Samen	Flachschleim	Durchfall	Rind	Ca. 51g Leinsamen in einem Liter Wasser erwärmen, 20 Minuten ziehen lassen	2-3x täglich 3dl Flachsschleim in 0.5-1L Milch geben	2
Gänsefingerkraut <i>Potentilla anserina</i> L. (Rosaceae) Blätter	Gänsefingerkrauttee	Durchfall	Rind	Ca. 4-5 Blätter (ca. 0.4g) in 1L kaltes Wasser geben und erwärmen, 10 Minuten ziehen lassen, Blätter nicht absieben	2x täglich 0.5L Tee in 0.5L Milch lauwarm verabreichen	2

Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymian	Durchfall	Rind		2x täglich ca. 2g getrocknetes Thymiankraut zum Futter mischen	10
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymiantee	Durchfall	Rind	Ca. 50g getrocknetes Thymiankraut mit 5L heissem Wasser überbrühen, zudecken und 30 Minuten ziehen lassen, absieben	2-3x täglich ca. 1L Tee mit der Nuggiflasche eingeben	2-3 Tage
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymiantee	Durchfall	Rind	1EL Thymiankraut (ca. 4.3g) mit 1L heissem Wasser übergießen, 5 Minuten ziehen lassen, eventuell absieben	1L Tee in 1L Milch 2x täglich eingeben mit Nuggikessel	2
Zwiebel <i>Allium cepa</i> L. (Amaryllidaceae) Zwiebel	Zwiebel	Verdauungsbeschwerden	Rind	3-4 Zwiebeln hacken und dazu 0.5L Wasser und 0.5L Essig mischen	Einmalig 2x täglich ca. 0.5L einschütten	1
Gemeiner Tormentill <i>Potentilla erecta</i> (L.) Räuschel (Rosaceae) Wurzel	Tormentillpulver	Durchfall	Rind	1-2 gehäufte KL Tormentillpulver (ca. 22g) in Milch einrühren	2x täglich mit dem Nuggikessel verabreichen	
Gemeiner Tormentill <i>Potentilla erecta</i> (L.) Räuschel (Rosaceae) Wurzel	Tormentillpulver	Durchfall	Rind	1-2KL Tormentillpulver (ca. 22g) mit 2-2.5dl lauwarmen Wasser in eine Flasche geben und gut schütteln	2-3x täglich einschütten, vorher gut schütteln!	1-2 Tage
Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i> L. (Asteraceae) Kraut	Schafgarbe	Verdauungsbeschwerden	Schaf		Ca. 5g getrocknetes Schafgarbenkraut 2x täglich zu Futtermittel geben	1

Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i> L. (Asteraceae) Kraut	Schafgarbentee	Für Winterfütterung (auffüttern)	Bienen	Ca. 13g getrocknete Schafgarbenkraut mit einem Liter heissem Wasser übergiessen, 10-15 Minuten ziehen lassen. Zu einem Liter Schafgarbentee 2 Kamillenblüten beifügen. Tee frisch zubereiten.	1L Tee in ca. 20-25L Zuckerwasser geben, reicht einmalig für Wintermonate	
Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i> L. (Asteraceae) Blüte	Schafgarbentee	Durchfall	Rind	Ca. 18.7g getrocknete Schafgarbenblüten mit 4.5L kaltem Wasser in Topf geben und kurz aufkochen, 10-15 Minuten ziehen lassen und dann absieben	Ca. 4.5L 2x täglich eingeben	2-3 Tage
Ginseng <i>Panax ginseng</i> C.A. Meyer (Araliaceae) Wurzel	Ginseng	Gegen Festliegen	Rind		Einmalig ca. 5-10g Ginsengpulver mit der Hand oder einem Löffel eingeben	1
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Kraut	Brennesselkraut	Durchfall	Rind		2x täglich eine gute Menge getrocknetes Brennesselkraut unters Futter mischen	2
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Kraut	Brennesselkraut	Durchfall	Schwein		2x täglich ca. 1g pro Fährli ins Futter mischen	3
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Kraut	Brennesselkraut	Prophylaxe gegen Eisenmangel	Huhn		1x täglich ca. 0.6g Brennesselkraut (gemahlen) zu Futtermittel (Körner) geben, einmal pro Monat anwenden	1
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Blätter	Brennesselblätter	zum Entgiften	Rind		2x täglich ca. 3.4g getrocknete Brennesselblätter zum Futter geben	10

Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Kraut	Brennesselkraut	Prophylaxe gegen Verdauungsbeschwerden	Rind		ganzjährig zur freien Verfügung hinstellen	365
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Kraut	Brennesselkraut	Zur Entgiftung	Ziege		2x täglich einen Büschel frisches Brennesselkraut zum Fressen hinlegen	7-14 Tage
Kaffeeplanze <i>Coffea arabica</i> L. (Rubiaceae) Samen	Kaffeebohnenatz	Durchfall	Rind	Ca. 200-300g Kaffeebohnenpulver in kaltes Wasser geben und aufkochen, den Satz absieben	1x täglich ca. 200-300g Satz mit einem Löffel eingeben, anschliessend ein rohes Ei eingeben	
Kaffeeplanze <i>Coffea arabica</i> L. (Rubiaceae) Samen	Kafi-Schnaps	Bauchschmerzen	Rind	Ca. 1-1.5KL Kaffee auf 0.5L Wasser gebrauchen, ca. 0.5L Schnaps (40Vol.-%) beifügen und etwas Zucker	Einmalig ca. 1L Kafi-Schnaps einschütten	1
Kaffeeplanze <i>Coffea arabica</i> L. (Rubiaceae) Samen	Kafi-Schnaps	Verdauungsprobleme	Rind	Je 1/3 Kaffe, Schnaps (52Vol.-%) und Zucker mischen	1x täglich ca. 1.5L einschütten	1-2 Tage
Kaffeeplanze <i>Coffea arabica</i> L. (Rubiaceae) Samen	Kafi-Schnaps	Durchfall	Rind	2EL Kaffee (ca. 9.4g) mit 1L heissem Wasser aufgiessen, 2dl Schnaps (70Vol.-%) und 2-3EL Zucker beifügen	Einmalig ca. 1.2L Kafi-Schnaps einschütten	1
Kaffeeplanze <i>Coffea arabica</i> L. (Rubiaceae) Samen	Kafi-Schnaps	Magenverstimmung	Rind	2EL Kaffee (ca. 9.4g) mit 1L heissem Wasser aufgiessen, 2dl Schnaps (70Vol.-%) und 2-3EL Zucker beifügen	Einmalig ca. 1.2L Kafi-Schnaps mit 2dl Schnaps einschütten	1
Kaffeeplanze <i>Coffea arabica</i> L. (Rubiaceae) Samen	Kafi-Schnaps	Durchfall	Rind	3-4 EL Kaffee (ca. 21g) mit ca. 7dl heissem Wasser aufkochen, 3dl Schnaps (40Vol.-%) zufügen	Einmalig ganzer Ansatz lauwarm einschütten	1
Kaffeeplanze <i>Coffea arabica</i> L. (Rubiaceae) Samen	Kafi-Schnaps	Nach dem Kalben	Rind	1 EL Kaffee (ca. 6 g) mit einem Liter heissem Wasser aufgiessen, danach 2 dl Schnaps (40-45 Vol%) dazufügen	Ca. 1.1 L Kafi-Schnaps mit Flasche eingeben, einmalige Anwendung	1

Kümmel <i>Carum carvi</i> L. (Apiaceae) Früchte	Kümmel	Blähungen	Rind	Ca. 1 TL Kümmel (ca. 2.2g) mit 1L heissem Wasser übergießen, 3 Minuten ziehen lassen, nicht absieben	Einmalig 2-3x täglich 1L Tee mit 1L kaltem Wasser verdünnt mit Schlauch eingeben	1
Meerrettich <i>Armoracia rusticana</i> P. Gaerten. & al. (Brassicaceae) Wurzel	Meerrettich	Prophylaxe gegen Durchfall	Schwein		2x täglich ca. 7.5g getrockneter Meerrettich ins Futter geben	14-28 Tage
Meerrettich <i>Armoracia rusticana</i> P. Gaerten. & al. (Brassicaceae) Wurzel	Meerrettichtee	Durchfall	Rind	Ca. 15g getrockneten Meerrettich mit 1L heissem Wasser überbrühen und 10-15 Minuten ziehen lassen, danach absieben	2x täglich 1L Tee (in 2L Milch) mit dem Nuggikessel verabreichen	7-10 Tage
Oregano <i>Origanum vulgare</i> L. (Lamiaceae) n.a	Dosto@Liquid Oreganoöl	Akute Kokzidien	Huhn	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt	1-3L Dosto auf 1000l Trinkwasser	3-5 Tage
Oregano <i>Origanum vulgare</i> L. (Lamiaceae) n.a	Dosto@Liquid Oreganoöl	Durchfall	Huhn	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt	1L Dosto auf 9L Wasser das mit dem Dosatron auf 2% Trinkwasseranteil eingestellt	2
Hafer <i>Avena sativa</i> L. (Poaceae) Samen	Habersuppe	Durchfall	Rind	Ca. 1kg Haferflocken in 7L kaltes Wasser geben und 1-1.5h auskochen lassen auf kleinem Feuer bis der Brei schleimig ist. Ab un an rechtsrum rühren	Mit der Nuggiflasche 2x täglich eingeben und stets separat Wasser zur Verfügung stellen	2-7 Tage
Hafer <i>Avena sativa</i> L. (Poaceae) Samen	Haferschleim	Durchfall	Rind	Ca. 300-400g Flocken in 4L klates Wasser geben, aufkochen und ca. 30 Minuten ziehen lassen	1-2x täglich ca. 4L Flüssigkeit mit Sonde eingeben	1
Schwarzer Holunder <i>Sambucus nigra</i> L. (Caprifoliaceae) Zweige	Holder	Blähungen	Rind		Ein frischer Ast ins Maul klemmen	

Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. (Fagaceae) Rinde	Eichenrindenpulver	Durchfall Anfangsphase	Rind		2x täglich ca. 17g Eichenrindenpulver in Milch geben	5
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. (Fagaceae) Rinde	Eichenrinde	Durchfall	Schwein		2x täglich ca. 0.2g pro Tier ins Futter geben	10
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. (Fagaceae) Rinde	Eichenrinde	Durchfall	Rind		2x täglich ca. 9g zum Kurzfutter mischen	4
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. (Fagaceae) Rinde	Eichenrindenpulver	Durchfall	Rind	Ca. 8g Eichenrindenpulver, 60g Milchpulver und 90g Natureyoghurt in verdünnte Kuhmilch (1:4 mit Wasser verdünnt) geben so dass Flüssigkeit durch Nuggiflasche geht	3x täglich lauwarm mit Nuggiflasche eingeben	3
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. (Fagaceae) Rinde	Eichenrindentee	Durchfall	Rind	2 EL Eichenrindenpulver (ca. 24g) mit 1L warmen Wasser übergießen, 10 Minuten ziehen lassen, etwas Milchpulver (aufgelöst in Wasser) zugeben	3x täglich ca. 1L Tee mit Milchpulver verdünnt mit Nuggiflasche eingeben	3
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. (Fagaceae) Rinde	Eichenrindentee	Durchfall	Rind	Ca. 9g getrocknete Eichenrinde mit 3L heissem Wasser übergießen, 1-2h stehen lassen und dann absieben	2x täglich ca. 2-3L Eichenrindentee für 2-7 Tage eingeben (in ca. 3L Milch verdünnt)	4
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. (Fagaceae) Rinde	Eichenrindentee	Durchfall	Schwein	Ca. 30g Rinde in 4L kaltes Wasser geben, aufkochen lassen. Rinde 10-15 Minuten gut auskochen im sprudelnden Wasser, danach vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Den Rindenrückstand nicht absieben	Tee (ca. 4 L pro Sau) 3 x täglich bei den Sauen in Futtertrog geben	

Stumpfblättriger Ampfer, Blacke <i>Rumex obtusifolius</i> L. (Polygonaceae) Ganzpflanze	Blacke	Durchfall	Schwein		1x täglich 1-2 ganze, frische Blacken zum Fressen geben	3
Stumpfblättriger Ampfer, Blacke <i>Rumex obtusifolius</i> L. (Polygonaceae) Wurzel	Blackentee	Durchfall	Rind	Ca. 200g frische Blackenwurzel in 3L kaltes Wasser geben, 15 Minuten kochen lassen und dann abschütten	3x täglich ca. 1L Blackentee in 1L Milch geben, Tee vor Gebrauch nochmals kurz erwärmen	2
Stumpfblättriger Ampfer, Blacke <i>Rumex obtusifolius</i> L. (Polygonaceae) Wurzel	Blackentee	Durchfall	Rind	Eine Hand voll frische Blackenwurzel (ca. 20g) in kaltes Wasser geben (ca. 1L). Aufkochen und ein Paar weitere Minuten kochen lassen, 10 Minuten ziehen lassen und danach absieben	2x täglich einen halben Liter Tee in 2 Liter Milch geben	2
Stumpfblättriger Ampfer, Blacke <i>Rumex obtusifolius</i> L. (Polygonaceae) Wurzel	Blackentee	Durchfall	Rind	Ca. 20g Blackenwurzel (getrocknet) in kaltes Wasser geben (ca. 1L). Aufkochen und ein Paar weitere Minuten kochen lassen, 10 Minuten ziehen lassen und danach absieben	2x täglich einen halben Liter Tee in 2 Liter Milch geben	2
Teepflanze <i>Camellia sinensis</i> (L.) O. Kuntze. (Theaceae) Blätter	Schwarztee	Durchfall	Rind	Ca. 3.1g Schwarztee mit 1L heissem Wasser überbrühen, etwas ziehen lassen und danach absieben	3x täglich ca. 1L Tee in 3L Milch geben	2
Teepflanze <i>Camellia sinensis</i> (L.) O. Kuntze. (Theaceae) Blätter	Schwarztee	Durchfall	Rind	2 Beutel (ca. 4g) in 1L heisses Wasser geben, 10-15 Minuten ziehen lassen, absieben. Danach je 1 EL Zucker und Salz beifügen	3x täglich ca. 1L Tee mit der Nuggiflasche verabreichen	1-5 Tage

Teepflanze <i>Camellia sinensis</i> (L.)O. Kuntze. (Theaceae) Blätter	Schwarztee	Schlimmer Durchfall	Rind	2 Beutel Schwarztee (ca. 4g) mit 1L heissem Wasser übergiessen, 5-10 Minuten ziehen lassen. 1dl Elektrolytlösung und 1KL Natron beifügen	Einmalig 2-3x täglich 1L Tee mit den Zusätzen mit der Sonde eingeben	1
Teepflanze <i>Camellia sinensis</i> (L.)O. Kuntze. (Theaceae) Blätter	Schwarztee	Durchfall	Rind	Zwei Beutel Schwarztee (ca. 4g) mit 1L heissem Wasser übergiessen, 5-10 Minuten ziehen lassen. 1dl Elektrolytlösung dazu geben	2-3x täglich 1L Tee mit Nuggikessel verabreichen	1-2 Tage
Teepflanze <i>Camellia sinensis</i> (L.)O. Kuntze. (Theaceae) Blätter	Schwarztee	Durchfall	Rind	Ein Beutel Schwarztee (ca. 2g) mit 1L heissem Wasser überbrühen, 15 Minuten ziehen lassen	ca. 1L Tee in 1L Milch geben und 3-4x täglich verabreichen	1-3 Tage
Wermut <i>Artemisia absinthium</i> L. (Asteraceae) Blätter	Wermut-Tee	Verdauungsprobleme	Rind	3-4 Rispen frischen Wermut (ca. 3.3g) mit einem Liter heissem Wasser übergiessen und 10 Minuten ziehen lassen. Danach absieben	2x täglich einen halben Liter Wermut-Tee eingeben	2-3 Tage
Hausmittel						
	Lebertran	Blähungen	Rind		Einmalig ca. 0.5L einschütten	1
	Komposterde ohne Torf	Durchfall	Schwein	Ca. 1kg für 10 Fährli verwenden und ca. 200g Mehl beifügen	Alle 2 Tage etwas Erde ins Fährlinest streuen, eventuell wiederholen	3
	Coca cola	Durchfall bei Absetzfährli	Schwein		3x täglich einen Gutsch übers Futter geben	3

	Essig	Infektion	Huhn	1.5L Essig auf 8.5L Wasser	2% Anteil im Trinkwasser bis deutliche Besserung eintritt	
	Essig	Durchfall	Huhn	1.5L Essig auf 8.5L Wasser	2% Anteil im Trinkwasser, Prozedur evt. wiederholen	3-5 Tage
	Obstessig	Verdauungsprobleme	Rind		2x täglich für 1-2 Tage ca. 1dl Essig in 2-4L Milch geben	2
	Viehsalz	Acetonerkrankung	Rind		1-3x täglich etwas Salz ins Maul geben bis Kuh selber wieder Salz frisst (Zeichen für Anwendungsstopp)	1
	Obstessig	Zur Verdauungsförderung	Rind		1x täglich ca. 1-2dl Essig zum Futter geben	
	Kohlenpaste	Durchfall	Rind		1-2x täglich 3 Pumpstöße (ca. 45ml) Paste mit der Tube eingeben	1
	Pferdehaare	Entwurmung	Pferd		1x täglich geschnittenes Schweifhaar (0.5-1 handvoll) zum Futter geben	3
	Essig	Prophylaxe gegen Verdauungsbeschwerden vom Milch trinken	Rind	2-3 EL Essig in ca. 3L Milch geben	2x täglich für die ersten 2-3 Monate je 3L Essig-Milch einschütten	75
	Fischtran	Gegen Blähungen	Rind		Einmalig ca. 2dl Tran mit Einschüttflasche eingeben	1
	Obstessig	Durchfallprophylaxe	Rind		2x täglich ca. 3dl Essig eingeben	365
	Gemüsebouillon	Durchfall	Rind	1 EL Bouillon mit ca. 1.5-2L Wasser aufkochen	2x täglich Bouillonflüssigkeit eingeben	3
	Fährliherd und Essig	Durchfallprophylaxe	Schwein	Zu 1kg Herd ca. 1dl Essig zugeben	1x täglich für 3 Wochen den Herd mit dem Essig verabreichen	21
	Apfelessig	Verdauungsstörungen	Rind		Einmalige Gabe von 1L Apfelessig	1
	Kupfer 2 Röppler	Wenn Kuh nicht trächtig werden will	Rind		Einmalige Eingabe eines Kuper 2 Röpplers	1

	Milch mit Yoghurt	Durchfall in der Anfangsphase	Rind	3-4 EL Nature Yoghurt in ca. 4L Milch geben	2x täglich wiederholen bis Besserung eintritt		
	Essig	Durchfall	Kalb	es kann jede Art von Essig verwendet werden	morgens und abends 1dl Essig in die Milch geben	2	
	Joghurt	Durchfall	Kalb		1 Becher Naturjoghrt (180g) 2x täglich in die Milch geben	2	
	Torf	Durchfallprophylaxe, ältere Kälber	Kuh		2x täglich 1 Hand voll Torf zum Kraftfutter geben	10	
	Torf	schwerer Durchfall	Kalb		2x täglich 1 Hand voll Torf direkt ins Maul geben	2	
	Moortränke	Stärkung der Darmflora	Kalb		2EL Moortränke morgens und abends in die Milch einrühren	14	
	Joghurt und Essig	Durchfallprophylaxe	Kalb	1 EL Naturjoghurt und 0.5 EL Essig pro Liter Milch	3EL Naturjoghurt und 1.5EL Essig in 3L Milch geben, 3x täglich	40	
	Apfelessig	Durchfall	Kalb		2x täglich 20ml Apfelessig zur Milch geben	5	
	Naturjoghurt	Durchfallprophylaxe, beim Wechsel von Milch auf Getreide	Ferkel	1L warmen Joghurt (selbst hergestellt) mit 1.5L Wasser mischen und den Schweinen zur freien Verfügung stellen.	Joghurt-Wasser-Mischung in eine Schale geben und unter den Futterautomaten stellen	4	
	Elektrolytlösung	Durchfall, Flüssigkeitsverlust ausgleichen	Kalb	1 L heisses Wasser mit 5g Kochsalz und 50g Traubenzucker mischen, lauwarm verwenden.	3x täglich 1L Elektrolytlösung mit einer Saugflasche verabreichen	2	
Mischungen							
	Zitronenmelisse <i>Melissa officinalis</i> L. (Lamiaceae) Blätter	Magendarmtee	allgemeines Unwohlsein (nid so zwäg), Magen-Darm-Beschwerden	Ziege	1 Teebeutel mit 1.25dl heissem Wasser aufgiessen und 10min ziehen lassen, danach mit kaltem Wasser auf 2.5dl auffüllen und lauwarm verwenden.	1x täglich mit einer Flasche 2.5dl lauwarmen Tee eingeben	1
	Echter Zimtbaum <i>Cinnamomum verum</i> J.Presl (Lauraceae) Rinde						

Kümmel <i>Carum carvi</i> L. (Apiaceae) Früchte						
Anis <i>Pimpinella anisum</i> L. (Apiaceae) Früchte						
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte						
Fenchel <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. (Apiaceae) Früchte						
Pfeffer-Minze <i>Mentha arvensis</i> L. var piperascens (Lamiaceae) Blätter						
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymian und Eichenrindenpulver	Prophylaxe Kälberdurchfall, 2.-7. nach der Geburt	Kalb	Ca. 1/4 getrockneten Thymian und 3/4 Eichenrindenpulver mischen.	ein Kessel füllen mit der Mischung und den Kälbern zur Verfügung stellen, Tiere können so viel fressen, wie sie wollen	5
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. (Fagaceae) Rinde						
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. (Fagaceae) Rinde	Eichenrinde und Blutwurz	schwerer Durchfall	Kalb	1KL getrocknete Eichenrinde (3g) in 3dl kaltem Wasser einlegen und über Nacht ziehen lassen, danach mit 1KL Blutwurz (4g) und zusätzlich 1,7L Wasser aufkochen. Herdplatte abstellen und ca. 15min ziehen lassen, dann durch ein Sieb absieben.	3-4x täglich 1/2L Eichenrinden-Blutwurz-Tee mit dem Kälberkessel verabreichen, wenn Tiere es nicht trinken wollen etwas Zucker dazugeben, am 1. Tag Milch absetzen	2
Gemeiner Tormentill <i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch. (Rosaceae) Wurzel						

Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i> L. (Asteraceae) Blüte	Wermut- und Schafgarbenmischung	Verdauungsbeschwerden	Kuh	Schafgarbe zum trocknen an einem luftigen Ort am Schatten aufhängen. 1/2 Wermut und 1/2 Schafgarbe mischen.	1KL Wermut (0.25g) und 1KL Schafgarbe (0.25g) übers Gläck (Salzlecke) geben morgens und abends	2
Wermut <i>Artemisia absinthium</i> L. (Asteraceae) Blätter						
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Eichenrinden und Thymian-Tee	Durchfall, Verdauungsbeschwerden	Ferkel	1KL getrocknete Thymian (0.4g) und 3KL getrocknete Eichenrinde (10.2g) mit 1L heissem Wasser übergiessen und 10min ziehen lassen, danach absieben mit einem Sieb, immer frisch verwendet	2x täglich 1L Tee übers Futter der Schweine schütten	5
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. Fagaceae Rinde						
Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i> L. (Asteraceae) Kraut	Lebermischung	nach der Geburt, bei Problemtieren, die nicht richtig fressen wollen	Kuh	1/4 Wermutkraut, 1/4 Schafgarbenkraut, 1/4 Bockshornkleepulver und 1/4 Mariendistelkraut zusammen mischen.	1x täglich 1 Hand voll Lebermischung (50g) direkt eingeben, möglichst neben die Zunge, damit die Tiere es schlucken	10
Wermut <i>Artemisia absinthium</i> L. (Asteraceae) Kraut						
Mariendistel <i>Silybum marianum</i> L. (Asteraceae) Kraut						
Bockshornklee <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. (Fabaceae) Samen						

Hänge-Birke <i>Betula pendula</i> Roth (Betulaceae) Blätter	Stoffwechselformung	Störungen im Wasserhaushalt, Niere	Kuh	4 Teile Brennesselkraut, 4 Teile Löwenzahnwurzel, 1 Teil Birkenblätter und 1 Teil Holunderblüten in einem Messbecher abmessen und mischen.	morgens und abends 10g der Mischung übers Futter geben	7
Löwenzahn <i>Taraxacum officinale</i> F. H. Wigg. (Asteraceae) Wurzel						
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Blätter						
Schwarzer Holunder <i>Sambucus nigra</i> L. (Caprifoliaceae) Blüte						
Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i> L. (Asteraceae) Kraut	Verdauungsmischung	wenn Tiere kümmern, Verdauungsbeschwerden	Kuh	1/3 Enzianwurzel, 1/3 Bockshornkleesamen und 1/3 Schafgarbenkraut mischen.	5g der Mischung morgens übers Futter geben	7
Bockshornklee <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. (Fabaceae) Samen						
Gelber Enzian <i>Gentiana lutea</i> L. (Gentianaceae) Wurzel						
Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i> L. (Asteraceae) Kraut	Verdauungsmischung	wenn Tiere kümmern, Verdauungsbeschwerden	Kuh	1/3 Enzianwurzel, 1/3 Bockshornkleesamen und 1/3 Schafgarbenkraut mischen.	1-2g der Mischung morgens übers Futter geben	3
Bockshornklee <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. (Fabaceae) Samen						

Gelber Enzian <i>Gentiana lutea</i> L. (Gentianaceae) Wurzel						
Heidelbeere <i>Vaccinium myrtillus</i> L. (Ericaceae) Kraut	Blackensamen und Heidelbeerstaude	Durchfall	Kalb	2 Hand voll zerstoßen Blackensamen (ca. 50g) und 1 Hand voll Heidelbeerstaude (ca. 15g) in 3L Wasser geben, aufkochen und dann über Nacht ziehen lassen, am nächsten Tag absieben durch ein Sieb.	0.75L Tee und 0.75L heisses Wasser mischen und am Mittag mit der Nuggiflasche verabreichen	3
Stumpfbliättriger Ampfer, Blacke <i>Rumex obtusifolius</i> L. (Polygonaceae) Samen						
Wermut <i>Artemisia absinthium</i> L. (Asteraceae) Kraut	Ländertrank	Verdauungsbeschwerden	Kuh	1 Hand voll Wermut, 1 Hand voll Heidelbeerstaude, 1 Hand voll geschnittenen Ingwer, 1 Hand voll Nelken, 4 Zimtstengel, 1 Hand voll Wacholderschösslinge und 1 Tasse Zucker in 5L Wasser geben, aufkochen, abkalteln lassen und durch ein Sieb geben.	2x täglich 2.5L Ländertrank mit der Flasche eingeben	1
Gemeiner Wacholder <i>Juniperus communis</i> L. (Cupressaceae) Zweige						
Heidelbeere <i>Vaccinium myrtillus</i> L. (Ericaceae) Kraut						
Echter Zimtbaum <i>Cinnamomum verum</i> J.Presl (Lauraceae) Rinde						
Gewürznelke <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry (Myrtaceae) Früchte						
Ingwer Zingiber officinale Roscoe (Zingiberaceae) Wurzel						

Gelber Enzian <i>Gentiana lutea</i> L. (Gentianaceae) Wurzel	Kräutertee	Durchfall	Kalb	Einzianwurzel, Basilikumblätter, Salbei, Kamille, Schafgarbe, Sanikel und Goldmelissenblüten am Schatten lufttrocknen. Alle Pflanzen zu gleichen Teilen zusammen in einen Teebeutel geben und mit 1-1.5L heissem Wasser übergießen, 5-10min ziehen lassen.	2x täglich 1-1.5L Kräutertee mit der Nuggiflasche verabreichen	2
Basilikum <i>Ocimum basilicum</i> L. (Lamiaceae) Blätter						
Garten-Salbei <i>Salvia officinalis</i> L. (Lamiaceae) Kraut						
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte						
Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i> L. (Asteraceae) Blüte						
Sanikel <i>Sanicula europaea</i> L. (Apiaceae) Blätter						
Goldmelisse <i>Monarda didyma</i> L. (Lamiaceae) Blüte						
Wermut <i>Artemisia absinthium</i> L. (Asteraceae) Kraut	Kamillen-Wermut-Tee	Durchfall	Kalb	Ca. 5.6g frisches Kamillenkraut und 1.7g frisches Wermutkraut mit 0.5 Liter heissem Wasser überbrühen, 10-15 Minuten ziehen lassen und dann absieben. 1dl (70 Vol%) Schnaps dazugeben	2x täglich Teemischung eingeben	2
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Kraut						

Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. (Fagaceae) Rinde	Thymian-Eichenrinden-Tee	Durchfall	Kalb	1 EL getrocknetes Thymiankraut (ca. 4.3g) und ein KL getrocknete Eichenrinde (ca. 1.7g) in 0.5L kaltes Wasser geben und aufkochen. 10 Minuten ziehen lassen und dann absieben	2x täglich 0.5L Thymian-Eichenrinden-Tee für 2 Tage eingeben	2
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut						
Hanf <i>Cannabis sativa</i> L. (Cannabaceae) Blüte	Kräutertee mit Hanf	Durchfall	Kalb	Ca. 1 Beutel mit 1L heissem Wasser überbrühen und 15 Minuten ziehen lassen	ca. 1L Tee (in 1L Milch) 2-3x täglich verabreichen	2-3 Tage
Hopfen <i>Humulus lupulus</i> L. (Cannabaceae) Blüte						
Zitronen-Melisse <i>Melissa officinalis</i> L. (Lamiaceae) Blätter						
Wilde Malve <i>Malva sylvestris</i> L. (Malvaceae)						
Spitzwegerich <i>Plantago lanceolata</i> L. (Plantaginaceae) Blätter						
Gemeiner Frauenmantel <i>Alchemilla vulgaris</i> L. (Rosaceae) Kraut						
Grosse Brennnessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae)						

<p>Fenchel <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. (Apiaceae) Früchte</p>	Durchfalltropfen	Akuter Durchfall	Schwein	<p>Frische zerstossene Fenchelfrüchte mit Alkohol in einem Gefäss aufgiessen und gut bedecken (Alk. ca. 60Vol.-%), für 1 Monat an einen warmen Ort stellen und 1x täglich gut schütteln, danach mit einem Chromsthalssieb absieben und am Schluss abfiltrieren</p>	2x täglich für 1-2 Tage ca. 2ml Tropfen eingeben (1:10 mit Wasser verdünnt)	2
<p>Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe <i>Alchemilla millefolium</i> L. (Asteraceae) Kraut</p>				<p>Frisches geschnittenes Schafgarbenkraut mit Alkohol in einem Gefäss aufgiessen und gut bedecken (Alk. ca. 60Vol.-%), für 1 Monat an einen warmen Ort stellen und 1x täglich gut schütteln, danach mit einem Chromsthalssieb absieben und am Schluss abfiltrieren</p>		
<p>Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte</p>				<p>Frische Kamillenblüten mit Alkohol in einem Gefäss aufgiessen und gut bedecken (Alk. ca. 60Vol.-%), für 1 Monat an einen warmen Ort stellen und 1x täglich gut schütteln, danach mit einem Chromsthalssieb absieben und am Schluss abfiltrieren</p>		
<p>Gemeiner Tormentill <i>Potentilla erecta</i> (L.) Räuschel (Rosaceae) Wurzel</p>				<p>Frische geschnittene Blutwurzurzeln mit Alkohol in einem Gefäss aufgiessen und gut bedecken (Alk. ca. 70Vol.-%), für 1 Monat an einen warmen Ort stellen und 1x täglich gut schütteln, danach mit einem Chromsthalssieb absieben und am Schluss abfiltrieren</p>		

Gänse-Fingerkraut <i>Potentilla anserina</i> L. (Rosaceae) Kraut				Frisches geschnittenes Kraut mit Alkohol in einem Gefäß aufgiessen und gut bedecken (Alk. ca. 60Vol.-%), für 1 Monat an einen warmen Ort stellen und 1x täglich gut schütteln, danach mit einem Chromstahlsieb absieben und am Schluss abfiltrieren. Tinkturen zu gleichen Teilen mischen.		
Flachs/Lein <i>Linum usitatissimum</i> L. (Linaceae) Samen	Reis-Hafer-Leinsamenbrei	Durchfall	Kalb	1/2 Reis, 1/2 Haferflocken und 1/4 Leinsamen zusammengeben und kaltes Wasser beifügen, aufkochen, für ca. 20-30 Minuten weiterköcheln lassen bis die Masse schön beriiig ist, danach mixen	2x täglich 0.5-1.5L Brei mit Nuggiflasche verabreichen	3-7 Tage
Saat-Hafer <i>Avena sativa</i> L. (Poaceae) Samen						
Reis <i>Oryza sativa</i> L. (Poaceae) Samen						
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillen-Eichenrinden-Tee	Durchfall	Kalb	Ca. 6g getrocknete Kamillenblüten mit 4L hiessem Wasser überbrühen, 10-15 Minuten ziehen lassen, danach absieben. Ca. 22.8g Eichenrinde in 4L kaltes Wasser geben, für 3 Minuten aufkochen und weitere 15 Minuten ziehen lassen, absieben. 1/3 Eichenrindentee mit 2/3 Kamillentee mischen	3x täglich ca. 1.5L einschütten	3-4 Tage
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. (Fagaceae) Rinde						
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee mit Eichenrindenpulver	Durchfall	Kalb	Ca. 2.75g Kamillenblüten und 1 EL Eichenrindenpulver (ca. 2.8g) in ein Yoghurtbecher geben und 1dl Wasser zugeben, mit einem Stäbchen rühren	2x täglich ganze Menge mit der Nuggiflasche eingeben	1-2 Tage
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. (Fagaceae) Rinde						

Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Eichenrindenpulver mit Zusätzen	Durchfall	Schwein	Etwas Eichenrindenpulver, etwas Walderde, etwas dunkel geröstetes Mehl und ca. 1EL gedörnte Kamillenblüten mischen	1x täglich für 2-3 Tage Mischung in Trog geben	2-3 Tage
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. (Fagaceae) Rinde						
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee mit Tornetillwurzelpulver	Durchfall	Kalb	1 Beutel (ca. 2g) mit 1L heissem Wasser übergiesen, 15 Minuten ziehen lassen. Ca. 22g Pulver mit 2- 2.5dl Kamillentee mischen	2-3x täglich ca. 2-2.5dl Flüssigkeit einschütten	1-2 Tage
Gemeiner Tornetill <i>Potentilla erecta</i> (L.) Räuschel (Rosaceae) Wurzel						

Parasiten

Pflanze botanischer Name (Pflanzenfamilie) verwendeter Pflanzenanteil	Rezeptname	Anwendungsgebiet	Tierart	Herstellung	Verabreichung	TD
Gemeiner Wacholder <i>Juniperus communis</i> L. (Cupressaceae) Kraut	Wacholderkraut mit Beeren	Wurmprophylaxe, zögert das Entwurmen etwas hinaus	Ziege	Wacholder in einem Stoffsack trocknen draussen oder neben dem Ofen.	ca. 15g Wacholderkraut unter das Futter mischen	1
Wurmfarn <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) SCHOTT (Aspidiaceae) Kraut	Farn	Wurmbehandlung	Huhn		Für ca. 7 Tage Farnkraut zur Verfügung stellen	7

Wurmfarn <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) SCHOTT (Aspidiaceae) Blätter	Farnblätter	Blutmilben	Huhn		Frische Farnblätter im Stall aufhängen, zusätzlich ins Legenest unter Stroh legen, alle 14 Tage erneuern	14
Walnussbaum <i>Juglans regia</i> L. (Juglandaceae) Blätter	Nussbaumspray	Fellparasiten	Ziege	2 Handvoll Nussbaumblätter (ca. 2.6g) mit einem Liter Wasser aufkochen, über Nacht ziehen lassen mit dem Deckel auf der Pfanne, absieben. Zu 9 Teilen Sud einen Teil Essig beifügen, zusätzlich je 20 Tropfen Lavendelöl, Anisöl und Teebaumöl begeben	1x täglich mit einer Sprayflasche auf Fell auftragen und einbürsten	5
Hausmittel						
	Schmierseifenwasser	Läuse	Rind	2 gehäufte EL Schmierseife in 1L heisses Wasser geben und in eine Sprühflasche abfüllen.	Tiere 1x täglich mit der Schmierseifenlösung einsprühen	
	Rapsöl	Läuse	Rind		Rapsöl auf ein Baumwolltuch geben und Tiere damit 1x täglich einreiben	
	Umgebungsbehandlung bei Blutmilben	Blutmilben	Huhn	3dl heisses Wasser , 1EL Soda, 1dl Essig und 3dl flüssige Schmierseife mischen, heiss anwenden zur Reinigung; 30g Kernseife in 0.5L heissem Wasser auflösen, 1L Petrol dazugeben und mit heissem Wasser auf 10L ergänzen, heiss anwenden.	zuerst Stall reinigen mit Soda-Essig-Schmierseifen-Mischung, anschliessend Stall desinfizieren mit Petrolseifenlösung, 1x pro Woche	60

Verletzungen des Muskelskelettsystems (inklusive Blutergüsse und Abszesse)

Pflanze botanischer Name (Pflanzenfamilie) verwendeter Pflanzenanteil	Rezeptname	Anwendungsgebiet	Tierart	Herstellung	Verabreichung	TD
Arnika <i>Arnica montana</i> L. (Asteraceae) Blüte	Arnikaschnaps	geschwollene Haxen	Rind	1L-Flasche zu 1/3 mit Arnikablüten (10-15 Blüten) füllen und mit Bätzi (Obstbrandwein) auf 1L auffüllen. 1 halbes Jahr ziehen lassen, gelegentlich schütteln. Blüten müssen nicht abgeseibt werden.	2x täglich Haxen mit Arnikaschnaps einreiben	2
Arnika <i>Arnica montana</i> L. (Asteraceae) Kraut	Arnikatinktur	Gelenksbeschwerden, Verstauchungen	Rind	1L-Einmachglas zur Hälfte locker mit Arnikakraut füllen und auffüllen mit Bätzi (Obstbrandwein). 3 Wochen an der Sonne ziehen lassen und jeden Tag schütteln. Durch einen Kaffeefilter absieben und abfüllen.	2x täglich betroffene Stelle mit Arnikatinktur einreiben	2
Arnika <i>Arnica montana</i> L. (Asteraceae) Blüte	Arnikatinktur	Verstauchungen, Prellungen	Rind	1L-Flasche zu 1/3 mit Arnikablüten füllen (ca. 10-15 Blüten), auffüllen auf 1L mit Bätzi (Obstbrandwein). 14 Tage an der Sonne ziehen lassen, zwischendurch schütteln. Danach durch ein Tuch oder Sieb absieben und abfüllen.	2x täglich betroffene Stelle mit der Tinktur einreiben	2
Arnika <i>Arnica montana</i> L. (Asteraceae) Blüte	Arnikatinktur	Gelenksbeschwerden, Verstauchung	Rind	5 frische Arnikablüten (ca. 6g) in 1L Bätzi (Obstbrandwein) geben. 3-4 Wochen ziehen lassen, Blüten müssen nicht abgeseibt werden.	betroffene Stelle mind. 2x täglich mit Arnikatinktur einreiben	2
Echte Wallwurz, Beinwell <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae) Wurzel	Beinwelltinktur	Knochen- und Bänderverletzungen	Lama	Beinwellwurzeln nach dem Aufragen waschen und mit einer Bürste säubern und dann fein schneiden. 1.5-L Einmachglas locker 1/3 mit geschnittenen Wurzelstücken füllen und mit Bätzi (Obstbrandwein) auffüllen. 4 Wochen an der Sonne ziehen lassen, einmal täglich schütteln. Durch ein Sieb absieben und in dunkle Flaschen abfüllen.	1x täglich die betroffenen Stelle mit Beinwelltinktur einreiben	1

Echte Wallwurz, Beinwell <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae) Wurzel	Beinwellwickel	Verstauchungen	Rind	1 Beinwelltrieb pro Anwendung (ca. 40cm lang), fein hacken.	gehackter Beinwell in eine Gaze geben und diese auf betroffene Stelle legen, mit einer Binde befestigen	12
Stumpfblärtiger Ampfer, Blacke <i>Rumex obtusifolius</i> L. (Polygonaceae) Blätter	Blackensalbe	Geschwulst, Schwellungen	Lama	1.5L-Einmachglas locker füllen mit geschnittenen Blackenblättern und auffüllen mit Olivenöl. 4 Wochen an der Sonne ziehen lassen, jeden Tag schütteln. Durch ein Mehlsieb absieben. 500ml Blackenöl und 56g Bienenwachs über dem Wasserbad erwärmen, mischen und rühren bis handwarm. Dann 32 Tropfen Propolistinktur und 32 Tropfen ätherisches Öl dazugeben, in Töpfchen abfüllen und über Nacht abkühlen lassen, danach verschliessen.	1x täglich betroffene Stelle mit Blackensalbe einreiben	1
Wirz (Wirsing) <i>Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda</i> L (Brassicaceae) Blätter	Chölisalbe	Gelenksbeschwerden, Gelenksentzündungen	Rind	1kg Schweinefett in einer Pfanne erhitzen, 2-3 Wirzkohlköpfe (ca. 2500kg) fein schneiden und nach Auflösen des Fettes dazugeben. Herdplatte abstellen und 1 Stunde ziehen lassen, zwischendurch rühren. Nach 1 Stunde Kohl absieben. Zum Schweinefettauszug 5dl Olivenöl geben und gut rühren, dann in Gläser abfüllen.	Salbe 2-3x täglich deckend auf die betroffene Stelle auftragen	2
Wirz (Wirsing) <i>Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda</i> L (Brassicaceae) Blätter	Chöliwickel	Gelenksbeschwerden	Rind	Aussenblätter verwenden, Wirzblätter ein wenig mit dem Wallholz quetschen.	Chöliblat auf Schmerzstelle legen und fixieren mit einer Binde, 1x täglich wechseln	1
Wirz (Wirsing) <i>Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda</i> L (Brassicaceae) Blätter	Chöliwickel	Gelenksbeschwerden	Rind	2 Wirzblätter mit dem Wallholz oder einem Hammer etwas zerdrücken.	Gelenk mit 2 gequetschten Wirzblättern umwickeln und festbinden mit einer Gazebinde, alle 2h wechseln	5
Wirz (Wirsing) <i>Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda</i> L (Brassicaceae) Blätter	Chöliwickel	Gelenksentzündung, Haxen	Kuh	Blätter vor Verwedung quetschen mit Wallholz.	2 Blätter mit Klebeband an der Haxe befestigen, 2x täglich wechseln	2

Echtes Johanniskraut <i>Hypericum perforatum</i> L. (Hypericaceae) Blüte	Johannisöl	Verstauchungen	Rind	1.5L-Flasche zu ca. 1/5 mit Johannisblüten füllen und mit Olivenöl auf 1.5L auffüllen. 14 Tage an der Sonne ziehen lassen und jeden Tag schütteln. Danach durch ein Tuch oder Sieb absieben und in Flaschen abfüllen.	2x täglich betroffene Stelle sanft mit dem Johannisöl massieren	2
Echtes Johanniskraut <i>Hypericum perforatum</i> L. (Hypericaceae) Kraut	Johannisöl	Nervenverletzungen, Rücken oder Gelenke	Rind	Braunglasgefäß (2L) füllen mit frischem Johanniskraut, gut stopfen, dann auffüllen mit Olivenöl. 14 Tage an der Sonne stehen lassen und anschliessend durch ein Tuch absieben, in Fläschchen abfüllen.	2x täglich Rücken oder Gelenke mit Johannisöl einreiben	2
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blütenblätter	Ringelblumensalbe	Geschwollene Haxen	Kuh	15g Strahlenblüten in 150g Olivenöl und 15g Bienenwachs im Wasserbad langsam erwärmen und eine Stunde bei mittlerer Hitze ziehen lassen. Danach durch ein Sieb absieben und etwa 8-10 Notfalltropfen dazugeben. In kleine Döschen giessen und vor dem verschliessen gut abkühlen lassen.	2x täglich geschwollene Haxe mit Ringelblumensalbe einreiben	2
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blüte	Ringelblumentinktur	Geschwollene Gelenke	Rind	1L-Flasche zu 3/4 mit Ringelblumenblüten füllen (ca. 90g) und mit Bätzi (Obstbrandwein) auf 1L auffüllen. 1 Monat an der Sonne ziehen lassen, zwischendurch schütteln, mit einem Kaffeefilter absieben.	2x täglich die Gelenke mit Ringelblumentinktur einreiben	2
Teufelskralle <i>Harpagophytum procumbens</i> DC. ex Meisn. (Pedaliaceae) Wurzel	Teufelskralle	Bänderbeschwerden, Kollateralband	Lama		1EL getrocknete Wurzelstücke übers Futter geben einmal täglich	1
Echte Wallwurz, Beinwell <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae)	Wallwursalbe	geschwollene Gelenke	Rind	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt.	3-4x täglich Gelenk mit Wallwurzsalbe massieren	3

Echte Wallwurz, Beinwell <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae) Wurzel	Wallwurzbrei	Verstauchungen, Schwellung	Rind	Mixerglas (1L) halb füllen mit geschnittenen Wurzelstücken und auffüllen auf 1L mit Schnaps (Industrieschnaps), mixen und Brei in Gläser abfüllen.	Wallwurzbrei auf eine Gaze streichen (ca. 1cm dick) und auf die betroffene Stelle legen, mit einer Binde befestigen	1
Echte Wallwurz, Beinwell <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae) Wurzel	Wallwurzinktur	Prellungen, Verstauchungen	Rind	Wallwurzurzeln nach Ausgraben etwas an die Sonne legen, damit die Erde trocknet und weggewischt werden kann. 1L-Einmachglas locker mit fein geschnittenen Wurzelstücken füllen und mit Bätzi (Obstbrandwein) auffüllen. 3 Wochen an der Sonne ziehen lassen, jeden Tag schütteln und durch Kaffeefilter absieben.	2x täglich betroffene Stelle mit Wallwurzinktur einreiben	2
Knoblauch <i>Allium sativum</i> L. (Amaryllidaceae) Zwiebel	Knoblauch mit Zitronensaft	Entwurmungsmittel	Schaf	3 Knoblauchzwiebeln ein wenig auseinander brechen und zusammen mit 0.5L Zitronensaft in ein Mixerglas geben und mixen.	mit der Flasche ca. 1dl der Knoblauch-Zitronen-Mischung eingeben, einmalige Anwendung	1
Gewöhnliche Osterluzei <i>Aristolochia clematitis</i> L. (Aristolochiaceae) Kraut	Osterluzeitee	Kokzidiose	Kaninchen	Osterluzei an einem gut belüfteten Ort am Schatten trocknen. 2 Hand voll Osterluzeikraut mit 3L heissem Wasser übergießen und ca. 1h ziehen lassen, nicht absieben.	mit einer Spritze ca. 2ml Osterluzeitee eingeben, einmalige Anwendung	1
Karotte <i>Daucus carota</i> L. (Apiaceae) Knolle	Rüebli	Wurmprophylaxe	Ziege	Rüebli vor dem verwenden mit dem Gartenhäcksler zerkleinern.	ca. 150g zerkleinerte Karotten einmal täglich übers Futter geben	1
Arnika <i>Arnica montana</i> L. (Asteraceae) Blüte	Arnikatinktur	Verstauchung	Ziege	Arnikablüten (ca. 31g) in ein Glas geben und mit ca. 3 dl Schnaps (38Vol.-%) schön bedecken, für ca. 3 Wochen an einen warmen Ort stellen und 1-2x pro Tag schütteln, danach durch einen Damenstrumpf absieben	2x täglich etwas Tinktur auf betroffene Stelle auftragen	
Arnika <i>Arnica montana</i> L. (Asteraceae) Blüte	Arnikatinktur	Stumpfe Verletzung	Ziege	Arnikablüten (ca. 31g) in ein Glas geben und mit ca. 3 dl Schnaps (38Vol.-%) schön bedecken, für ca. 3 Wochen an einen warmen Ort stellen und 1-2x pro Tag schütteln, danach durch einen Damenstrumpf absieben	ca. 1ml Tinktur (1:10 mit Wasser verdünnt) mit einer Spritze eingeben	

Arnika <i>Arnica montana</i> L. (Asteraceae) Blüte	Arnikatinktur	Prellungen	Ziege	Arnikablüten (ca. 31g) in ein Glas geben und mit ca. 3 dl Schnaps (38Vol.-%) schön bedecken, für ca. 3 Wochen an einen warmen Ort stellen und 1-2x pro Tag schütteln, danach durch einen Damenstrumpf absieben	1x täglich ein mit Tinktur getränktes Tuch (1:10 mit Wasser verdünnt) auf betroffene Stelle halten und einbinden	1-7 Tage
Beinwell, Wallwurz <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae) Wurzel	Beinwellsalbe	Bluterguss	Schwein	Frische Beinwellwurzeln mit Alkohol in einem Gefäß aufgiessen und gut bedecken (Alk. Ca. 70Vol.-%), für 1 Monat an einen warmen Ort stellen und 1x täglich gut schütteln, danach mit einem Chromsthalieb absieben und am Schluss abfiltrieren. Zu ca. 1dl Ölauszug ca. 10g Wollfett und ca. 12g Bienenwachs hinzufügen und unter Rühren erwärmen bis Wachs geschmolzen ist (bei 65°C), Pfanne wegnehmen und auf 45°C abkühlen lassen, ca. 10ml Tinktur zufügen (auf 45°C erwärmt) und mit Mixer gut mischen	2x täglich eine gute Schicht Salbe auftragen und mit Cellophan verbinden	
Beinwell, Wallwurz <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae) Wurzel	Beinwellsalbe	Bluterguss	Schwein	Frische Beinwellwurzeln gut säubern, Wurzel mit Öl (kaltgepresst) bedecken und bei max. 70°C ausziehen, gut rühren, danach absieben. Zu ca. 1dl Ölauszug ca. 10g Wollfett und ca. 12g Bienenwachs hinzufügen und unter Rühren erwärmen bis Wachs geschmolzen ist (bei 65°C), Pfanne wegnehmen und auf 45°C abkühlen lassen, ca. 10ml Tinktur zufügen (auf 45°C erwärmt) und mit Mixer gut mischen	2x täglich eine gute Schicht Salbe auftragen und mit Cellophan verbinden	
Beinwell, Wallwurz <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae) Wurzel	Beinwellsalbe	Verstauchungen	Schwein	Frische Beinwellwurzeln mit Alkohol in einem Gefäß aufgiessen und gut bedecken (Alk. Ca. 70Vol.-%), für 1 Monat an einen warmen Ort stellen und 1x täglich gut schütteln, danach mit einem Chromsthalieb absieben und am Schluss abfiltrieren. Zu ca. 1dl Ölauszug ca. 10g Wollfett und ca. 12g Bienenwachs hinzufügen und unter Rühren erwärmen bis Wachs geschmolzen ist (bei 65°C), Pfanne wegnehmen und auf 45°C abkühlen lassen, ca. 10ml Tinktur zufügen (auf 45°C erwärmt) und mit Mixer gut mischen	2x täglich eine gute Schicht Salbe auftragen und mit Cellophan verbinden	

Beinwell, Wallwurz <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae) Wurzel	Beinwellsalbe	Verstauchungen	Schwein	Frische Beinwellwurzeln gut säubern, Wurzel mit Öl (kaltgepresst) bedecken und bei max. 70°C ausziehen, gut rühren, danach absieben. Zu ca. 1dl Ölauszug ca. 10g Wollfett und ca. 12g Bienenwachs hinzufügen und unter Rühren erwärmen bis Wachs geschmolzen ist (bei 65°C), Pfanne wegnehmen und auf 45°C abkühlen lassen, ca. 10ml Tinktur zufügen (auf 45°C erwärmt) und mit Mixer gut mischen	2x täglich eine gute Schicht Salbe auftragen und mit Cellophan verbinden	
Beinwell, Wallwurz <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae) Wurzel	Beinwellsalbe	Verstauchungen	Rind	Ca. 100g frische Wurzel putzen, in Scheiben schneiden und mit Olivenöl gerade bedecken (ca. 2-3dl). 1-2 Wochen ruhen lassen und dabei einmal pro Tag auf ca. 40°C erwärmen. Danach abfiltrieren. Zu 100g Beinwellöl werden 15-20g Bienenwachs gegeben, auf ca. 40°C erwärmen damit Wachsflocken schmelzen und sich mit dem Öl vermischen, danach abfiltrieren und in Gefäße füllen (lichtgeschützte). Abkühlen lassen	1x täglich 6-7g Salbe auftragen	1-6 Tage
Beinwell, Wallwurz <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae) Wurzel	Wallwurzsalbe	Zerrung	Rind	Frische Wurzel (ca. 12g) in 2L kaltes Wasser geben, kurz aufkochen und 24h stehen lassen, danach absieben. Zum Wasserauszug ca. 1dl Kirsche zugeben und in ein lichtgeschütztes Glas füllen, für 5-6 Tage an die Sonne stellen. Danach zu ca. 1kg geschmolzenes Melkfett 1/4 Flüssigkeit zufügen und mit dem Schwingbesen gut emulgieren. Abfüllen	1-2x täglich etwas Salbe einmassieren	
Beinwell, Wallwurz <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae) Wurzel	Wallwurzsalbe	Geschwollene Gelenke	Rind	Frische Wurzel (ca. 12g) in 2L kaltes Wasser geben, kurz aufkochen und 24h stehen lassen, danach absieben. Zum Wasserauszug ca. 1dl Kirsche zugeben und in ein lichtgeschütztes Glas füllen, für 5-6 Tage an die Sonne stellen. Danach zu ca. 1kg geschmolzenes Melkfett 1/4 Flüssigkeit zufügen und mit dem Schwingbesen gut emulgieren. Abfüllen	1-2x täglich etwas Salbe mit der Hand einmassieren	14

Beinwell, Wallwurz <i>Symphytum officinale</i> L. (Boraginaceae) Wurzel	Dr. Andres Wallwurzsalbe	Gegen heisses Gelenk	Rind	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt	2x täglich einreiben und Fell vorher abrasieren	5
Echtes Johanniskraut <i>Hypericum perforatum</i> L. (Hypericaceae) Blüte	Johanniskrautöl	Stumpfe Verletzung am Bewegungsapparat	Ziege	Frische Blüten in ein Glas füllen und mit Olivenöl gut bedecken, für 3 Wochen an einen warmen Ort stellen bis der Auszug schön rot ist, 1x pro Tag schütteln. Blüten absieben	2x täglich mit der Hand etwas Öl auf betroffene Stelle einreiben	
Hanf <i>Cannabis sativa</i> L. (Cannabaceae) Kraut	Hanfsalbe	Quetschungen	Rind	1 Teil Hanf, 2 Teile Vaseline. Vaseline erwärmen, Blüten und Blätter in Pfanne geben, diese gut zudecken und erwärmen bis es schäumt. Mit einem Sieb die Blüten abschöpfen. Vaseline durch ein Tuch absieben so dass die Blätter zurück bleiben. Die abgeschöpften Blüten mit Vaselinöl bedecken, auf 80-90 °C erwärmen und den Ölauszug durch ein Tuch absieben. Ca. 1/3 Ölauszug und 2/3 Vaselinenauszug verwenden.	2x täglich Salbe auf betroffene Stelle auftragen	
Meerrettich <i>Armoracia</i> <i>rusticana</i> P. Gaerten. & al. (Brassicaceae) Wurzel	Meerrettich	Abszess	Rind	Frischer Meerrettich (ca. 20g) fein raffeln, Natureyoghurt beifügen (ca. 300g) und zu einem Brei vermischen	2x täglich den Brei dick auf den Abszess auftragen	14
Stumpfbblätteriger Ampfer, Blacke <i>Rumex</i> <i>obtusifolius</i> L. (Polygonaceae) Blätter	Blackentinktur	Schmerzen	Rind	Frische Blackenblätter und Wurzel (ca. 14g) in lichtgeschützte Flasche geben und mit ca. 3dl Alkohol (45 Vol.-%) gut bedecken. Für 3 Wochen an einen sonnigen Platz stellen und 2x pro Tag Ölauszug schütteln, danach absieben und umfüllen	2x täglich etwas Blackentinktur eingeben	7-14 Tage

Stumpflättriger Ampfer, Blacke <i>Rumex obtusifolius</i> L. (Polygonaceae) Blätter	Blackentinktur	Bluterguss	Rind	Frische Blackenblätter und Wurzel (ca. 14g) in lichtgeschützte Flasche geben und mit ca. 3dl Alkohol (45 Vol.-%) gut bedecken. Für 3 Wochen an einen sonnigen Platz stellen und 2x pro Tag Ölauszug schütteln, danach absieben und umfüllen	2x täglich mit einem Lappen etwas Blackentinktur auf betroffene Stelle auftragen	
Hausmittel						
	Schnaps	Wenn Kühe schlecht laufen	Rind		2x täglich Beine einreiben	
	Ichthyosalbe 40%	Gelenkentzündung	Rind	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt	Mehrmals täglich eine 0.5cm dicke Schicht auftragen bis Besserung eintritt, zusätzlich Viehsalz einreiben	
	Schnaps	nach dem Kalben zum Stärken der Bänder am Kreuz	Rind		Einmalig ca. 1.5-2dl Schnaps mit Stroh am Kreuz einmassieren	1
	Olivenöl	Rückenverspannungen	Rind	kaltgepresstes, griechisches Olivenöl	1-2x täglich etwas Olivenöl über Rücken giessen und gut einmassieren und wiederholen bis Besserung eintritt	
	Schnaps	Verstauchung am Knie	Rind	Obstbranntwein "Bäzi"	Ca. 2-3dl Schnaps einmassieren und 2-3 Tage wiederholen	2-3 Tage
	Schmierseife	Schwellungen	Rind		Schwellung 1x täglich mit einer Hand voll Schmierseife einreiben	10
	Lehm-Essig-Mischung	geschwollene Gelenke	Rind	1 Hand voll Anliker Lehm mit so viel Essig mischen, dass eine gut streichfähige Paste entsteht.	betroffene Stelle 1x täglich mit der Lehm-Essig-Mischung einreiben	14
	Quarkwickel	Gelenksbeschwerden, Verstauchungen oder Entzündungen	Rind		Quark rel. dick aufs Gelenk streichen und mit Tüchern einbinden, 15-20min einwirken lassen	3

	Lehm-Essig-Salz-Mischung	Verstauchungen	Ziegenlamm	Ca. 50g Lehm mit so viel Essig mischen, dass eine streichfähige Paste entsteht, dann eine Prise Salz dazugeben, immer frisch verwenden.	Paste 2x täglich deckend auf die betroffene Stelle auftragen	1
--	---------------------------------	----------------	------------	---	--	---

Vorbeugung und allgemeine Stärkung

Pflanze botanischer Name (Pflanzenfamilie) verwendeter Pflanzenanteil	Rezeptname	Anwendungsgebiet	Tierart	Herstellung	Verabreichung	TD
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Kraut	Kamillentee	Nach Kalben zur allgemeinen Unterstützung	Rind	Kaltes Wasser in Pfanne füllen (ca. 10L), Kamille (ca. 25g) ins kalte Wasser geben, aufkochen und max. 15 Minuten auskochen lassen, dann absieben	Menge nicht klar dokumentiert	4
Zwiebel <i>Allium cepa</i> L. (Amaryllidaceae) Zwiebel	Zwiebel	Appetitlosigkeit nach dem Kalben	Rind	3-4 Zwiebeln hacken und dazu 0.5L Wasser und 0.5L Essig mischen	Einmalig 2x täglich ca. 0.5L einschütten	1
Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i> L. (Asteraceae) Kraut	Schafgarbentee	Magenverstimmung	Rind		Ca. 4.5L Tee 2x täglich eingeben, 2-3 Tage wiederholen	2
Ginseng <i>Panax ginseng</i> C.A. Meyer (Araliaceae) Wurzel	Ginseng	Einstellung junger Kücken	Huhn		1x täglich ca. 3ml Ginsengabsud ins Tränkwasser geben, Anwendung in den ersten 8 Tagen	8
Ginseng <i>Panax ginseng</i> C.A. Meyer (Araliaceae) Wurzel	Ginseng	Zur allgemeinen Stärkung	Bienen		Den Absud dem Zuckerwasser beimischen im Herbst (Menge nicht klar dokumentiert)	

Ginseng <i>Panax ginseng</i> C.A. Meyer (Araliaceae) Wurzel	Ginseng	Antränken von zugekauften Tränkekälbern	Rind		1x täglich einen halben Kaffeelöffel Ginsengpulver jeweils nach dem Tränken eingeben für die ersten 8 Tage	8
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Blätter	Brennesselkraut	Eisenmangelprophylaxe	Rind		Brennesselkraut zur freien Verfügung hinstellen, ganzjährig	365
Kaffeepflanze <i>Coffea</i> <i>arabica</i> L. (Rubiaceae) Samen	Kafi-Schnaps	Nach einer Schweregeburt	Rind	Starker Kaffee herstellen, ein Schluck kaltes Wasser beifügen, zusätzlich etwas Träsch (70Vol.-%) beigeben (ca. 2dl pro Liter Kaffee)	Einmalige Gabe des ganzen Ansatzes	1
Kaffeepflanze <i>Coffea</i> <i>arabica</i> L. (Rubiaceae) Samen	Kafi-Schnaps	Nach dem Kalben	Rind	2 EL Kaffee (ca. 30g) mit 1L heissem Wasser übergiesen, danach 100g Zucker und 1dl Schnaps (70Vol.-%) beifügen	Einmalig ganzer Ansatz mit dem Einschüttfass eingeben	1
Kaffeepflanze <i>Coffea</i> <i>arabica</i> L. (Rubiaceae) Samen	Kafi-Schnaps	Zur Kräftigung nach dem Kalben	Rind	3 El gehäufter Kaffee (ca. 21g) mit 2L heissem Wasser übergiesen, 2dl Träsch (70Vol.-%) zufügen	Einmalige Eingabe von ca. 2L Flüssigkeit	1
Meerrettich <i>Armoracia</i> <i>rusticana</i> P. Gaerten. & al. (Brassicaceae) Wurzel	Meerrettich	Abwehrkräfte stärken	Rind		2x täglich für die vier Wintermonate ca. 225g getrockneter Meerrettich ins Futter geben	120
Zitrone <i>Citrus x limon</i> (L.) Burm.f. (Rutaceae) Früchte	Zitronenessig	Energiedrink für mudernde Kühe	Rind	0.5L Essig, 0.5L warmes Wasser, ca. 1dl Zitronensaft und 1 handvoll Dextrose mischen	Einmalige Gabe des ganzen Ansatzes	1
Zitrone <i>Citrus x limon</i> (L.) Burm.f. (Rutaceae) Früchte	Zitronenessig	Nach dem Kalben zur Stoffwechsellanregung	Rind	0.5L Essig, 0.5L warmes Wasser, ca. 1dl Zitronensaft und 1 handvoll Dextrose mischen	Nach dem Kalben einmalig den ganzen Drink eingeben	1
Bockshornklee <i>Trigonella foenum-</i> <i>graecum</i> L. (Fabaceae) Samen	Bockshornkleesamen	appetitanregend, leberunterstützend, nach der Geburt	Kuh		2x täglich 20g Bockshornkleemehl zum Futter geben	2

Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Kraut	Brennessel	Stärkung und Reinigung	Lama	Brennesseln draussen auf einem Tuch ausbreiten und lufttrocknen.	1 grosse Hand voll Brennnesseln (ca.17g) 1x pro Woche übers Heu geben, über den Winter	14
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Kraut	Brennessel	Stärkung nach der Geburt	Lama	Brennesseln draussen auf einem Tuch ausbreiten und lufttrocknen.	2 grosse Hand voll Brennnesseln (ca.34g) 1x täglich übers Heu geben	1
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Blätter	Brennessel	Unterstützung der Fruchtbarkeit	Kuh		2x täglich 25g getrocknete Brennesselblätter zum Futter geben	2
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Kraut	Brennessel	Stärkung, Reinigung	Ziege		getrocknete Brennnesseln mit Heu mischen und 2x täglich verfüttern über den ganzen Winter	2
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Kraut	Brennessel	mudrig, allgemeines Unwohlsein, Stärkungsmittel	Ziege	Brennesselbündel an einem gut druchlüfteten Ort am Schatten aufhängen zum trocknen.	1 Hand voll Brennesselkraut (20g) morgens und abends zum Futter geben während 2-3 Tagen	2
Gemeiner Efeu <i>Hedera helix</i> L. (Araliaceae) Kraut	Efeu	Stärkung	Ziege		immer nach dem Mittag eienen grossen Busch frischen Efeu verfüttern, jedes Tier kann so viel davon fressen wie es will, über den ganzen Winter	1
Stiel-Eiche <i>Quercus robur</i> L. Fagaceae Samen	Eicheln	Stärkung	Ziege	Eicheln drinnen am Boden ausbreiten und lufttrocknen.	2x pro Tag eine Eichel verfüttern, morgens und abends	2
Hunds-Rose <i>Rosa canina</i> L. (Rosaceae) Früchte	Hagebutte	Stärkung des Immunsystems	Ziege	Hagebutte auf dem Dörrex trocknen.	morgens und abends 5g Hagebutte übers Futter geben, im Winter	2
Gemeine Hasel <i>Corylus avellana</i> L. (Betulaceae) Früchte	Haselnüsse	Stärkung, bei eher mageren Tieren	Ziege		morgens und abends 4 Haselnüsse (ca. 4g) direkt verfüttern	2
Gewöhnliche Vogelmiere <i>Stellaria media</i> (L.) Vill. (Caryophyllaceae) Kraut	Hühnerdarm	Kur zur Stärkung des Herzens	Kuh		1 halbe Hand voll frische Vogelmiere zum Futter geben 1x täglich über den Sommer	1

Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Kraut	Kamille	Stärkung der Verdauung und des Immunsystems	Ziege	Kamille an einem gut belüfteten Ort am Schatten aufhängen zum trocknen.	1 Hand voll Kamille (ca. 13g) 1x täglich zum Heu geben	1
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	nach einer Fremdkörperoperation, Infektionsprophylaxe	Kuh	Kamille an einem gut durchlüfteten Ort am Schatten trocknen. 1 Hand voll Kamillenblüten (ca. 5.5g) mit 1L heissem Wasser übergossen und 5-10min ziehen lassen, Tee lauwarm mit den Blüten verwenden.	nach Operation 1L Kamillentee mit Blüten in den Pansen geschüttet, einmalige Anwendung, durch den Tierarzt gemacht	1
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Kraut	Kamillentee mit Zucker	zur Stärkung nach kalben	Kuh	Zum trocknen Kamillensträusslein zusammenbinden und am Schatten aufgehängt. 2-4 Sträusslein (entspricht ca. 1 Hand voll Blüten) in 2L Wasser aufkochen und dann 10min ziehen lassen. Danach absieben mit einem Sieb und 500g Zucker dazugeben.	2L Tee mit Zucker mit der Flasche eingegeben, einmalige Anwendung	1
Winter-Linde <i>Tilia cordata</i> Mill. (Malvaceae) Blüten	Lindenblütentee	allgemeines Unwohlsein, nid so zwäg	Ferkel	1 Beutel Lindenblütentee (ca. 1g) mit 1L heissem Wasser übergossen und 10min ziehen lassen.	2x täglich 1L Lindenblütentee übers Futter geben	2
Löwenzahn <i>Taraxacum officinale</i> F. H. Wigg. (Asteraceae) Wurzel	Löwenzahn	Stoffwechselschwäche	Rind		morgens und abends 15g getrocknete Löwenzahnwurzel übers Futter geben	2
Oregano <i>Origanum vulgare</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Majoran	Stärkung nach der Geburt, wärmend	Ziege	Majoran an einem gut belüfteten Ort am Schatten trocknen.	1 Hand voll Majoran (ca 11g) 2x täglich zum Heu geben	2
Mariendistel <i>Silybum marianum</i> L. (Asteraceae) Früchte	Mariendistelfrüchte	nach entwurmen, leberentgiftend und stärkend	Ziege		5g zerstossene getrocknete Mariendistelfrüchte morgens und abends übers Futter geben	2

Mariendistel <i>Silybum marianum</i> L. (Asteraceae) Früchte	Mariendistelfrüchte	Entgiftungskur, Leberstärkung nach einem Magen-Darm-Infekt	Ziege		5g zerstoßene getrocknete Mariendistelfrüchte morgens und abends übers Futter geben	2
Pfeffer-Minze <i>Mentha arvensis</i> L. var piperascens (Lamiaceae) Kraut	Minze	Stärkung der Verdauung	Ziege	Minze an einem gut belüfteten Ort am Schatten trocknen.	etwa 1x die Woche 1 Hand voll Pfefferminze (10g) zum Heu geben	14
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Kraut	Ringelblumenkraut	zur Stärkung, wenn Tiere müde sind	Ziege	Ringelblumen an einem gut belüfteten Ort am Schatten trocknen.	1 Hand voll Ringelblumenkraut (ca. 12g) abends zum Heu geben	1
Sonnenblume <i>Helianthus annuus</i> L. (Asteraceae) Samen	Sonnenblumenkerne	im Fellwechsel, Vitaminzufuhr	Ziege		morgens und abends 7.5g Sonnenblumenkerne zum Futter geben	2
Weinrebe <i>Vitis vinifera</i> L. (Vitaceae) Beeren	Weinbeeren	Ketose vorbeugen bei trächtigen Weibchen	Ziege		morgens und abends 8g Weinbeeren übers Futter geben	2
Weinrebe <i>Vitis vinifera</i> L. (Vitaceae) Beeren	Weinbeeren	Stärkung	Ziege		morgens und abend ca. 4g Weinbeeren mit der Hand verfüttern	2
Weisstanne <i>Abies alba</i> Mill. (Pinaceae) Zweige	Weisstanne	Stärkung	Ziege		mehrere Weisstannenäste im Stall aufhängen, Tiere können den ganzen Winter so viel davon fressen wie sie wollen	
Weisstanne <i>Abies alba</i> Mill. (Pinaceae) Zweige	Weisstanne	Hustenprophylaxe	Ziege		am Abend ein Weisstannenast (ca. 50cm, ca. 200g) zum Futter geben, über ganzen Winter	1
Weisstanne <i>Abies alba</i> Mill. (Pinaceae) Zweige	Weisstanne	Stärkung, Verdauungsunterstützend	Ziege		am Abend ein Weisstannenast (ca. 50cm, ca. 200g) zum Futter geben, über den ganzen Winter	1
Weisstanne <i>Abies alba</i> Mill. (Pinaceae) Zweige	Weisstannenäste	Verdauung unterstützen, Vitalität steigern	Kalb		über die ganze Winterfütterung Tannenäste im Stall aufhängen; Tiere können so viel davon fressen, wie sie wollen	

Futterwicke <i>Vicia sativa</i> L. (Fabaceae) Kraut	Wicke	Stärkungskur im Sommer	Rind		eine Hand voll frische Wicke morgens und abends übers Futter geben, über 3 Monate	2
Hausmittel						
	Zuckerwasser	Nach dem Kalben	Rind	2kg Zucker mit ca. 5L lauwarmem Wasser mischen	Einmalig im Kessel zur Verfügung stellen	1
	Apfelschnaps	Gegen Schwäche nach dem Kalben	Rind		1x täglich am Kreuz oder an den Beinen einreiben	14
	Coca cola	Müdigkeit nach dem Kalben	Rind		Einmalig ca. 1.5L Cola einschütten	1
	Essig	Festliegen nach dem Kalben	Rind		Einmalig Essig aufs Kreuz der Kuh geben, gut einmassieren und Kuh zudecken	1
	Rotwein-Eier-Mischung	nach der Geburt, damit Tiere nicht ausdrücken	Kuh	1kg Zucker in 1L heissem Wasser auflösen, 1L Rotwein dazugeben, 12 Eier aufschlagen und die Mischung gut mit dem Schwingbesen schaumig rühren, immer frisch verwenden.	Mischung mit einen Kessel verabreichen, einmalige Anwendung	1

Mischungen						
Wermut <i>Artemisia absinthium</i> L. (Asteraceae) Kraut	Leberentgiftungsmischung	Stärkung des Immunsystems, wenn Tiere nicht so zwäg oder mudrig (allgemeines Unwohlsein)	Kuh	4 Teile Wermutkraut, 7 Teile Bockshornkleepulver, 2 Teile Enzianwurzel, 4 Teile Löwenzahnwurzel und 4 Teile Brennesselblätter in einem 1L-Messbecher abmessen und mischen.	2x täglich zwei Löffel der Mischung (ca. 20-30g) übers Futter geben	14
Löwenzahn <i>Taraxacum officinale</i> F. H. Wigg. (Asteraceae) Wurzel						
Bockshornklee <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. (Fabaceae) Samen						
Gelber Enzian <i>Gentiana lutea</i> L. (Gentianaceae) Wurzel						
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Wurzel						
Wermut <i>Artemisia absinthium</i> L. (Asteraceae) Kraut	Leberentgiftungsmischung	Leberentgiftung nach Behandlung mit Antibiotika	Kuh	4 Teile Wermutkraut, 7 Teile Bockshornkleepulver, 2 Teile Enzianwurzel, 4 Teile Löwenzahnwurzel und 4 Teile Brennesselblätter in einem 1L-Messbecher abmessen und mischen.	2x täglich zwei Löffel der Mischung (ca. 20-30g) übers Futter geben	14
Löwenzahn <i>Taraxacum officinale</i> F. H. Wigg. (Asteraceae) Wurzel						
Bockshornklee <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. (Fabaceae) Samen						
Gelber Enzian <i>Gentiana lutea</i> L. (Gentianaceae) Wurzel						
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Wurzel						

Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Thymian-Kamillentee	mudrig, nicht so zwäg, allgemeines Unwohlsein	Kalb	1 Beutel Kamille (1.5g) und 1KL Thymian (2.2g) mit heissem Wasser übergiessen und ca. 30min ziehen lassen, Thymian nicht absieben, lauwarm verwenden.	1-1.5L Thymian-Kamillentee 2x täglich zwischen den Tränkezeiten mit der Nuggiflasche verabreichen	1
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut						

Varia

Pflanze botanischer Name (Pflanzenfamilie) verwendeter Pflanzenanteil	Rezeptname	Anwendungsgebiet	Tierart	Herstellung	Verabreichung	TD
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae) Blüte	Kamillentee	Appetitanregung nach dem Fährten	Schwein	Ca. 6g getrocknete Kamillenblüten mit 4L hiessem Wasser überbrühen, 10-15 Minuten ziehen lassen, absieben	2x täglich ca. 1L Tee im Kessel verabreichen	3-4 Tage
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymian	Grippe	Rind		2x täglich ca. 20g getrocknetes Thymiankraut ins Futter mischen	7-10 Tage
Echter Thymian <i>Thymus vulgaris</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Thymian	Grippe	Rind		2x täglich ca. 20g getrocknetes Thymiankraut ins Futter mischen	7-10 Tage
Gemeiner Tormentill <i>Potentilla erecta</i> (L.) Räuschel (Rosaceae) Wurzel	Blutwurz tinktur	Klauenverletzungen	Rind	FrISCHE geschnittene Blutwurz wurzeln mit Alkohol in einem Gefäss aufgiessen und gut bedecken (Alk. ca. 70Vol.-%), für 1 Monat an einen warmen Ort stellen. 1x täglich gut schütteln, danach mit einem Chromsthal sieb absieben und am Schluss abfiltrieren	1x täglich etwas Tinktur (50:50 in Wasser verdünnt) auf betroffene Stelle aufsprühen	

Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Blätter	Brennesselblätter	Milchtreibung	Rind		2x täglich je 10g getrocknete Bärentraubenblätter ins Kraftfutter mischen	2-10 Tage
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Blätter	Brennesseltee	Zur Blutbildung	Rind	Ca. 50g getrocknete Brennesselblätter mit 5L heissem Wasser überbrühen, zudecken und 30 Minuten ziehen lassen, absieben	1x täglich ca. 2dl Tee in Milch geben	5-10 Tage
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Blätter	Brennesseltee	Prophylaxe gegen Infektionen	Rind	Ca. 50g getrocknete Brennesselblätter mit 5L heissem Wasser überbrühen, zudecken und 30 Minuten ziehen lassen, absieben	1x täglich ca. 2dl Tee in Milch geben	5-10 Tage
Hanf <i>Cannabis sativa</i> L. (Cannabaceae) Kraut	Hanfsalbe	Milchstau	Rind	1 Teil Hanf, 2 Teile Vaseline. Vaseline erwärmen, Blüten und Blätter in Pfanne geben, diese gut zudecken und erwärmen bis es schäumt. Mit einem Sieb die Blüten abschöpfen. Vaseline durch ein Tuch absieben so dass die Blätter zurück bleiben. Die abgeschöpften Blüten mit Vaselinöl bedecken, auf 80-90 °C erwärmen und den Ölauszug durch ein Tuch absieben. Ca. 1/3 Ölauszug und 2/3 Vaselinenauszug verwenden.	2x täglich Salbe aufs Euter auftragen	
Hanf <i>Cannabis sativa</i> L. (Cannabaceae) Kraut	Hanfsalbe	Gegen Euterverhärtung nach dem Kalben	Rind	1 Teil Hanf, 2 Teile Vaseline. Vaseline erwärmen, Blüten und Blätter in Pfanne geben, diese gut zudecken und erwärmen bis es schäumt. Mit einem Sieb die Blüten abschöpfen. Vaseline durch ein Tuch absieben so dass die Blätter zurück bleiben. Die abgeschöpften Blüten mit Vaselinöl bedecken, auf 80-90 °C erwärmen und den Ölauszug durch ein Tuch absieben. Ca. 1/3 Ölauszug und 2/3 Vaselinenauszug verwenden.	2x täglich Salbe ins Euter einmassieren	
Kaffeepflanze <i>Coffea arabica</i> L. (Rubiaceae) Samen	Kafi-Schnaps	Appetitlosigkeit	Rind	3-4 EL Kaffee (ca. 21g) mit ca. 7dl heissem Wasser aufkochen, 3dl Schnaps (40Vol.-%) zufügen	Einmalig ganzer Ansatz lauwarm einschütten	1
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Blätter	Brennessel	Euterödem	Kuh		morgens und abends 1 Hand voll getrocknete Brennesselblätter (ca. 9g) direkt ins Maul geben	2

Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Blätter	Brennessel	schlechte Milchleistung, Milchleistung verbessern	Kuh		1 EL getrocknete Brennesselblätter (4.5g) morgens und abends übers Gläck (Salzlecke) geben	2
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Blätter	Brennessel	Euterverhärtung, Ödem	Kuh		1 EL getrocknete Brennesselblätter (4.5g) morgens und abends übers Gläck (Salzlecke) geben	2
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Kraut	Brennesselheu	Milchfluss anregen	Ziege	Brennesseln zusammen mit Heu trocknen.	ca. 20g Brennesseln pro Tier 1x täglich zum Futter geben	1
Wirz (Wirsing) <i>Brassica oleracea</i> convar. <i>capitata</i> var. <i>sabauda</i> L. (Brassicaceae) Blätter	Chöliwickel	Fieber	Kalb	Aussenblätter verwenden, Wirzblätter ein wenig mit dem Wallholz quetschen.	1 Chöliblatt mit einer Binde am Bein fixieren, an allen vier Beinen	1
Gebirgs-Frauenfarn <i>Athyrium distentifolium</i> Opiz (Athyriaceae) Zweige	Farnäste	gegen Fliegen	Rind		mehrere Farnäste im Stall aufhängen, 2x in der Woche wechseln, im Frühling	
Gemeiner Frauenmantel <i>Alchemilla vulgaris</i> L. (Rosaceae) Kraut	Frauenmänteli	Milchproduktion anregen	Ziege		ca. 1g getrocknetes Frauenmänteli morgens und abends übers Futter geben	2

Gundelrebe <i>Glechoma hederacea</i> L. (Lamiaceae) Blätter	Gundelrebe	Abszess am Euter	Kuh	Ein Konfiglas füllen mit Gundelrebenblätter und dieses ca. 30cm tief vergraben und 1 Monat im Boden ruhen lassen. Im Glas entsteht Kondenswasser, dadurch entsteht ein schwarzer Brei. Diesen Brei direkt verwenden.	der entstandene schwarze Gundelrebenbrei mehrmals täglich auf den Abszess auftragen	4
Echte Kamille <i>Matricaria recutita</i> L. (Asteraceae)	Kamillosan	Zwischenklauenentzündung (Gripeli)	Kuh	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt.	3-4x täglich mit einer Spritz die Kamillentinktur zwischen die Klauen spritzen	3
Kartoffel <i>Solanum tuberosum</i> L. (Solanaceae) Knolle	Kartoffelwickel	Zwerchfellentzündung, unterstützenden Therapie	Kuh	Kartoffel kochen und die Pellkartoffeln zu einem Brei zerquetschen.	auf einem alten Fixleintuch den Kartoffelbrei verteilen, ca. 2-3 cm Brei und dann auf die Brust des Tieres legen und mit einer Binde befestigen, möglichst warm anwenden und ca. 1-2h einwirken lassen	1
Gartenkürbis <i>Cucurbita pepo</i> L. (Apiaceae) Samen	Kürbiskerne	Zinkmangel	Ziege		5g Kürbiskerne morgens und abends übers Futter geben	2
Fenchel <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. (Apiaceae) Früchte	Mamillenöl	Milchproduktion anregen, nach der Geburt	Lama	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt. Enthält Arganöl, Olivenöl, Sesamöl und ätherisches Fenchelöl.	1x täglich Euter mit dem Mamillenöl einreiben	1
Walnussbaum <i>Juglans regia</i> L. (Juglandaceae) Blätter	Nussbaumlaub	Milchfluss stoppen	Kuh		jeden Tag frisches Nussbaumlaub streuen im Stall	1
Walnussbaum <i>Juglans regia</i> L. (Juglandaceae) Blätter	Nussbaumlaub	Kühe trocken stellen, wenn man die Tiere gust lassen will	Kuh	Ein 10L Kessel füllen mit Blättern und mit einem Stock zu einem Brei zerstampfen.	Euter 2x täglich mit Brei einreiben, ein Kessel (10L) reicht für einen Tag	2
Garten-Ringelblume <i>Calendula officinalis</i> L. (Asteraceae) Blütenblätter	Ringelblumensalbe	Wunden am Euter	Kuh	Ringelblumenblüten an einem gut durchlüfteten Ort am Schatten trocknen. Eine kleine Hand voll getrocknete Blütenblätter (0.8g) in 2dl Olivenöl geben und 14 Tage an der Sonne ziehen lassen. Jeden Tag schütteln, durch ein Sieb absieben. 40g Bienenwachs über dem Wasserbad erhitzen und mit 2dl Ölauszug mischen. In Gläser abfüllen und erst verschliessen, wenn die Salbe gut abgekühlt ist.	betroffene Stelle 2x täglich mit Ringelblumensalbe einreiben	2

Silberdistel <i>Carlina acaulis</i> L. (Asteraceae) Wurzel	Silberdistel	Mastmittel, damit Tiere schneller zunehmen	Kalb		1 Hand voll getrocknete Wurzelstücke (ca. 12g) einmal täglich zum Futter geben	1
Gemeiner Wacholder <i>Juniperus communis</i> L. (Cupressaceae) Beeren	Wacholderbeeren	Euterödem	Kuh		ca. 50g Wacholderbeerenpulver 1x täglich übers Gläck (Salzlecke) geben	1
Echter Zimtbaum <i>Cinnamomum verum</i> J.Presl (Lauraceae) Rinde	Zimt	Euterödem	Kuh		1/2 KL Zimt morgens und abends zum Futter geben	2
Echter Zimtbaum <i>Cinnamomum verum</i> J.Presl (Lauraceae) Rinde	Zimt	Euterödem	Kuh		2x täglich 1EL Zimtpulver (ca. 6g) übers Gläck (Salzlecke) geben	2
Echter Zimtbaum <i>Cinnamomum verum</i> J.Presl (Lauraceae) Rinde	Zimt	Euterödem, Schlier	Kuh		morgens und abends 1 KL Zimt (ca. 2.5g) mit dem Löffel direkt eingeben	2
Echter Zimtbaum <i>Cinnamomum verum</i> J.Presl (Lauraceae) Rinde	Zimt	Euterödem, Leist	Kuh		2x täglich 1 EL mit Zimt (ca 5g) direkt eingeben, damit die Tiere möglichst viel schlucken	2
Echter Zimtbaum <i>Cinnamomum verum</i> J.Presl (Lauraceae) Rinde	Zimt	Ödem am Bauch, Wasserleist	Rind		1 EL Zimt (ca. 6g) übers Kraftfutter oder Mais geben, gut mit dem Futter mischen	1
Echter Zimtbaum <i>Cinnamomum verum</i> J.Presl (Lauraceae) Rinde	Zimt	Euterödem	Kuh		1 EL Zimt (ca. 6g) übers Kraftfutter oder Mais geben, gut mit dem Futter mischen	1

Echter Zimtbaum <i>Cinnamomum verum</i> J.Presl (Lauraceae) Rinde	Zimtpulver	Euterödem	Kuh		1 KL Zimt (ca. 3g) 2x täglich zum Futter geben	2
Echter Zimtbaum <i>Cinnamomum verum</i> J.Presl (Lauraceae) Rinde	Zimttee	Euterödem, Fluss	Kuh	2 gestrichene KL Zimtpulver (ca.4g) mit 3/4L heissem Wasser übergießen und über Nacht ziehen lassen.	2x im Abstand von 3 Tagen 3/4L Zimttee mit einer Flasche eingeben	1
Zitronenmelisse <i>Melissa officinalis</i> L. (Lamiaceae) Kraut	Zitronenmelisse	Beruhigung nach der Geburt	Ziege	Zitronenmelisse an einem gut belüfteten Ort am Schatten trocknen.	2x täglich eine Hand voll Zitronenmelisse (ca. 10g) zum Heu geben	2
Bärlauch <i>Allium ursinum</i> L. (Amaryllidaceae) Blätter	Bärlauch	Wurmprophylaxe	Ziege		zur freien Verfügung, Tiere könne so viel davon fressen, wie sie wollen	
Bärlauch <i>Allium ursinum</i> L. (Amaryllidaceae) Blätter	Bärlauch	Entgiftungskur	Kuh	1 Hand voll Bärlauchblätter (ca. 50g) mit dem Mixer zerkleinern.	1x täglich eine Hand voll Bärlauch übers Futter geben	1
Bockshornklee <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. (Fabaceae) Samen	Bockshornklee	Leberreinigung, Stoffwechsellanregung, Fruchtbarkeit unterstützen, zu Beginn der Laktation	Kuh		1 Hand voll Bockshornkleepulver (ca. 33g) 1x täglich zum Kraftfutter geben	1

Echtes Johanniskraut <i>Hypericum perforatum</i> L. (Hypericaceae)	Johannisöl	Ohrenschmerzen	Kalb	Fertiges Präparat, nicht selbst hergestellt.	ca. 1dl Johannisöl in die Ohren schütten, einmalige Anwendung	1
Hausmittel						
	Aschenwasser	Euterödem	Kuh	In einen Kessel 4.5L warmes Wasser geben und einige Hand voll Asche dazugeben. 1/2 Tag stehen lassen und dann grobe Stücke durch ein Sieb absieben.	1x täglich das Euter mit dem Aschenwasser einreiben	21
	Brieschmilch	bei Festliegen nach der Geburt	Kuh	1/2L Brieschmilch (Kolostrum) mit einer Hand voll Slaz mischen und gut rühren bis Salz sich aufgelöst hat.	Brieschmilch mit Salz auf den Rücken der Kuh einreiben, einmalige Anwendung	1
	Obstessig	Appetitanregung	Rind		1-2x täglich für 1 tag ca. 2-5dl Essig verabreichen	1
	Viehsalz	Gegen Festliegen nach dem Kalben	Rind		Einmalig portionsweise ca. 250g Viehsalz mit der Hand ins Maul eingeben	1
	Mostessig	Prophylaxe gegen "Ödemsauen" nach Absetzung	Schwein		2x täglich während 14 Tagen nach dem Absetzen 1L Essig in ca. 20L Wasser geben (Ansatz für ca. 25 Fährli)	14
	Rotwein	Nach dem Kalben	Rind		1L einmalig einschütten	1
	Bier	Zur Milchanregung nach dem Kalben	Rind		Ca. 4.5L Bier einmalig nach dem Kalben eingeben	1
	Heilerde mit Schnaps	Bretteuter nach einer Geburt	Rind	50 g Heilerde mit 2 EL Schnaps in einem Naturgefäß (kein Chromstahl) mischen	Mehrmals täglich auf das Euter auftragen bis Besserung eintritt (Max. 1 Tag)	1
	Rotwein	Gegen Drücken nach dem Kalben	Rind		Einmalig 1L einschütten	1
	Bier	Zur Beruhigung während dem Fährten (Angriffsgefahr der Fährli)	Schwein		Einmalig 2-3 Liter Bier in Trog geben	1
	Hühnermist	Gegen Schwanzbeissen	Schwein		Mist 1x täglich auf die Weide geben zu freien Verfügung	2

Mischungen						
Hänge-Birke <i>Betula pendula</i> Roth (Betulaceae) Blätter	Stoffwechselfmischung	geringe Milchmenge, Milchfluss erhöhen	Kuh	4 Teile Brennesselkraut, 4 Teile Löwenzahnwurzel, 1 Teil Birkenblätter und 1 Teil Holunderblüten in einem Messbecher abmessen und mischen.	morgens und abends 10g der Mischung übers Futter geben	7
Löwenzahn <i>Taraxacum officinale</i> F. H. Wigg. (Asteraceae) Wurzel						
Grosse Brennessel <i>Urtica dioica</i> L. (Urticaceae) Blätter						
Schwarzer Holunder <i>Sambucus nigra</i> L. (Caprifoliaceae) Blüte						
Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i> L. (Asteraceae) Kraut	Frauenmänteli und Schafgarbe	Milchbildung	Kuh	Schafgarbenbüschel am Schatten aufhängen und lufttrocknen und Frauenmantel auf einem Gitter am Schatten trocknen. 500g Frauenmantel und 1kg Schafgarbe mischen.	2 Hand voll der Mischung morgens und abends übers Gläck geben	10
Gemeiner Frauenmantel <i>Alchemilla vulgaris</i> L. (Rosaceae) Kraut						
Flachs/Lein <i>Linum usitatissimum</i> L. (Linaceae) Samen	Reis-Hafer-Leinsamenbrei	Appetitlosigkeit bei Fährli	Schwein	1/2 Reis, 1/2 Haferflocken und 1/4 Leinsamen zusammengeben und kaltes Wasser beifügen, aufkochen, für ca. 20-30 Minuten weiterköcheln lassen bis die Masse schön beriig ist, danach mixen	2x täglich etwas Brei einschütten	2-3 Tage
Saat-Hafer <i>Avena sativa</i> L. (Poaceae) Samen						
Reis <i>Oryza sativa</i> L. (Poaceae) Samen						